

D. CAROLI
MUSITANI

PHYSIATROS PROFESSORIS

Academici Peregrini, Pigri, &c.

TRUTINÆ

CHIRURGICO - PHYSICÆ

TOMUS SECUNDUS,

DE ULCERIBUS.

In quo facilis ULCERUM curandorum Via instruitur,
novis Medicamentis illustrata.

Cum INDICIBUS Argumentorum ac Materialium locupletissimis.



COLONIÆ ALLOBROGUM.

Sumptibus CRAMER & PERACHON.

M. DC. XCVIII.

IN OMNIBUS
M. 217

U. 11. 102

U. 11. 102

U. 11. 102

U. 11. 102



INDEX CAPITUM

CAP. I. Quid sit Ulcus, & quod ejus subjectum,	pag. 1
II. De Ulcerum differentiis.	2
III. De Accidentibus, quæ ulceribus superveniunt, vel ea comitantur.	3
IV. De Ulcetum speciebus.	4
V. De Ulcerum causis occasionalibus in genere.	5
VI. De Ulcerum signis.	6
VII. De Ulcerum causis.	8
VIII. De Ulcerum prognosi.	14
IX. De Sex rerum non-naturalium in ulceratis regimine.	16
X. De Ulcere simplici.	36
XI. De Ulcere cum intemperie.	38
XII. De Ulcere cum humorum affluxu.	46
XIII. De Ulcere cum inflammatione.	51
XIV. De Ulcere cum Erysipelate.	56
XV. De Ulcere œdematoso.	63
XVI. De Ulcere sordido, & putrido.	67
XVII. De Ulcere Verminoso.	69
XVIII. De Ulcere cum labiis callosis.	79
XIX. De Ulcere sinuoso.	81
XX. De Ulcere fistuloso.	85
XXI. De Ulcere cum ossis carie.	89
XXII. De Ulcere cum carnis excrescentiâ.	94
XXIII. De Ulcere canceroso, Lupo, & Noli me tangere.	95
XXIV. De Ulcere dyssepuloto, cacoëthe, Telephio &c.	103
XXV. De Tineâ.	108
XXVI. De Aurium dolorem.	115
XXVII. De Aurium ulcerem.	119
	De

INDEX CAPITUM.

XXVIII.	De Exeuntibus p.n.ab Aurium cavitatibus.	122
XXIX.	De Aurium sonitu.	124
XXX.	De Gravi Auditu, & Surditate.	130
XXXI.	De Narium ulcere, & Ozœnâ.	137
XXXII.	De Coryzâ.	142
XXXIII.	De Narium hæmorrhagiâ.	144
XXXIV.	De Aphthis, & Otis ulceribus.	154
XXXV.	De Gingivarum exulceratione, & erosione.	161
XXXVI.	De Dentium dolore.	164
XXXVII.	De Dentium stupore.	171
XXXVIII.	De fœdo Dentium colore, & fœditie.	173
XXXIX.	De Dentium mobilitate, & casu.	177
XL.	De Difficili infantium Dentitione.	180
XLI.	De Tonsillarum, & Uvulæ ulceribus.	183
XLII.	De Balbutie, & his, qui difficulter loquuntur.	187
XLIII.	De Asperæ arteriæ, & œsophagi ulceribus.	191
XLIV.	De Labiorum Rhagadibus, & ulceribus.	194
XLV.	De Mammillarum, & Papillarum ulceribus.	198
XLVI.	De Morbo pilari.	202
XLVII.	De Papillarum fissuris.	204
XLVIII.	De Cervicis uteri ulceribus, & Rhagadibus.	206
XLIX.	De Vteri ulceribus.	212
L.	De Penis ulceribus.	217
LI.	De Veneris Sensu.	224
LII.	De Excoriatione, & ulcere Scroti.	235
LIII.	De Perinæi ulcere.	238
LIV.	De Tibiarum, & Pedum ulcere.	240

F I N I S.



D. CAROLI
MUSITANI

Physiatros Professoris &c.

TRUTINÆ CHIRURGICO-PHYSICÆ.

TOMUS SECUNDUS.

DE ULCERIBUS.

CAPUT PRIMVM.

Quid sit Plcus, & quod ejus subjectum.

ULCERUS 3. meth. cap. 1. Ulcus à vulnere non distinguit, sed utrumq; per continui solutionem in parte carnosâ factâ definit: Verùm differt ulcus à vulnere, primò, quia vulnus semper à causâ externâ vulnerante infligitur, ulcus verò à causâ quidè externâ occasionem habere potest, sed semper à causâ internâ vel in toto corpore, vel in parte exi-

stente fovetur. Secundò, vulnus est continui solutio recentè factâ, ulcus est solutio continui diuturna. Tertio, vulnus in ulcus abire potest, ulcus verò nequaquàm in vulnus. Quarto, vulnus strictè sumptum est, cùm in loco vulnerato nullum aliud accidens accedit præter continui solutionem, ulcus verò dicitur, cùm præter continui solutionem in parte solu-

D. Caroli Musitani Tom. II.

A rā,

tâ, vel in toto illius solutionis causa fovetur. Quintò, in ulcere semper aliquid de parte affectâ imminutum, vel amissum est, si non plus, saltem cuticula; semper enim in ulcere aliquid in parte aufertur à causâ erodente, & estò quandòque superflua excreseat caro, tamen cutis, vel ipsa caro naturalis deest, & ulcus illud non est simplex morbus, sed compositus, & cum magnitudine auctâ conjunctus.

Possunt cum ulcere varii morbi, ut intemperies, inflammatio, erysipelas, caro supererescens, & alii conjungi, qui tamen ad ulceris essentiam non pertinent, & auferri possunt, ulcere manente, cujus essentia solum in continui solutione cum partis affectâ aliquâ diminutione consistit.

Hinc fas est ulcus definire, quòd sit continui solutio à causâ erodente in aliquâ corporis parte, cujus solutionis causa vel in ipsâ parte ulceratâ, vel in toto corpore tanquàm mediâtâ conservatur cum imminutâ magnitudine.

Sextò differt ulcus à vulnere, quia ulcus ut plurimum provenit à prægresso abscessu, vel vulnere perperam curato. Tandem, vulnus est continui solutio recens ab externis causis casim, vel punctum, vel ruptim illata, & semper cum sanguinis profusione contingit; ulcus verò ab internis causis erodentibus produci-
tur, quibus non instantaneâ violentiâ, ut in vulneratione, sed lentâ erodentis humoris in tumores, & apostemata collectione, eorumque purulenta erosione fit continui solutio, è qua non sanguis, ut ex vul-

neribus, sed pus, vel sordidum, putridumve liquamen, saniesve effluit, vulnera tamen perperam curata non raro in sordida, & putrida degenerant ulcera, quæ tùm ab iis, quæ ab internis proveniunt causis, non differunt.

Ulceris subiectum sunt omnes nostri corporis partes, præcipuè molliores, seu carnosæ, quarum continuum erosione ità solui, & quavis à causâ exedi potest, ut difficulter coalescat; ossa tamen excipimus, quæ ad cariem pertinent. Carnis vocabulo non modò propriè dictam musculosam, quæ afficitur, sed latè dictam, quâ intestinalis, vesica, & alia viscera constant comprehendimus. Item glandulas, quæ sunt veluti naturæ cribra, & in partes carnosas semper aliquem immitunt succum; ductus Lymphaticos, rami quorum in carnosas, & membranosas immediatè inseruntur partes; similiter omnes membranas, venas, arterias, fibras, nervos, tendines &c. complectimur. Perpetuò tamen unas pars præ alterâ erit magis disposita, & præcipuè ubi plures sunt ductus, copiosiores sunt succi, & frequentiora sunt ulcera, ut in inguinibus, abdomine, ano, utero, perinæo frequentius eduntur.

C A P. II.

De Ulcerum differentiis in genere.

VLcerum differentias prolixè proponit Gal. 4. meth. med. cap. 20. easque quinque esse docet scilicet

à figurâ, quantitate, atque æqualitate, & inæqualitate, à tempore, & loco.

Differentiæ ulcerum à figurâ pendent, cum ea obliqua sunt, vel recta, vel tortuosa, vel rotunda, vel oblonga, vel in superficie lata, & circa fundum angusta, vel in superficie angusta, & circa fundum lata.

Secundum quantitatem, vel magnitudinem differunt ulcera, vel in eo, quod sint magna, vel parva, majora, vel minora, longa, vel brevia, in superficie residentia, vel in profundum penetrantia.

Ab æqualitate, vel inæqualitate oriuntur ulcerum differentiæ, cum ea vel æqualem, vel inæqualem habent circumferentiam, labra vel plana, vel depressa; profundum, vel scabrum, vel planum; orificium in medio, & in profundo vel æquale, vel latius, vel angustius.

Differentiæ à tempore sunt, ut vetustum ulcus, vel recens, exigui temporis, vel diuturni.

A loco tandem, si in cute sit ulcus, vel in musculis, si in musculorum capitibus, vel in eorum medio, si in articulis, vel in carne, vel glandulis, vel emunctoriis, si tandem in visceribus, vel in eorum quolibet, locum nunc esset proponere, ut à qualibet dictarum differentiarum indicatione ulcerum curatio desumi debeat, ac proinde sufficiat nos docuisse frequentiores ulcerum differentias: nam cum de eorum curatione sigillatim agemus, huiusmodi differentias commemorabimus, ut congruens sit medicaminum applicatio pro cuiuscumque ulceris differentię necessitate:

CAP. III.

De Accidentibus, quæ ulceribus superveniunt, vel ea comitantur.

Multa accidentia ulcera comitantur, vel iis superveniunt, quæ ulcerum curationem vel variant, vel immutant; non ergo à re alienum erit prædicta accidentia comitantia, vel supervenientia hic enumerare. Comitantur itaque ulcera, illisque superveniunt dolor, punctura, pruritus, inflammatio, intemperies, erysipelas, oedema, durities varices, tumor, coloris depravatio, putredo, sordities, vermes, malus odor, fluor ichorofus, saniosus, callus, fungus, sinus, fistula, osium caries, indolentia, folliculus, cancer, lupus, noli me tangere, gangræna, sphacelus, aliaque similia, quæ ulceribus conjuncta, unumquodque illorum distinctum curationis exigit modum. Operæ pretium faciemus, si notata jam accidentia ulceribus supervenientia memoriæ mandemus, nam cum de illorum curatione agemus, huiusmodi accidentia commemorabimus, ut eorum rationem habeamus, quia illorum unum quodlibet, dum ulceri conjunctum observatur, proprium, & specificum exigit remedium.

CAP. IV.

De Ulcerum speciebus.

Diversæ ulcerum species emergunt vel ab ulcerum excrementis, vel accidentibus supervenientibus, vel comitantibus. Excrementa, quæ ex ulcere emanant sunt *sanies*, *ichor*, *pus*, & *sordes*, & est *sanies*, & pus vulgares chirurgi confundant, & pro eodem ulceris excremento accipiant, accipiunt tamen quid pro quo. *Sanies* propriè est fluida, & tenuis illa humiditas subalba, vel lutea, quæ à crudo, & incipiente ulcere effluit, & hæc à *Celfo* dividitur in *ichorem*, qui tenuis est, & subalbus, atque in *melliceriam* magis crassam, & glutinosam, mellique albo consimile. Dicitur postea virulenta, tenacior, & glutinosior materia, quæ in malignis gignitur ulceribus, & ut plurimum lividi, aut nigri coloris est. *Pus* autem illud dicitur excrementum, quod ab inveterato fluit ulcere, album est, læve, æquale, & minimè fœtidum. *Sordes* tandem omnium viscosissima, & maximè glutinosa mucilago est adeò tenaciter ulcerato adhæret loco, ut difficillimè ab eo auferri possit. Ex his excrementis variæ ulcerum species desumuntur, ut.

Vulgare est, quando cumque ulcus pus album, æquale, & minimè fœtidum excernit, omnium facillimè Sanabile. Ubi verò serosa humiditas pure tenuior, & aquosior affatim emanat, ulcus dicitur saniosum,

veteribus rheumaticum, phlegmaticum, vel fistulosum dictum, ad quod nimirum natura humiditatem excrementitiam, quæ ichor dicitur per emunctoria convenientia evacuari debebat; ulcus tamdiu insanabile redditur, donec prius ejusmodi fluxus ab ulcere avertatur, & exsiccecur. Ubi autem sordes mistæ sunt, nempe pus, sanies, utrumque lividum. Cinereum, variegatum, tabum, sordidum vè excrementum glutinosum, crassum, & tenaciter ulceri adhærens, in eo reperitur cum fœtore, & profunditate, prædurisque, & siccioribus labris, tale ulcus dicitur sordidum, veteribus ulcus melancholicum, malignum, & depascens, ac omnem sanationis spem respuens, donec prius malignitas, & putredo ex ipso auferatur. Quæcumque ulcera depascentia, & in profundum, ambitumque rodentia ulcera à quibusdam indiscriminatum *Lupus* vocantur. Alii tamen per lupum intelligunt ulcus quoddam specificum pleurumque in carnosa femoris parte sedem hgens, & acerbis cruciatibus affligens, nisi ulceri quotidie frustum carnis recentis imponant. Alii contra sævam illam faciei, & narium exulcerationem, quæ aliàs *Noli me tangere* appellatur, lupum vocant. Sic quoque ejusmodi corrosiva ulcera nuncupantur *Phagedæna*, & *Nomodes*. Aliis etiam *chironia* à Chirone chirurgo, aliis *Dyssepulotica*, ac *Telephia* dicuntur, id est quæ non tantum affectam carnem erodunt, & quasi cane pejus dentibus devorant, suffodiunt, & excavant. Sed etiam adjacentes, & vicinas partes ex-

eden;

edendo, & putrefaciendo depopulantur. Talem autem differentiam inter utrumque esse volunt, quod nimirum phagedæna sit paulo mitius Nomode, & saltem ambulando (hinc dicitur *Foreste* ambulativum ulcus), & serpendo cutem erodat, sitque impetiginis, & serpiginis species; *Nome* verò non tantum cutem, sed & carnem excavet. Cum autem ulcus cum tumore præduro incipit, ac deinde in malignissimum, & maximè dolorificum ulcus degenerat, hinc ulcus dicitur *cancrosum*, seu *cancer exulceratus*. Quodlibet etiam ulcus malignum, seu virulentum, exedens, & omnem sanationem respuens *cancer* vocatur.

Ex accidentibus, quæ ulceribus superveniunt, vel ea comitantur, aliæ ulcerum species emergunt, unde alia dicuntur ulcera *verminosa*, & *phthiriasiaca*, quæ variis in locis vermibus subcutaneis capillaribus, partes exedentibus scatent, quin & majores quandoque vermes in ulceribus reperiuntur cum putridâ, ac foetente, corruptâque sanie. Datur quoque ulcus cum *hyperfarcosi*, sive carnis excrecentiâ, seu luxuriante carne. Sic est & ulcus *Scorbuticum*, quod scorbutum habet comitem. Est aliud, quod tumorem, inflammationem, aliud gangrænam, sphacelum, aliud hydropem excipit, si- num, fistulam, aliud cum carie, & ossis corruptione, & alia accidentia, quæ capite tertio descripsimus.

CAP. V.

De Ulcerum causis occasionalibus in genere.

Ulcerum quorumcumque occasionum ad quatuor genera congruè reduci possunt, quorum duo sunt externa, duo verò interna; Primum genus occasionum externarum est quodlibet corpus vel vivens vel non vivens, acutum, vel obtusum, quod quovis motu cutem, vel subjectam partem pungit, lacerat, incidit, percutit, distrahit, contundit, vel quovis alio modo offendit; hæ enim læsiones cutis, vel carnis facillimè innumeras ulcerum species excitare possunt.

Secundum genus occasionum externarum ulcerum est contagium vel per fomitem, vel ad distans hominis cutem, vel carnem contaminans, ex qua contaminatione innumera quoque ulcerum species emanant. Ad distans agere videmus pestis contagium, per fomitem verò scabiei, & luis Veneræ contagium.

Genus primum occasionum internarum sunt tumores, quomodo- cumque, & qualitercumque sub cute, & in carne coacervati; nam quoties ipsi aperiuntur, species ulcerum diversæ producuntur.

Alterum genus internarum occasionum est, quoties liquor alimentitius, sanguis, vel aliud simile in corpore delitescens, in qualitate exaltatum absque tumore carnem, & cutem corrumpit, vel fecat, &

ulcerum non paucas aperit species.

Ulcerata, quæ ex occasionebus externis primi generis sunt, nisi à venenatis dentibus, unguibus, vel mucronibus fiant, à bono chirurgo faciliter curari possunt; Si verò venenum admistum habeant, diffiçulter. Quæ verò ab alterius generis occasionebus sunt ulcera, à contagiis scilicet, si pestis contagio producantur, difficillimè curantur; si ex scabie, vel lue Venereâ, facillimè, si chirurgi medicamenta, quæ contagium extingunt, sint nota.

Ex occasionebus deinde internis primi generis, scilicet ex tumoribus ulcera, si ex illis tumoribus erumpant, qui materiz coctionem admittunt, facilliter curantur; qui verò coctionem materiz non admittunt, obstinatissima pariunt ulcera.

Alterius generis ex occasionebus internis erumpentia ulcera semper difficillimè sunt curationis, quia non solum chirurgicam, sed physicam exigunt curationem.

G A T. VI.

De Ulcerum signis.

Narratio de Ulcerum signis supervacanea videtur, externa siquidem ulcera utpotè nostris subiecta sensibus, lippis, atque tonforibus patescunt, quoniam vel visu, vel tactu, vel olfatu deprehenduntur, & hæc profectò ulcera chirurgis imperitis nota sunt, sed hoc non facit, oportet namque eorum differentias, & accidētia cognoscere,

quæ quam maximè curationem variant; imò magnæ molis est ulcera interna, quæ sub oculos non cadunt, nosse, & hæc non nisi ab eruditis deprehendi possunt. Ideoque tam de ulcerum interiorum, quàm exteriorum signis aliquid in medium afferendum.

Signa interiorum ulcerum, affectarumque partium petuntur ab excrementis, doloris proprietate, actione Læsa, atque situ.

Ab excrementis ulceris, & laborantis particulæ in cognitionem venimus, & si per quemcumque corporis meatum, ut per tussim sanies effluat, intus in pulmonibus ulcus existere coniectamus, namque aspera arteria solum in pulmonibus extat, & quæ per anachartasim exturbantur, in pulmonibus, vel thorace ut plurimum præexistebant. Similiter ex purulentæ materiz excretionem per vomitum, œsophagum, aut ventriculume esse suspicamur. Si per nares, aut aures pus, aut sanies effluat, ulcus intus latere indicio est. Serosum ejectum pus palatum, fauces, aut circumstantes partes exulceratas ostendit. Si per muliebrem pudendum eliminetur sanies, uterius, aut ejus vagina, aut circumpositæ partes ulcus patiuntur. Per alvum si effluit pus, ventriculume, intestina, mesenterium, vel alia abdominis viscera ulcus obsidet, si cætera consentiant. Diximus, si cætera consentiant, quandoquidem huic soli signo non perpetuò fidentum est, cum à diffitis quoque partibus excrementum illud fluere possit; sic multoties pus, quod in thoracis cavitare continebatur, unà cum

eum Lotio excretum fuisse observimus, alioquin vesica, aliæque partes Lotii excretioni dicatæ ulcere Laborarent.

In qua autem parte ulcus lateat, præter excrementa doloris proprietates, situs, ac læsæ partis actio docebunt. Si si dolor sit pungens, partis nervosæ læsionem, pulsans arteria indicabit. Doloris situs similiter ipsam partem exulceratam docebit. Si in parte exulceratâ sensus, vel motus læsus fuerit, nervosæ partis affectû indicium est. Sic si Languens cibi fastidio prematur, & pus per alvum cum incoctis cibis deponat, exulceratus est ejus ventriculus, ad quem ciborum appetitus, & coctio spectat; contrâ benè se habente ventriculi coctione, si pus per sedem quoque exturbetur unâ cum alvi excrementis liquidioribus, ulcus in intestinis exiit, in quibus ventris superfluitates debitam adipiscuntur consistentiam. Tandem ex situ, si namque simul cum lotio latæ membranulæ portio excernatur, exulcerata est vesica. Doloris situs in dextro hypochondrio hepatis, in sinistro splenis affectionem demonstrat.

Externorum ulcerum signa facillè innotescunt; ubi enim pus apparet, ibi ulcus, verum pus diversum est, modò album lactis instat, & crassum cremoris lactis instat, absque odore, & fœtore, quod censetur optimum. Est album, ex eo quia acida salia exulcerato in loco Luxuriantia præcipitant succum nutrimentitium alkalinum in album liquorem. Sic sulphur in lixivio solutum, vel similimentruo alkalino acidi permissione lactescit. Modò ulcera pus

flavum, viride, vel tenue, acre, ac interdum crassum, seu spissum expuunt.

Succi ex ulceribus fluentes varia à veteribus sortita sunt nomina. Primò, *pus* dicitur, quod nobis est alba, & crassiuscula materia benè olens, & nihil aliud est, quàm coagulatus succus alimentitius Lactis cremori similis, quæ à veteribus concocta in ulceribus habetur materia. Secundò, *ichorosus sanguis*, qui communiter acidum spirat, & gustu deprehenditur salsus, & videtur esse sanguinis serum, dicitur *sanies*, & cum sanguini permiscetur, dicitur *pus sanguinolentum*. Tertio, *ichor* vocatur tenuis humor sulphureus, & salsus, qui etiam sæpè ex ulceribus effluere solet. Quarto, *Sordex* dicitur illa materia, quæ lardo similis est, lutea, spissior, quæ non facillè per ductus carnosos profluere potest, & Lardum repræsentat in ulceribus difficilioris curationis. Quintò, *Virus*, quod appellatur, est acris, fœtibus, tenuis humor, ulceribus maximè noxius, qui etiam ulcera aperit rodendo, & cutem pustulosam reddendo. Sextò, *Melagium* est oleosus humor, qui ex corruptis ossibus effluit, & ossium adustorum fœtet. Verum quædam reperiuntur ulcera nullum exhibentia succum, quæ sicca dicuntur, & multum negotii chirurgi faciunt, hæc cognoscuntur ex siccitate aridâ nulum de se præbente digestionem, adest partis squalor, & siccitas, & quasi quædam rugositas, ut & asperitas quædam, & durities ulcerati membri à pertinacissimâ vasculorum obstructione proveniens ex

sym.

symptomatibus; ulcera enim spha-
celata nullum exhibent pus.

Ulcus sordidum, seu putridum
hæc habet signa: materia intus con-
tenta est lardi instar scilicet tenax,
lurida, & maximè ulceris lateribus
hærens. Hoc ulceris genus cacochy-
micos infestat i.e. corpora, in qui-
bus succi non satis attenuantur, vel
subriliantur, vel fluidiores non
sunt.

Ulcerata Phagedænica sunt cum Te-
laphiis, & Chironiis rebellia, ma-
gna, nullis obedientia pharmacis,
oras habentia duras, & tumidas,
ex optimorum remediorum appli-
catione semper hæc ulcera in deteri-
us ruunt, & magis cum suis vas-
is sanam discindunt carnem, &
ægri aded vehementem patiuntur
dolorem, ut dies, noctesque tra-
ducant infomnes. Ulcus nudatum
plures angulos, & profunditates
exhibet, fibræ, venæ, ac arteriæ
nudæ conspiciuntur cum gangrænæ
metu. Materia, quæ effluit, nihil
aliud est, quàm ichor foetidus, aut
flavum, putridum serum. Sæpè
erysipelas, vel herpes in tale dege-
nerat ulcus.

Ulcerum signa cum ossis carie,
vermibus, carnis excrecentia &c.
ex propriis capitibus innotescunt.

Externorum ulcerum signa etiam
à figurâ, profunditate, & magnitu-
dine desumuntur, nam vel autop-
siâ cognoscuntur, vel specillo ex-
plorantur, itâ similiter eorum acci-
dentia, ab excrementorum quanti-
tate conjectare valemus. Sic ulcus,
an magnum, an parvum sit, puris
copia indicabit, quæ in magno
major, in parvo minor est.

C A P. VII.

De Ulcerum causis.

Galenici hepar pro ulcerum cau-
sâ accusarunt, & hac viâ he-
par ab acuitate suâ per ulcera repur-
gari docuerunt, hepar autem ut
membrum mutum à tot, tantisque
injuriis, & imposturis se defendere
non potuit, quare falsam accusatio-
nem pati necessum fuit, cujus tamen
innocentissimum est. Aliqui caput
inculpavere, quod per descensum se
in inferiores partes acuitate suâ ex-
oneret: Sed hoc capitale fundamen-
tum non omnibus arrisit Galenicis,
ulcerum namque omnium originem
uni hepatis tribuerunt, cui despoti-
cum dominium in humano corpore
assignarunt, undè innocentissimum
hepar ipsi in tantam sustulerunt in-
solentiam, & temeritatem, ut quod-
libet ulcus sive magnum, sive par-
vum ejus culpâ à plantâ pedis ad
verticem capitis fieri, & causari ar-
bitrentur, & nihil corporibus acci-
dere, quod despoticâ non patretur
hepatis tyrannide, fateantur. Id
aded apud ipsos indubitarum est, ut
Luem Veneream, quæ ab extrinse-
co contagio in corporibus creatur,
in fonte hepate suam habere se-
dem vivæ vocis oraculo insinuent.
Quatuor humores in corpore posue-
runt, & horum officinam hepar, &
corruptos pro ulcerum origine con-
stituerunt. Post horum genesim me-
lancholiæ sedem in liene, bilis in
vesiculâ felleâ, piritam in cerebro,
& sanguinem in hepate collocarunt.

Verùm

Verum quomodo hi corrupti humores in cute foramina sibi aperiunt, absque eo, quod partes in transitu non lædant, non docent. Fabrum choleram adurentem, & in atram bilem mutantem non assignant. Sed nesciunt adusta amittere vires. Quomodo igitur cane pejus corrodit? Si corrosio in adustionibus existit, quis piritam, quis sanguinem adurit? A Galeni quo usque ad nostrum sæculum hepar usurpato totius corporis imperio pacificæ possessione, quousque inepta, & nimis credula medicorum posteritas in Galeni verba jurarunt, fuit positum; at cum fatali necessitate Galeni auctoritas declinare cœpisset, hepar suspectum esse, & usurpatam per tot sæcula tyrannidem, quam obiverat, amittere cœpit, & aliam quam ab hepate ulcerum genesis recentiores, Galeni præjudiciis exuti, meditari cœperunt, & considerantes ulcera, quæ internis à causis excitantur, ejusdem esse conditionis, ac ea quæ à causis oriuntur externis, inculpato hepatis æstimationem, & pristinæ innocentie statum solemni decreto restituerunt.

Tres humores ab ulceribus præcipuè effluere dicunt, unum subtilem, qui *sanies* dicitur, alium crassum, qui *sordes*, & tertium, qui medio modo se habet, & *pus* appellatur. Hinc ulcera vel saniosa, vel sordida, vel purulea vocantur; quod si scilicet humores aquosi ad partem confluant, dicitur saniosum ulcus, si crassi, sordidum, si purulenti, purulentum.

Pro nostra de ulcerum causis, sententiâ dicimus, quod causa, quæ est

immediata, efficiens, & effectiva solutionis continui in ulceribus, eadem quoque est ejusdem continui conservativa juxta scholas: *sanctio vitiosa est ejusdem partis, cujus est in sanis sanctio integra; & contrà, pro cujus intelligentiâ cum anatomicis asseveramus continuum in viventium animalium corporibus fieri à fibrarum spermaticarum texturâ, interveniente quodam glutine, sive glutinoso quodam liquore albo, lucido, viscoso, qui ipsas fibras gratus, & genialis est, ipsasque connectit, & glutinat adedè exactè, ut licet ipsæ fibræ solitarie consideratæ contiguæ potiùs, quàm continuæ dici possent. Hujus liquoris ope earum textura verè continua sit. Hunc glutinosum liquorem cognoverunt antiqui medici, fuitque apud illos dictus *Ros*, & *Cambium*. Aliqui ex recentioribus liquorem hunc *Sinoviam* sive *sinoniam* appellarunt; undè licitum nobis erit pro clariori rei intelligentiâ cum *Paracelso* hujusmodi liquorem *radicalem Balsamum* appellare.*

Balsamum sanè, & rectè glutinosum illum liquorem appellamus, quia cum vox ista Balsamus apud omnes denotat materiam, sive liquorem quandam, qui non solum se ipsum à putredine defendit, sed qui alia corpora, quibus miscetur, ab ipsâ præservat; congruentissimum erit balsami nomen glutinoso liquori, qui in viventibus corporibus fibrarum spermaticarum continuationem efficit, nam ipse non solum se ipsum conservat, sed ipsas fibras, quas glutinat, à corruptione, & mortificatione præservat.

Radicalem deinde hujusmodi

balsamum appellamus, nam cum ipse ab ipsismet spermaticis fibris producatur, sitque in penitissimis vitæ animalis penetrabilibus elaboratus. Iure merito radicalis dici debet, nam in ipsis fibris non est externe appositus, sed interne ab iis emanat, & continuè per ipsas fertur.

Est tamen hic sedulo advertendum, quòd iste balsamus radicalis multiplex est in viventium corpore propter multipliciter partium spermaticarum idem corpus componentium; enimverò, ut prædiximus, balsamus iste ab ipsismet partibus spermaticis generatur, & producit, & unaquæque earum secundum sui naturam propriam sibi balsamum elaborat, & id in eis particulis efficit, quod est ad conservationem ipsius partis aptum; Undè est, quòd balsamus in medullis est medullaris, in ossibus osseus, in venis venosus, in nervis nerveus, in cartilaginibus cartilaginosus &c. quod summâ cum providentiâ fuit à naturâ ordinatum, enimverò cum defectus, corruptiones, & lacerationes propriarum partium reparare fuerit huic balsamo radicali demandatum, ut ipse reparandæ partis indigentiam reparare possit.

Cum ergò balsamus iste radicalis sit causa immediata unionis, & continui in corporibus viventibus, dum in suâ temperie, id est constitutione existit, necessariò concedendum est & ipsum esse causam immediatam solutionis ipsius continui, quoties vel degener factus, vel corruptus, vel alteratus existit, nam tunc à febris renuitur, deficit illiè, qui glutinis officium gerens, eas con-

nexas conservat, undè evenit, quòd illiè ab invicem distrahantur, & separentur, cum verò à causâ externâ sit continui solutio, tunc balsamus iste radicalis per aëris adventum, vel alterius corporis suam constitutionem perdit, corrumpitur, devenitque ad glutinandum ineptus, & in tali casu ipse in causâ est, ut solum continuum in unionem non coeat. Ergò radicalis balsamus vel degeneratus, vel corruptus, vel alteratus semper erit immediata cum ulcerum causa, quæ ab intrinseco sunt, tùm eorum, quæ ab internâ causâ producuntur, eritque quoque causa non solum ut actu continui solutio fiat, sed etiam ut post factam perfecteretur.

Assignato balsamo radicali degenerare, vel corrupto, vel alterato pro immediatâ ulcerum causâ, nunc mediatas eorum causas assignemus oportet, & dicimus balsami radicalis in fibris degenerationem corruptionem, vel alterationem ab ipsis causis mediatis pendere, hujusmodi sunt salia corrosiva, exurentia, acrida, vitriolata, aluminosa, nitrosa, arsenicalia, realgarina, mercurialia &c. quæ ipsum balsamum in fibris degenerare, corrumpere, & alterare faciunt, ac ineptum ad continui unionem reddunt, hinc perfringendo, discindendo, corrodo, causticando, & exurendo fibras procedunt, & sibi viam aperiunt, qua patefactâ, ulcus producunt cum partium deperditione, & succus alimentis effluit tam ex fibris, quas lubricat pro viæ animantis sustentatione, quàm effluunt contenta ex ductibus, ut arterio-

teriolis, venulis, vasculis lymphaticis, nervis &c. quæ continuè circulant, undè variegatus succus emanat, ut flavus, vel albus, vel salsus, aut tenuis, vel crassus, qui vulgò pus dicitur. Ex ductibus ruptis, coriosis, vel discissis succi effluentes commiscetur, & factâ succorum cum particulis salinis fermentatione, juxta earum diversitatem puris diversitas producit, & salia magis exaltantur; *omne enim agens non agit, nisi exaltatum*, & fibrarum, ac vasculorum multitudo corrumpitur, & rumpitur, ac ulcera magis Cava fiunt, & plus materiæ à majori ulceris profunditate, & circumferentiâ effluit ob majorem fibrarum, & ductuum coriosorum, & ruptorum multitudinem.

Esse in nostro corpore salia, præter salinos fontes à *Paracelso* Medicinæ Monarchâ assignatos, probamus, totumque hominum salis congeriem esse dicimus, & absque eo vivere nequit, eo quod ejus putrefactionem arcet, & dùm mortuas à putrefactione diutissimè conservat carnes, quantò magis vivas præservabit, judicare facile erit. Sal cibos corrigit, & si non intervenit, nulla eorum fit correctio. Sal per urinam, & secessum expulsionem exercet. Sanguis totus naturâ suâ salsus est, nè grumescat. Hinc sudor, lacrymæ, saliva, urina, fæces, & quicquid ex humano corpore expulsionem recipit, salinam redolet indolem.

Cibaria in ventriculo benè se habente acefcunt, undè chylus postea aciditatus fellis effluvio in salsum transit, si Helmontio credendum

est, & chylo fictitiò, quem in nostra *Trutinâ Medicâ lib. 4. c. 1. de ventriculi allione* opiparè repudiavimus, assentiendum est, & sicut acidum ventriculo est geniale, & gratum, ita sanguini in venis exoticum, & hostile; fixatur namque sanguis, si in vivi animalis venas per syphonem injiciatur, & paulo post ejusdem subsequitur mors. Confirmatur hoc, sanguinis è venâ detracti coagulatio, quæ temporis momento succedit spiritus vitrioli, sulphuris, vel aliùs acidi permissione, ejusdemque dissolutio alkalieorum salium, ac spirituum, ut fuliginis &c. beneficio perficitur. Horum acidorum salium locupletes sunt hypochondriaci, & præsertim scorbutici ob fellis ignaviam, ut Helmontio placuit, undè ulcerum myriadibus tentantur, ac proinde languoribus ab acido prodeuntibus salia alkalina magnum sunt solatium.

Materia potulenta, ut aqua, quæ quotidie utimur, varia salium genera, & mineralium intra se continet, exceptâ aquâ per vitrum destillatâ; ac vinum, quod maximis in deliciis habemus, & præter has cum ad alendum, tum etiam ad nostrum corpus roborandum adhibemus, multis particulis salinis scatet, præter tartarum, qui est vini sal, imò vinum in insulâ *Enariz*, & in agro *Puteolano*, ac circa *Vesevi* radices, quod fit, ob varias soli fodinas sulphuris, ammoniaci salis, aluminis, & vitrioli particulis est imbutum. Præterquam quòd vita nostra jugiter, nè dùm vegetantium, & animalium, verum etiam mine-

salium haustu altur : latent siquidem mineralia , & in omnibus corporum particulis natura abstrusit, quibus non apertè, sed furtivo quodam modo vescimur.

Aër quoque, quem inspiramus acris salia secùm vehit ex mineralium effluviis hausta; volitare autem in aëre salia, faciliè admiserit, qui pulvisculos in ipso à solaribus radiis illustratos exploravit, in quibus latitant interdùm hæc salia. Helmontius in linteo aëri exposito salinas hæc observavit impressiones, & nos quoque non paucis ab hinc annis hic vidimus lintea aëris siccanda expansa subfusco, & rubiginoso tincta colore, crucisque figuram variè referentia, quod nostri Galenistæ rerum naturalium veras causas ignorantes, ad occultas qualitates confugere non valentes, rudi vulgo tanquàm ominosi eventus talem rem prædicabant. Certè si probè nossent inter cæteras omnis generis particulas, vitriolatas quoque in aëre contineri, quæ linteorum licia colorabant, & fortè tali figurâ disponebantur, cùm licia intertexta non difficile crucis figuram assumere possent, ut cuilibet manifestum esse potest, certè inquam talia non effusiissent.

Prædictæ particulæ à majori fluidi quantitate dilutæ neque partibus, per quas fluunt, nec in quibus continentur, nocent, sic spiritum sulphuris, salis, aut vitrioli multâ aquâ dilutum innoxie, imò salubriter propinari observamus, & pessima symptomata causare absque debitâ fluidi copiâ exhibitum. Eodem patitur modo si salia ab humano cor-

pore non eliminantur per sua emundatoria, sed à debitâ fluidi quantitate secernantur, primò mediante fermentationis motu aciditatem excitant, deindè salsedinem acutam, exaltantur, acuuntur, suntque fetida, & juxta varios exaltationis gradus varias ulcerum species excitant, & juxta hunc nostrum sensum intelligendus est magnus Hippocrates lib. 6. de veteri medicinâ.

Quod assumpsimus mechanicè probamus : Salia lixivialia, seu alkalinâ in multo lixivio nullatenus, si carni nostræ applicentur, lædunt, attamen post lixivii aliqualem evaporationem causticant, ut videre est in saponariorum lixivio, ex quo lapis infernalis efformatur. Itâ tartarus ad albedinem calcinatus, linguam, si ea tangatur, carbonis accensi instar exurit, quod ante calcinationem non faciebat. Pariter nitrum, sal commune, ammoniacum in retortâ cum bolo agitentur, similiter de sulphure per campanam igne agitato dicendum est, exaltatum proliciunt liquorem, qui si nostræ applicentur carni, in illâ ulcus inducunt, quod non faciebant, dùm erant sub salis, vel sulphuris formâ.

Hæc salia ante exaltationem sunt nobis familiaria, dùm in statu naturali nobiscùm morantur, multisque nostris ægretudinibus medentur, at si semel nostrâ culpâ, vel sinistro eorum usu in furorem rapiantur, exaltentur, non ampliùs eorum amicitia fidendum, nobiscùm veluti cum hoste se gerunt, quos enim apprehenderint, commaculant, in maximum vitæ discrimen adducunt.

eunt. Cavendum itaque ab iis, quos vel semel offendimus, quia si quandoque hostes evadunt; vitam nobis suffurantur.

Salinæ, sulphuræque particulæ in aëre; quem spiramus, in cibariis, ac potulentis latent, quibus non apertè, sed furtim vescimur, non rarè nostrâ afficerent corpora, nisi particulæ amicæ, & inimicæ miscerentur, & hostiles ab amicis castigarentur, quæ castigatio nisi intercederet, ulcerum myriades sublequerentur.

Alteratur balsamus radicalis ab acidis, sed ferè ut plurimum à salis, hiæc alimenta, quæ nimio abundant sale acri, & mordaci, ut sunt porri, sinapi, allia cepæ &c. salita omnia, ut carnes, & pisces omnes sale conditi, itèrè oleum, quod totum sulphureum est, multam ulcerum excitant supellestem, sicciorum salia, & sulphura in humano corpore exaltantur, & solvendi vim nanciscantur.

Hinc fit, ut plerique veris tempore tunc cùm humani corporis succi magis fermentescunt, [verùm de his primo Tomo de tumoribus cap. 60. de Priapismo, & Satyriasi fusiùs egimus) ut plurimum ulcerosi fiunt non tantùm in internis corporis partibus, verùm etiam in cute tantùm in universali emunctorio, si ad eam exaltati salis demandatio fiat, nam ibi pruritus excitat, cutem corrodo, & sic scabiem, aliasque cutis defecationes, ulcera producit, & alios morbos tùm internos, tùm externos, ut inquit *Hip. sect. 3. aph. 20.* Vere etenim furvora & morbi melancholici, & comitiales, & pro-

fluvia sanguinis, & angina, & gravedines, & rancedines, & lepra, & tussis, & impetigines, & vitiliginis, & pustula ulcerosa plurima, & tubercula, & articulorum dolores.

Externæ ulcerum causæ sunt medicamenta externi nostri corporis partibus applicata virtutem, & efficaciam eas corrodingi, & earum continuitatem solvendi vim habentia, cujusmodi sunt omnes aquæ stygiæ, caustica potentialia, corrosiva, putrefactiva, & quæ nos ustulando rodunt, talia erunt arsenicum, sandaracha, realgar, mercurius meteorizatus, calx viva, cantharides, quæ nimio sulphure inflammabili, & plurimo sale caustico, corrosivo, volatili, & exaltato constant. Itèrè multa è vegetantium familia, ut ephemerum, euphorbium, esulæ succus, ranunculus, flammula Iovis &c. quibus mendici quamplurimi, tenebriones, & perditæ, tibias, & crura sua exulcerant, dilaniantque, imò & caput suum tinea defecant, ut elemosynas à tenacibus hominibus extorquere possint.

Ad hujusmodi causas ignem æstivalem revocamus, cùm eschara relicta ad ulcera potius, quàm ad vulnera pertineat. Huc etiam spectant combustiones ab aquâ, oleo, aliisque succis fervidis,

Ad externas etiam causas referimus variorum salium effluvia, quæ ex terrâ, aquis, fodinis &c. jugi fermentatione elevantur, ut sunt vitriolata, nitrosa, gemmea, armoniaca, aluminosa, realgarina, arsenicalia &c. quibus addimus variorum sulphurum effluvia, quæ inspiramus, Sic quotidie Chemistæ

Sylve

Sylvestre, & perniciosum aquas è carbonibus, aquis stygiis, & mineralium fusionibus porant. Item qui cinnabari, arsenico, auripigmento, sublimatis, stibio &c. laborant, Sic fossiores, separatores, & mineralium coctores, qui non sibi cavere possunt, indefinenter eorum effluvia introhauriunt, quæ multoties cum pulmonum excrementis fixantur, illosque lacerant, corrodunt, exulcerant, præsertim si pulmones procribro inserviunt, & phthisin, vel empyema, vel vomicas producant. Hinc quamplurimi Chemistæ vel in phthisin, vel empyema incidunt, vel subitanè occumbunt morte, & suis in lectis cadavera reperiuntur, quorum mortis proculdubio vomica præcipua causa sunt; eruptione pus cordi communicantes, illudque obruentes, quæ conjecturaliter ipsis occultè succrevè ab introhaustis acribus, falsisque atomis rerum venenatarum, ac in igne evaporabilium. Hæc etiam referendum est contagium, quomodò vapores è phthisicorum pulmonibus exhalantes ab aliis inspiratione attracti pulmones exulcerant, phthisinque producant: & sordes, atque effluvia scabiosorum, leproforum, & lue Venereà laborantium cuti communicata, eam exulcerant, & simile vitium generant.

Mediata etiam, & antecedens ulcerum causa est cacochymia, sive corporis, & fluidarum impuritas, hoc est, corpus, in quo succi non factis attenuantur, vel subtiliantur, vel fluidores non sunt propter pravam viscerum constitutionem, vel iniustum usum sex rerum nonnatura-

lium. Sunt & alia ulcerum causa, de quibus in propriis capitibus agemus.

C A P. VIII.

De Ulcerum prognosi.

Ulcera cutem occupantia, & superficialia facilius, & brevi temporis intervallo curantur, cœterum profundiora difficilius. Ulcus magnum, cæteris paribus, difficilius curatur, quàm parvum; in ulcere enim magno multæ partes externo obijciuntur aëri, & subjæctæ partes, venæ, arteriæ, nervi magis læduntur, & considerantur. Item angusta, & oblonga ulcera facilius curationem admittunt. Ulcera orbicularia, vel ad circularem figuram proximè accedentia, longiori indigent tempore, adhuc ut curentur; figura namque circularis est omnium capacissima, & est plana, unà tantum lineam contenta, in cujus medio punctus est, à quo omnes lineæ ad circumferentiam ductæ sunt æquales, idèque ulcera circularia sunt magna, labia, quæ uniri debent, à centro sunt distantissima, ac proinde longà indigent curatione.

Si pus, quod excernitur, bonum sit, optimum signum denotat, quia fermentatio ad summum non pervenit fastigium, facilioris curationis est ulcus; bonum autem pus mediæ est inter tenue, & crassum consistentiæ, album, læve, æquale, & minimè fœtidum; malum verò est, quod valdè tenue est, & fluidum, pallidum, lividum fœculentum, & mali odoris.

Sanies,

Sanies, quæ est pure tenuior, & aquosior ex ulceribus profluens, quid de curatione præfagiendum sit, indicat; sanies namque multa, tenuis nimis, pallida, livida, nigra, pravi odoris, & quæ vicinam exedit cutem, difficilis curationis ulcus portendit: si verò sit mediocriter crassa, non multa, subrubra, subalbida, facilius curatu ulcus indicat.

Ulcerà valdè humida, & in corporibus cacochymicis, similiter in locis superfluâ humiditate, & excrementis scatentibus, ut in utero, vel ano, difficillimæ, & tardissimæ sunt curationis. Ulcerà in hydro-picis oborta rarè sanantur, & exsiccantur, ut inquit *Hip. sect. 6. aph. 8. Aquâ inter cutem laborantibus, ulcera in corpore facta, difficulter sanantur.* quia continuè emanant; omnes enim canaliculi obstructi sunt, vel rupti, vel corrosi, hinc nulla alia via restat, quàm extra cutem, idèd-que nullâ consolidatio fieri potest ob assiduam affluxum aquosæ materiæ, seu ichoris, propter acres, pungentesque particulas, quibus vasa discinduntur, hinc etiam melioris sanationis spes elucet, si materia albidior, & spissior redditur.

Ulcerà interiora exterioribus magis sunt periculosa, & præcipuè nobilium viscerum, & quæ ad vitam summo perè necessaria, ut cordis, pulmonum, diaphragmatis &c. aut quæ in consensum viscera præcipua trahere possunt, ut ventriculus, uterus &c. Siquidem multa sæpè superveniunt pessima, & lethalia symptomata, quæ ægrum de medio tollunt, antequàm ulcus ad cicatri-

cem perducì valeat. Ulcerà extremarum partium, nempe manuum, pedum, & capitis concitant glandularum tumorem, ut capitis pone aures, vel circa collum, manuum sub alis, & pedum circa inguina. Ulcerà glandulosarum partium contumaciora sunt, cum aliquid acidi secernatur, & lympham constituat, & si dolorosa, & corrosiva sint, facillimè in fistulas degenerant, imò cancrösam sæpè induunt naturam. Ulcerà articulorum, & extremarum partium non facillè curantur, tum ob motum, tum ob debilem calorem, & proinde gangrænæ obnoxia sunt. Exulceratio partium perpetuo motu gaudentium, ut cordis, pulmonis, arteriarum &c. incurabilis censetur; quies namque ad dictarum partium coalescentiam multum conducit. Ulcerà nervorum, aliarumque partium exquisito sensu præditorum periculosa sunt, tum quia convulsiones, vel saltim spasmodici motus excitari solent, tum quia inflammationes, & gangrænæ ejusmodi ulceribus supervenire possunt.

In ulcerum curatione accuratè ad applicata remedia attendendum est; si enim majorem quàm antè dolorem, humiditatem, vel siccitatem, caliditatem, vel frigiditatem inducant, ea minimè esse idonea, vel convenientia, sed mox mutanda esse arguunt, idonea enim illicò conferunt, vel saltem non nocent. Ulcerà facilius curantur, ad quæ medicamenta, quæ adhibenda sunt, pertingunt, & quæ facilius adherent; difficilior verò, quibus medicamenta non rectè applicari possunt,

& quibus non facile adherent. Ulcera, quæ aliis morbis succedunt, vel in ipsis nascuntur, sive autem ante, vel in morbo ipso excitata, plerumque difficulter sanantur, quia natura viciosos humores in corpore latitantes ad partem depellit, & transmittit.

Ulcera, quæ ad viriditatem, livorem, vel nigredinem tendunt, partis affectæ calorem debilem, & penè extinctum significant, & morituris paulò ante mortem ulcus pallidum, livens, nigrum, & aridum apparet propter caloris nativæ extinctionem. Si ulcus postquam carne impletum est, ipsique cicatrix induci debet, recrudescit, vel in fistulam abit, vel in osse subjecto corrupto causa investiganda est.

Frigus inimicum, calidum verò amicum ulceribus, hinc ulcera, quæ ex hydropo, vel frigore oriuntur, pessimi moris sunt, illa verò quæ post phlegmonem, & abscessum oriuntur, melioris sunt notæ, & curatu faciliora; per calorem enim seu motum succi circulantur, à frigore verò non tantum succi inspissantur, & ad motum inepti redduntur, sed etiam ipsa vascula, per quæ circulantur, constringuntur, & facilius obstruuntur.

Tandem ulcera valde diuturna, & inveterata non nisi cum periculo sanantur; natura enim diutino saniei per ulcus effluxui assueta, eoque per occlusionem denegato, morbum concitare solet, nisi exitu iterum aperiantur, vel corpus sedulò purgetur, & victus ratio bona observetur. Reliqua prælagia in specialibus ulcerum curationibus tradentur.

CAP. IX.

De Sex rerum non-naturalium in Ulceratis regimine.

Non opportunis tantum medicamentis ulcera sanescunt, sed & diæta in his non respuenda est, aliàs subministratà novâ læsionis causâ, chirurgus incassum exulcerato medicam adhibebit opem, nihilominus non tantum in cibo, & potu moderetur æger, ceterum in omnibus sex rebus non-naturalibus; hæc namque vel valetudinem collapsam in meliorem statum redigere, vel optimè dispositam conservare possunt, hinc.

Estò noster aer non sit simplex, & uniusmodi, sed ex pluribus, dissimilibusque componatur particulis ex æthere, aqueis vaporibus, ac, terrestribus expirationibus permixto, hic tamen ad vitam salubrem necessarius est, & sufficit, ut eligatur purus, nitidus, serenus, at non eâ puritate, qua æther ponitur, quò est summè tenuis, & perspicuus, ut in altissimis montium cacuminibus, in quo homines non aliter vitæ munia obire possunt, quam per spongiam humore imbutam spiritum haurientes, quia in respiratione requiritur aer notabiliter crassus, & multâ vaporum, exhalationumque copiâ refertus, qui ad altissimorum montium cacumina gravitate sua non pertingunt. Ceterum aer debet esse diffusus à fodinis, voraginibus, specubus, stagnis, paludibus, è quibus jugi fermentationis ope tetri,

tetri, nebulosique vapores, varia effluvia salina, ut vitriolata, nitrosa, aluminosa, armoniaca, gemmea, arsenicalia &c. quibus sulphurea copulamus, erumpunt, aëri commiscuntur, illumque conspurcant, quæ proditoriè inspirata diversimodè nostra afficiunt corpora. Præter aëris puritatem, & nitorem ipse temperatus esse debet, nam nimis frigidus sanguinem, ceterosque circulantés succos inspissat, incrassat, & est ulceribus, ut diximus, inimicus; nimis calidus succos calore suo resoluit, & salia humiditate destituta exaltantur, & ansam ulceribus præbet.

Post aërem de cibo, potuque aliquid subjungamus oportet: horum enim maxima est vis in tuendâ sanitate, profligandisque morbis. Ad-
dimus & nos, quod pleræque ægri-
tudines elcudentis, & porulentis ori-
ginem habere observantur, ut prop-
tereâ rectè scriptum sit à *Fernelio*:
*Unam gulam hominum esse prope mor-
borum matrem, atque intemperantiam
medicorum esse nutricem*; cibi itaque
omnes usurpentur facilioris costio-
nis, qui plurimo sale alkalico sint
referti, ut salia corrosiva obtundant,
cicurentque. Vitentur angue pejus
omnia acida, & acrida; hæc namque
ulceratis valdè obsunt, quia ex-
cedentia, & majorem salium conge-
riem, ac proventum ulceribus re-
fundunt; illa verò nostros succos, &
præcipuè sanguinem incrassant, coa-
gulantque & ad circulationem inep-
tos reddunt: sanguis enim noster ex
secentis ferè constat particulis, ut-
plurimum ex sale alkali volatili, cui
si acidum sal conjungatur, ex tem-

plò sanguis inspissatur, coagulatur-
que non aliter ac si oleum tartari
p. d. inspissatur per spiritus
vitrioli acidi affusionem. Si san-
guini extravasato quandam aci-
dum liquorem affundas, illicè nig-
get, & spissus apparebit, imò si per
Syringam in alicujus animalis ve-
nam acidum liquorem injeceris, in
momento morietur, ut multoties
in quampluribus animalibus experi-
ti sumus. Oppositum verò experi-
mur in Sanguine, si aquam ex sale
armoniaco, vel nitro compositam
ipsi effundes, sanguis rubicundus
apparet, & fluidior redditur, imò
& nostri lanii, ut mattatorum por-
corum sanguinem pro conficiendis
botellis asservent fluidum, sale com-
muni condunt.

Fugiantur salsamenta, ut carnes
muriâ conditæ, fumo induratæ, sa-
le conditæ, ut petasones, Lucanicæ
&c. Item pisces sale induratæ, ha-
leces &c. Nimis pingua nocent,
quia nimio exuberant sulphure, ut
lardum, caro suilla, anguilla, an-
sares, legumina, caseus vetustus.
Conducunt carnes animalium ju-
niorum, avicularum, aut verve-
cinæ, vitulinæ &c. Vitentur om-
nia dulcia, ut saccharata, & mel-
lita, quia viscidum in se continent,
quod à visciditatis compede ignis
beneficio per cotutam extrahitur,
in liquorem transit corrosivum.

Pro potu fugiantur vina dulcia;
acerba, austera, signina, turbida. &
præcipuè Pureolana, quæ multis
salinis, sulphureisque sunt referta
particulis, ac cervisæ. Item hy-
dromel, aquæ saccharo condi æ, &
id genus alia. Si vinum nec acre,

nec dulce, sed medium, optimi coloris ad helvium vergentis, saporis, & odoris, sitque generosum, & non oligosarum, sed quod aquam admittat, nam *Dilutum crescit, dulcescit, & ledere nescit.* Vel pro potu concedat Theræ, vel Capheæ infusum, quod ulceribus maximè conducit; hujus namque potionis ope particulæ salinæ, vel sulphuræ, peccantes obtunduntur, & per sua emunctoria cicures redditæ eliminantur. Omnia verò esculentia, & potulenta nec nimis frigida sint, quia nimis calida magnum fermentationis motum in succos inducunt, & plures subtilissimas particulas avolare faciunt; nimis frigida incrassant, coagulantque ineptosque ad naturalem fluorem reddunt. Tandem considerare oportet naturam succi illius, qui ad dissolutionem plurimum confert: nam succus salinus, vel acidus aquæ potu temperatus utilior redditur, & aqua diluitur. Verum solent auctores disceperare, quæ nam aqua melior, & ad salutem utilior conferi debeat: commendatur autem ab omnibus illa, quæ levior est. Quomodo verò aquæ pondus explorare possumus, non unus à scriptoribus traditus est modus. *Hip. 5. aph. 26. Aqua,* inquit, *que citò calefit, & citò refrigeratur, levissima est.* Optimum profectò est Hippocratis argumentum, nec de aquis tantum, sed de cæteris etiam liquoribus intelligi poterit, sic e. gr. aqua ardens multo facilius, citiusque incalescit, quam vinum, & hoc etiam facilius quam aqua, & hæc promptius quam lac, & sic de cæteris intelligere licet,

& propter hoc optima illa confectur, quæ visu, gustu, & olfactu pura, & sincera esse deprehenditur: quæ nullius rei saporem gustui, vel odorem olfactui offert; quæ tenuis, & Levis, ut per hypochondria celeriter permeet, & per corpus citò distribuatur; quæ versus solis ortum, & præcipuè æstivum scaturit per terram mundam, quæ arenis, & lapillis scaturiens, per eisdem fluit, & ab omnibus, quæ innatare solent ramentis liberata, quæ vè hyeme est calidior, æstate verò frigidior.

Tertiò pauca de somno, & vigiliâ attingamus; naturâ quidè compertum est, ut vita nostra somno, atque vigiliâ alternatim gaudeat. Somni plurimæ sunt utilitates, nam & cibus in somno melius conficitur, collapsæ reficiuntur vires, & dolores, ac animi pathemata vel consopiantur, vel leniuntur. Vigilia verò ad alimenti distributionem, & inutilium reliquiarum secretionem, excretionemque magis quam somnus conferre videtur. Functiones autem animales, quarum gratiâ vita expetitur, nisi in vigiliâ fieri citè nequeunt. Non ab re nobis alenum videtur in somni gratiam cum sit animi quies, & humanæ vitæ melior pars, aliquantulum digredi.

Solent aliqui inquirere, cur nonnullis animantibus usque ad eò longus, diuturnusque sit somnus, ut nonnunquam semestris spatio dormire videantur, quemadmodum contingit gliribus, serpentibus, & quamplurimis insectis animalibus? Equidè minus mirabile videri potest, quòd animalia diutissime dormiant,

miant, quàm quod illis vita per multum temporis spatium sufflaminari, & intercipi possit. Nam animantes, quæ dormiunt, quia eo tempore parùm, aut nihil moventur, parùm etiam consumuntur, atque perspirant, idcirco diutius sine alimento vivere possunt: nec profectò major est difficultas, quamobrem hominis somnus alternatim ad horas octo, vel decem extendatur, quàm quare gliris somnus semestris spatium occupet. At certè mirandum videtur, quòd pisces in quibusdam locis, ubi mare in glaciem concrevit, simul cum aqua ipsa congelantur, vità intercipiuntur, donec adveniente calore, glacies solvatur in aquas. Idem contingit certè cuidam hirundinum speciei, quæ simul conglomeratæ sub aquis fluviorum merguntur hyberno tempore, ibique ad vernam tempestatem, vità interceptà, morantur. Sed non eadem videtur esse ratio, quæ dormientibus animalibus, atque de his, quibus vita planè intercepti observatur: nam in animalibus, quæ dormiunt, cor jugi palpitatione movetur, & sanguis per universum corpus circulator, sed in animalibus, quorum vita sufflaminatur, nullus omnino motus in corde fit, nec ulla apparent vitæ vestigia, nisi revixerint. Porro vitam hyemali tempore intercipi Lucomoris non modò impossibile videtur, sed omnino consentaneum est: neque enim ulla videtur major difficultas, cur contingat hominibus, cum hirundinibus evenire in locis Septentrionalibus, jam ferè omnibus sit compertum,

De somni generatione, & causis non eadem est apud omnes sententia. Equidè nemo ibit, inficias in somno quiescere facultates animales, & præcipuè sensitivam; sed undè fiat, ut facultates quiescant, in dubium videri potest. Quod autem complures scribunt retineri, & coërceri in somno spiritus, ne ad corporis partes impellantur, rationi valdè consentaneum videtur. Sed quomodò spiritus coërceri posse putabimus? Profectò, qui hominis naturam accuratè prospexerit, compertiet non in corde tantum, & venis inesse valvulas, quæ sanguinis ingressum, vel egressum remorantur, sed suas etiam in cerebro in esse valvulas, atque in nervis quoque quæ spirituum animalium ingressum, aut egressum impedire possunt, sponte autem, & suà vi concidunt ejusmodi valvulæ in cerebro, nisi certa quædam vis illas apertas, & suspensas sustineat, non secus ac palpebræ oculorum sponte concidunt, oculosque tegunt, nisi viatollantur: undè contingit, ut morientibus, & iis, qui vitali robore destituuntur, oculi claudentur, palpebris concidentibus. Similiter, & longo labore fessis corporibus facile irrepit somnus, nam imbecilla sit illa vis, quæ valvulas cerebri adaperire & adaptatas sustinere potest. Hinc patet, quamobrem vinum, opium, & similia somnum plerumque inducere valeant: quippe quemadmodum ex modico vino, & pauxillo opio spiritus resciumtur, & ad motum promptiores fiunt (habent enim spiritus animales cum vini spiritu aliquam analogiam), ita ex nimio vino, aut

opio animales Spiritus conturbantur, & ineptiores fiunt, undè & universo corpori torpor accidit, & ipsis etiam valvulis segnitie ad sese sustinendum, atque idè somnus obrepit.

Cæterùm tamen si dormientium spiritus in corporis partes, & præsertim in sensuum organa non deferuntur, non tamen omninò feriantur, ac cessant: suas enim vices in cerebro quam maximè exerunt, hinc multæ fiunt in somno cogitationes, quæ vulgò in somnia nuncupamus. Fiunt autem insomnia non modò cum somnus levior est, & medius quidam status inter somnum, & vigiliam, ut omnes ferè authores hætenus opinati sunt, sed etiam in profundissimis somnis, ut uno verbo dicamus, semper dormientes somniamus: sed eorum tantùm somniorum meminimus, quæ in leviori somno contingunt, nam quòd profundè dormientes somniant, patet ex somnambulis. qui certè dum ambulant, janua aperiunt, loquuntur, gladium evaginant, stringunt, natant, & alia vigilantium opera exequuntur, omninò somniant, sed illos profunde dormire uel indè manifestè liquet, quòd ad varios occurfus, rumoresque non facilè expergiscantur, imò experrecticorum, quæ dormientes agebant, vix meminerunt. Hinc etiam intelligi potest non semper in somno occludi canales illos, per quos spiritus motiviferuntur: nam profectò illi, qui motum thoracis propter respirationem adjuvant, minimè clauduntur unquam; sed neque eos, qui ad pedes, manusque per-

tingunt, semper claudi videntur; ut ex somnambulis liquet; neque omnes ductus, per quos spiritus ad sensuum organa deferuntur, semper in somno obserantur, ut in ipsis quoque somnambulis est manifestum, & in his, qui dormientes loquuntur. Sed ad nostra redeamus.

Somnus moderatus plurimùm sanitati confert, vires namque lassas reficit, humidum radicale, restaurat, spiritus laboribus diuturnis resoluti instaurantur, calor ad interiora recurrit, membra calefacit, corroborat, alimentorum, crudorumque humorum coctio optimè perficitur, bonum alimentum paratur, corpus pinguefacit, unde Hip. 6. epid. com. 5. l. 10. inquit: *Somnum visceribus esse cibum, omnem evacuationem tollit somnus præter sudorem, dolores sedat, animi molestias abigit.* Immoderatus verò sanitatem destruit, nam naturales impedit evacuationes, appetentiam dejicit, crudos cumulat humores, calorem hebetiorem reddit, & spiritus animales torpidos, undè actiones omnes segiores fieri necesse est, corpus enervat, & pallore diffundit, caput vaporibus replet. Nocet etiam, si intempestivè ineatur, undè Hip. 2. progn. 11. habet: *Interdum vigilare, noctem verò dormire oportet.* Verùm si laxitudo à labore dependeat, aut nox insomnis præcesserit, interdum dormire non incommodum est: Sicut nec iis somnus meridianus nocet, qui assueti sunt, ut testatur Hip. 2. aph. 50. *Quæ ex longo tempore consueverunt, etsi deteriora sint, in suis minus molestare solent.* Oportet igitur ad insuetam transire.

Sicut somnus nil aliud est, quam sensuum quies, & cessatio, ita vigilia eorundem actus, & exercitatio, hinc moderata vigilia profecto spiritus, & sensus excitat, vegetioresqueredit, spiritus, & calorem in omnes corporis partes distribuit, alimenti distributionem adjuvat, excrementorum propulsionem promover, & membra vigore fovet; at ex immoderatâ vigiliâ corpora exsiccati, & contabescere in confesso est apud omnes, & causam assignant, quia in vigiliâ plurimæ superfluitates excernuntur, quæ in somno retineri solent. Verum enim verò experimento compertum est nostra corpora magis in somno perspirare, quam in vigiliâ, ut vel ex ipso sudore liquet, qui frequentior, & promptior somni tempore contingit: arqui sæpius memorata *Sanctorii* observatio nos edocet multo majorem esse eam excretionem, quæ fit per perspirationem, quam ceteras omnes evacuationes simul sumptas: deberet igitur ex prædictâ ratione corpus magis exsiccati in somno, in quo major est perspiratio, quam in vigiliâ. Equidem videmus ex diurnis vigiliis corpora extabescere, atque consumi multo magis, quam in diurnâ somnolentiâ solet evenire: Id autem inde contingere arbitramur, quia ipsa met causa, quæ longum inducit pervigilium, potens est corpus consumere. Imò verò longa vigilia vires exsoluit, & plurimos dissipat spiritus, spiritus autem ex purissimâ alimenti portione fiunt: unde nihil mirum. Si ex vigiliâ magis, quam ex somno corpora contabescant,

Præterea vigiliæ nimia spiritus absument in sanguinis massâ, unde sanguis in vappam degenerat, corporis vires labefactant, coctionem impediunt, cruditates pariunt, & universos corporis succos exsiccant, eosque acres, & corrosivos reddunt, imò cerebrum exsiccant, quia natura circa sensus, & exteriora corporis occupata evocat, distribuitque multum spirituum, & caloris ad exteriora, unde interiora exsiccati, refrigerari, ac humiditatem absumi oportet, quæ in sensuum instrumentis est, operis diurnitate, & magnitudine, ut quod cerebrum in vigiliis maximè laborat, non solum sensûs, & motûs instrumentis spiritus supeditando, sed etiam intensiōe animi, atque cogitatione, ut tandem spiritibus exhaustis, & cerebro exsiccatō, mentis alienationem, & morbos calidos inducere possunt.

Somnus itaque & vigiliæ moderatæ sanitatem conservant, immoderatæ verò eandem destrunt, ut inquit *Hip. 2. aph. 3. Somnus, & vigilia, utrumque si modum excesserint, malum.* Idem repetit *7. aph. 71. Somnus, & vigilia utraque modum excedens, morbus.*

Quartum rerum non-naturalium genus sub motu, & quiete continetur: nam corporis motus, atque exercitia, & his opposita ocium, & quies non parvam habent vim ad sanitatem tuendam, morbosque profligandos.

Complures esse solent utilitates, quas motus nostris corporibus præstare potest, primò namque mediante motu succi alimentarii, & sanguis attenuantur, & ad circulationem promp-

proptiores redduntur. Secundò, internus calor promouetur, augetur, & ex caloris augmento felicius fit nutritio. Terziò, corpus facilius perspirat, & excrementa per proprios ductus deferuntur, undè membra, atque artus roborantur, & solidescunt, ac tandè motus efficit, ut corpora non ità faciliè ab externis injuriis afficiantur, sed causis ægrotare facientibus magis resistent.

Motuum complura sunt genera, nàm labor omnis, aut exercitium sub motu comprehenditur, ejus generis sunt ambulatio, cursus, saltatio, magnæ, & parvæ pilæ lusus, gestatio, navigatio, vectio, equitatio, & similia, quibus antiqui ad valetudinem conservandam uti consueverunt. Imò *Asclepiades*, qui nominis celebritate omnium medicorum famam potuit obscurare, rethor pharmacorum usu utpotè, quæ stomachum lædant, & visceribus insensa sint, omnem curandi rationem in victu, & exercitio posuit. Undè factum est, ut ejus exemplo posteriores medici magnam exercitii curam habuerint, ut apud *Cornelium Celsum*, & alios legimus. Frictionem quoque inter motus reponere licet: nàm Senes, & qui sedentariam vitam degere coguntur, cum nullo possint exercitiorum genere uti, frictione quam maximè indigere videntur, ut calor excitetur, humores attenuentur, & perspiratio longior fiat. Dici autem vix potest, quantum ad valetudinem perspiratio conferat, nàm multo major est exitus, qui perspiratione fit, quàm qui per excretiones alvi, urinæ, salivæ, narium muci aliarumque eva-

cuationum sensibilibus contingere solet. Quandoquidem, ut longâ observatione à *Sanctorio* compertum est ex octo partibus eorum, quæ ore assumuntur, tres tantum in hominibus rectè valentibus per sensiles excretiones vacuantur, reliquæ partes quinque insensibiliter perspirant. Quòd si perspiratio minor fiat, quàm res, & necessitas postulat, tunc morbi contingunt. Lique igitur exercitia, frictionesque ad valetudinem maximopere conducere, cum ex illis perspiratio excitetur.

At verò complura exercitiorum genera, quibus antiqui ad tuendam valetudinem utebantur, in desuetudinem abièrunt, hinc autem fit, ut nonnulli morbi, qui ex ocio progignuntur, nostris temporibus frequentius ingroant, ut arthritidis, vesicæ, & renum calculi, similesque ægritudines, quæ desidiâ, ocioque vigescunt.

Quomoddò ex motu nostrum corpus incalascit, res est inquisitione digna. Profectò nulli dubium est dura corpora, dum invicem atteruntur, & colliduntur, incalascere, & sæpè etiam ignem concipere: quod quâ ratione eveniat, non ab omnibus eodem modo explicari solet. Nobis arrident ea, quæ *Plato* scripsit, à quo calor definitur esse agitationem cujusdam subtilissimæ substantiæ, quæ omnibus ferè corporibus magis, aut minus commiscetur. Videmus namque in his, quæ incalascunt, corporibus, agitationem quandam, & motum vel penes universas eorum partes, vel saltem penes subtilem materiam in eorundem po-

poris contentam. Undè fit, ut à vehementi calore corpora ferè omnia colliquentur; nàm primum à calore incipit agitari materia subtilis in corporibus conclusa, deindè verò à vehementiori agitatione etiam solidæ ipsorum corporum partes agitantur, & à vinculo disruptio invicem disrumpuntur, undè in liquentem massam abeunt. Hinc manifestum est non ex quorumcumque corporum attritu, & collisione calorem excitari, sed ex eorum dumtaxat, quæ dura sunt, attritione. Neque verò liquida, & fluida corpora attriti, collidique invicem possunt. Undè non videtur satis manifesta ratio, quamobrem animalium membra ex cursu, saltatione, aut quavis vehementi agitatione incallescant: nàm præterquam in ossibus nulla adest insignis durities, quæ attritionem, collisionemque efficere possit, neque ex cursu verbi gratia corporis partes atteruntur: & sanguis, qui maximè omnium incalescit, cùm sit corpus fluidum collisioni, nequaquam videtur obnoxius: ergò alia videtur inquirenda ratio, quæ explicare possit, quomodò ex motu, aut exercitio possint nostra corpora incallescere.

Equidè si vini spiritum observaverimus, comperimus illum in ore incallescere, & multo magis, si intèrè in ipso ore agitetur, imò vinum generosum vehementi in ore agitatione ità incalescit, ut propter fervorem sustineri nequeat: inest enim in vino tenuis quidam spiritus facilè mobilis, qui agitatus in ore propter promptitudinem ad motum

facillimè incalescit. Similis quidam spiritus est in sanguine, qui ex motu, & agitatione facilè incalescit: at verò in universi corporis agitatione, motuque sanguis quoque celeriter movetur, & multo velociùs circulator; comprimuntur enim ex motu venæ, atque aded sanguis è venis propellitur vehementius in cor, undè & cordis palpitaciones, artèriarumque pulsus frequentiores sunt. Et hinc manifestum erit, quamobrem ex cursu, & corporis agitatione calor in ipso corpore intendatur.

Quoniam verò ex calore perspiratio major fit, & humiditas consumitur, perspicuum esse potest, quomodò ex motu corpora exsiccantur, & humidis excrementis minùs scateant. Cæterùm hæc non ità intelligi debent, ut quòd major fiat motus, eò magis calor in corpore intendatur: quippè in laborioso, & vehementissimo motu vires resolvuntur, & vitalis calor imminuitur, undè etiam superfluitates excrementitiæ superabundant. Hinc nimius motus spiritûs, & solidarum partium substantiam exhaurit, & dissipat, & consequenter totum refrigerat corpus, coctionem præpedit, venas, aliosque sæpè rumpit ductus, undè vomitiones, expuitiones, ac mictiones sequuntur cruentæ. Motu etiam valido sanguis cum impetu extra venas fertur, & hinc inflammationes in partibus exterioribus, & interioribus excitantur. Quod si sanguis in venis agitetur; incalescatque febres, multosque languores, præsertim si totum corpus pravis scateat humoribus, excitat; siquidè

dēm pravi humores, qui antea quasi consopiti quiescebant, valido agitati motu per universum corpus feruntur, & in imbecilliori parte tumores excitant, & ulcera: Si autem ad interiora regurgitant, alvi profuvia, vel vomitiones concitant, aut intra venas hærentes, febres accendunt, alioque plurimos generant morbos. Eapropter corpora pravis referta succis validè nullatenus sunt exercenda, præcipuè à cibo, & nondum coctione completà.

Quemadmodum moderatus motus bonæ valetudini summo est emolumento, ita moderata quies eidem plurimum confert; quies namque morui opposita est, post labores dulce lenimen, ut *Hip. 2. aph. 48.* scribit: *In omni corporis motu, ubi laborare cæperit, quies statim lassitudinem auferit.* Et Poëta Sulmonensis cecinit:

Quod caret alternâ requie, durabile non est,

Hæc reparat vires, fessaque membra levat.

Est quies non tantum corpori, verum etiam animo multum necessaria, ut idem:

Ocia corpus alunt, animus quoque pascitur illis.

Sicut motus phlegmaticis, frigidis corporibus, humidisq; naturis prodest, ita calidis est commoda quies; verum enim verò summa quies, ocium vocata maxime sanitati adversatur, hæc immoderata quies profectò corpus superfluitatibus, quæ non eliminantur, implet, ciborum coctionem, eorumque distributionem efficit infeliciorem, vires enervat, corpus impingat, segne, & invalidum

reddit, unde languorum myriadum in causâ est, eapropter cecinit Ovidius:

Cernis, ut ingnavum corrumpane ocia corpus?

Ut capiant vitium, ne moveantur aqua.

Est igitur moderatus motus, moderataque quies in ulceratis servanda, verum semper partis conditio attendenda est.

Excreta, & retenta, aliàs inanitionio, & repletio sub quinto rerum nonnaturalium genere comprehenduntur, pro quorum notione sciendum est, quòd perpetuò aliquid de nostri corporis substantiâ vel sensibilibiter, vel insensibiliter deperditur, ad cujus restaurationem cibus, & potus sufficiuntur, atque, quæ ingeruntur, talia planè non sunt, quale id, quod absumitur: coctione igitur elaboranda, atque utilia corpori alimenta commutanda sunt, sed non tota, eapropter utilium ab inutilibus separatio fieri debet, utilia retinenda, inutilia excernenda sunt, ut in salubri statu corpus conservetur. Cæterum si quæ in corpore retineri debent, excernantur, aut si quæ excerni oportebat, retineantur, valetudo depravatur. Unde *Hip. 5. aphor. 57.* *Menstruis longius fluentibus, morbi eveniunt, non fluentibus autem ex utero, morbi contingunt.* Ubi notamus *Hip.* dixisse debere menstrua ex utero fluere, nam si naturalis evacuatio naturalem non servet viam, adhuc morbosa est, ut si per vomitum menstrua fluere, quamvis nimis periculosa omnimoda suppressio. Quod dixit *Hip.* de menstruis, accipiendum est de qualibet

evacuazione, & retentione. Undè.

Si alvinæ fæces debito non excernantur tempore, coctionem interturbant, inappetentiam causant, & nauseam excitant, quia ex fæcibus foetidi sulphuris effluviū elevatur, & ad ventriculū, vicinasque partes exhalat, dolores excitat colicos, flatibus exitu prohibitis, & alia mala. Si caput feriant excrementitii vapores, vertiginem, cephalalgiam, aliosque inducunt languores. Alvus nimis lubrica potius commodum, quam in ommodum affert, dūm lævior facta est in ventriculo aliqua ingestorum, vel humorum degeneratio, & mox sese exonerat, aut ex reliquo etiam corpore natura validior viarios per alvum sponte excernit humores, & multorum morborum causas avertit; attamen si frequentius, aut diutius contingat, corpus necessariō aimento defraudatur, & contabescere incipit, vires constentur, & non tarō intestinala relaxantur, vel abraduntur. Undè Lenteria, Cœliaca, dysenteria, tenesmus, & alia oborūntur mala. Si verō alvi excrementa secundum naturam se habeant, mollia sint, mediocrem habentia consistentiam, colore subtrusa, nec admodū foetida, copiā autem ingestis respondeant, tunc salubrem indicant statum.

Eodem pariter modo, si urina debito reddatur tempore, corpori confert; Si verō citius iusto excernatur, diabetem inducit; Si verō diutius retineatur, multum damni affert: solet namque non solum vesicam, partesque vicinas gravare, sed sæpè vesicam aded replere, &

D. Caroli Musitani Tom. II.

distendere, ut postea contrahi, atque urina excerni non possit, undè interdū vesicæ inflammatio sequitur, imò mortis occasionem hac ratione quibūdam accidisse ex pudore in conviviis, urinæ suppressionem diurniorem experientiā comperitum est. Hinc tam urina, quā alvi fæces non diutius retineantur, sed debito excernantur tempore juxta illud:

Nec missum retine, nec comprime fortiter anum. Hinc superflua humiditate, quæ nostro corpori nutrimento sunt ineptæ, partim insensibiliter perspirant, partim etiam per sudores exturbantur, & magna earum pars per vesicam excernitur, si per vasa lymphatica ad renes non delabatur, & in vesicam non profundatur, cachexiæ, & hydropi causam supeditat.

Verūm urina naturalis his conditionibus fruidebet, nempe mediocri debet esse consistentiæ, coloris fulvi, sine sedimento, aut cum sedimento albo, lævi & æquali, quantitate liquidis assumptis respondens.

Eadem est reliquorum excrementorum ratio, ut sputi, muci, & præsertim flatuum, ex quibus retentis multa oborūntur mala, ut

Quæ non ex vento veniunt in ventre retento,

Spasmus, hydrops, colica, vertigo, quæ non ista.

Hæc enim communis est naturæ lex: excrementa excernenda esse, ut nutrimentum ex omni parte purum corpori suppeditetur, quod si fiat, nutritio quoque recte fit, corpusque vegetum, benè coloratum, &

D omni-

omnino sanum evadit. Si verò eadem detineantur, alimentum inquinatur, corpus redditur impurum, & tandem morbi excrementis suppressis cognati succrescere solent.

Sudorem inter excreta, & retenta connumeramus, ea quippe quæ crassa corpora extenuare valent, & fluidiora reddere, sudores promoven. Sic in vehementi calore sudor excitatur, dum aquositates, vel humores attenuati in sudorem resolvuntur: quemadmodum distillationibus solet contingere. Salubris est sudor, si intra suos coercetur fines, nam per cutis poros toto corporis ambitu, & habitu noxios purgat humores. Nulla febris nisi sudore perfecte terminatur, imò inveteratis affectibus crassos, lentosque humores solventibus, ut distillationibus distis diuturnis, cephalalgiae, paralyti, epilepsiae, lvi Venereæ, pectoris hydropi, reumatismo, ischiadi, & aliis articulorum doloribus, utiles sunt sudores. Si verò suos transgrediatur limites, nativi calidi aliquid dissipat, corpus dissolvit, vires deficit, tabefacit, morbum, & symptomata multiplicat, & si frigidus, & diaphoreticus sit, mortem præ foribus portendit.

Huc etiam refertur insensibilis transpiratio idest transporatio, quæ si aliquandiu prohibeatur vel pororum conspicatione à frigore, vel pravis humoribus retentis, gravissimos excitat morbos; Si verò conveniens, & legitima sit corporis transpiratio, corpus sanum, & bene dispositum reddit.

Sed in his evacuationibus spatium aliquantulum nobis placeat, & primò ab urinæ exordium facimus: Per solitas urinæ vias superfluas nostri corporis humiditates expelli omnibus manifestum est, sed quomodo, & ubi secernatur urina, non omnino hæc sententia patuit, vulgares medici putant urinæ materiam sanguini permixtam per universum corpus deferri, & postremò per venas emulgentes ad renes delabi, ibique à sanguinis massa secretam percolari, & per proprios canales, ureteres appellatos, ad vetricam profundum. Verum experientia docet sanguinis serum non esse ejusdem, aut similis substantiæ cum urinâ; nam serum sanguinis, si ad ignem evaporet, in crassam, & glutinosam concrevit substantiam, & valde durefcit, quod tamen non contingit urinæ, quæ plurimo sale cum volatili, tum fixo conferta esse deprehenditur. Porro venæ emulgentes sanguinem non ferunt ad renes, sed à renibus ad venam cavam: neque secus atque aliæ replentur aliâ substantiâ, quàm sanguine. Venarum igitur emulgentium usus idem est, atque aliarum venarum: & munus, quod illis vulgares adscribunt, verum est commentum. Urinæ autem unica tantum via est scilicet per venas lymphaticas, spirituosâ pars in ventriculo mediante fermentationis motu, quæ è cibis educitur, per fibras se insinuat, quasi per filtrum, per totum corpus se diffundit ad animantis sustentationem, in itinere aquosas superfluitates in venas hydroticas, seu lymphaticas à Thomâ Bartholino inventas per oscilla depo-

nit, partim per diaphoresim resolvitur, partim etiam per sudores eliminatur, sed magna pars per dicta vasa lymphatica ad renes, & deinde in vesicam profunditur.

Operæ autem pretium erit hic animadvertere aperiencia à medicis pluribus modis considerari; nam alia sunt, quæ alvum laxant, alia, quæ urinam ciunt, alia, quæ venarum, & arteriarum oscula recludunt, alia, quæ viscerum obstructions referre dicuntur, & alia, quæ cutis poros pervios, & magis permeabiles efficiunt. Scimus isthæc à multis confundi, sed etrotis, & periculi plena est illorum consideratio. Cæterum hæc distinguere oportet, nec unum pro altero sumere: nam multa videmus urinam ciere, quæ alvum adstrictionem reddunt; Ea, quæ diaphoresim promovent, reliquas plerumque evacuationes cohibent. Hinc est, quodd illis sæpenumero adstricta est alvus, qui copiosam minguunt urinam: illi vero parcius meunt, qui plurimum sudant. Neque ulla major est in corpore evacuatio, quàm insensibilis transpiratio. Adde, quodd hæc præ ceteris ad valetudinem plurimum conferre videtur, nam reliquæ evacuationes possunt sine valetudinis noxâ aliquandiu retineri: hæc autem, si brevissimo temporis spatio intercipiatur, notabiles parit morbos.

Atqui videmus nonnulla esse, quæ alvum cieant, alia, quæ urinam provocent, alia, quæ sudores, alia, quæ sanguinem per venarum oscilla exsudare faciant, inquirendum profecto foret, qua vi ejusmodi producantur affectus; nam quod medici

ajunt hæc fieri propria, & insita rerum facultate, sed hoc philosophi cupiditatem nequaquam explere videtur. Nobis verosimile videtur alvum citari ab his, quæ vellicare, & stimulare ventriculum possunt: quemadmodum nasipurgia stimulum naribus admovendo, sternutationem, & humorum illapsum promovent: & quæ palato ingrata sunt, salivam copiosius excitant. Quæcumque vero salis naturam præferunt, urinam ciunt, naturam enim ad evacuationem stimulant. Et quia vegetabilium salia possunt ejusmodi stimulos excitare, idcirco ad promovendam urinam valde conferunt. Similiter, quæ corpora extenuare apta sunt, sudores promovent. Denique menstrua, & hæmorrhoides excitantur ab his, quæ sanguinem extenuare valent, aut acriorem facere, ut propterea venarum oscilla aperire queant.

Non solum excreta, & retenta morbos generare possunt, verum si utilia intempestivè, atque immoderate evacuentur, vires dejiciunt, corpus consumunt, & morbos illis affines excitant. Sic repletio vel ratione multitudinis, vel prævæ qualitatis, vel ratione non rectè operantis ventriculi, corpus alterat, & morbos parit. Ratione multitudinis ventriculi vis obruitur, & resistentem multitudinem superare non potest, ingesta corrumpuntur, & non fermentantur, ac multitudo corrupta nisi vomitu, vel diarrhœâ evacuetur, ventriculi actionem irritat, & irritat, ut omnes ventriculi actiones depravatas, & inordinatas efficiat, quibus depravatis,

pellimi moris morbi contingunt. Hinc *Hip. 2. aph. 22.* inquit: *Quicumque morbi ex repletionibus fiunt, evacuatione curantur, & quicumque ab evacuatione, curantur repletionibus, & aliorum contrarietate.* Idemque peculiariter ostendit *2. aph. 51.* *Plurimum atque resistentius evacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, sive quovis alio modo corpus movere periculosum: omne enim nimium natura inimicum, sed quod paulatim fit, tutum est, cum aliis, tum cum ab alio ad alterum transit fit.* Ratione pravæ qualitatibus ingestorum non solum ventriculi actio à promovendo in iis fermento desistit, sed principium motus ipsius actionis à pravâ qualitate ad depravatè movendum adigitur, totamque ventriculi æconomiam subvertit, & per consequens proprium nutrimentum degener reddit, quod si citò ad statum secundum naturam non adigitur: multorum morborum erit occasio. Ratione non rectè operantis ventriculi, vel fermentatio, vel separatio utilis ab inutili depravatur, undè congeries fit in illo superfluitatum, quibus assuefactus ventriculi rector spiritus non adeò vehementer in suis motibus turbatur, undè est, quod superfluitates illæ potius chronici morbi, quàm acuti occasiones esse possunt; obstructions enim inappetentiæ, affectiones hypochondriacæ, ariditæ, tabes, hydropes, & similes morbos inducere solent.

Magna est cibi, & potus vis

in alterandis nostris corporibus, enimverd quicumque cibis etiam familiarissimus, & consuetus nequit corpus alere, nisi mutetur, & assimilatur, ut vulgò medici loquuntur: atqui hæc assimilatio, & mutatio non potest fieri sine aliquâ ipsius animalis alteratione, quippe *omne agens* [ut est vulgare enunciatur] *agendo patitur*: igitur necessarius cibis, & potus corpora nostra afficere debent. Sed illud inter cætera hic venit observandum, quod varia, & multiplex est ciborum natura, neque omnibus æquè salutaris, aut noxia. Quinimmo inveniri solet peculiaris quædam hominum dispositio, quæ à rebus communiter salubribus maximopere lædantur. Sic nonnulli non minùs à carne, aliavè simili re afficiuntur, quàm à Lethali veneno, quantum autem in ciborum ratione ciborum valeat consuetudo, vix facile est enarrare; nam & ipsis quoque venenis homines vesci assuevere. Aphri plerique opio valdè delectantur, & integras ejusdem drachmas devorant, & nota est Mithridatis, & aliorum historia, qui longo usu didicere venenis pasci. Indi tabacum devorant, ut inebrientur, & in mentis alienationem inducantur. Nec vinum ex suâ ipsius naturâ nobis familiaritate, & amicum est, sed tale potius usu solet evadere. Id quod cibis non valetudinem modò potest immutare, sed mores etiam, & quodammodò naturam.

CAP. IX. De sexrerum nonnatur. in ulcer. regim. 29

Excreta igitur, & retenta in ulceratis ad ordinatas leges debito modo revocanda arbitramur, præcipuè menftruorum in fœminis fluxus solitus promoveatur, infenfibilis transpiratio non impeditur, fic urina, lac, & faliva, ut & alvus fit lubrica naturâ, vel atte.

Inter ea, quæ excernuntur, vel retinentur, Veneris ufum collocamus, eisdè amorem cum Venere confiderandum putemus, nam ut amor profectò in animi affectibus effecet recensendus. Cæterum maximam esse Veneris vim, ejusque ufum magnoperè seu officere, seu prodesse manifestum est, & virginibus, & viduis, quæ ob fœminis retentionem in graviffimâ sæpenuerò incurrunt Symptomata, ut interdum mortuis fimiles decumbant. Pariter & importunus ejusdem ufus plurimos infert morbos, podagram, chiragram, petulantem fenectutem, aliosque quamplurimos languores.

Veneris ufus moderatus valetudini confert, homines namque hilares reddit, calorem excitat naturalem, appetentiam acuit, fenfus, & spiritus vivificat, animi paffiones lenit, corporis torporem eliminat, membris levitatem conciliat, & tandem species perennat, undè consonum est per Veneris ufum, ut vitam, quam à patentibus hauimus, aliis restituamus, nè cum campanæ fonitu noftra peteat vita. Hinc merito Galenus Epicuri fententiam dam-

navit, qui Venerem nihil proisus ad valetudinem conferte docuit. Atas veneri aptiffima est juvenibus atque viris.

Cæterum immoderatus Veneris ufus viros magis, quàm fœminas lædit, spiritus namque diffipat, nativum refolvit calorem, univerfum refrigerat corpus, cerebrum, oculos, & articulos, nervos, & ventriculum debilitat, triftitiam parit, fed non in fœminis, undè memoriæ, intellectionis, fenfuumque imbecillitatem infert, vitam breviat: præ omnibus fenibus, naturis ficcis, debilibus, & convalefcenribus plurimum Veneris palæftra nocet. Quæ ratione Venus ab Epicuro damnabatur, quia, cum summum bonum in refectacorporis constitutione, & valetudine collocaret, [hanc enim ille voluptatem appellabat] Venerem refpuebat, utporè quæ valetudinis commodo officeret. Hinc autem est, quodd mulis, monachis, cœlebem vitam agentibus longior fit vita, quàm afinis, & equis, abftinent enim plerumque illi à Venerere. Si femen diutius retineatur, corporis torius gravitatem, & torporem inducit, & fi corrumpatur, graviffima Symptomata, qualia virginibus, viduis, & uxoribus, quæ ignavos habent matricos, excitat. Veris tempus magis Veneri est idoneum, deinde hyemis minùs autumnus, omnium minime æftas, quo tempore est omninò abftinendum, hinc poëta cecinit;

*Est Veneris fugienda tibi immoderata
voluptas
Nam capiti, mentique nocet, sensusque
retundit,
Virentemque hebetat animalein, &
corporis omnes
Debilitat nervos, infirmæque pectora
redat.
Parca tamen laudanda quidè est:
hæc una calorem
Excitat, hæc bilares animos facit:
indè sequenda
Membrorum leuitas, torporem expellit,
& infert
Spiritus vitam, præsertim ubi purpureum
ver,
Autumnus suæ expōit maturus
honorem.
Tandem hyeme, atque æstate Venus
lethale venenum est.
Crebra Venus nervos, animum, vim,
lumina, corpus
Debilitat, molles, subripit, orbat,
edit.*

Ad hoc ut Venus valetudini conferat, duæ requiruntur conditiones, una, ut ejus usus sit moderatus; altera, ut debito fiat tempore, unde si sub his adhibeatur conditionibus, homo sit seipso agilior, atque melius perspirans: moderatus verò ejus usus consistit, ut homo ex eo non debilitetur, & nullo modo laxetur. Ceterum nonnulli tempus, & horam præscribere solent, in qua sine valetudinis noxâ Venus obiri possit, hanc aliqui dixere esse horam noctis tertiam, quod hoc tempore prima, & secunda coctio jam absoluta, & tertia etiam est dimidio facta. Verum hæc vana, & ridicula sunt, nec quisquam erit, qui hæc admissim sibi servanda persuadeat,

Hippocrates creditur Veneris tempus perscripisse, cum dixit: *Labor, cibum, potus, somnus, Venus, omnia mediocria*, quasi hæc omnia eo ordine, quo scribitur, obiri debeant, ut primò sit laborandum, & corpus exercendum, deindè opportunum alimentum sit præbendum, & conveniens potus, tertio dormiendum, & postremò Venus à somno sit exercenda. Ab hac Hippocratis sententiâ discrepat *Cornelius Celsus*, qui salubriorem ait esse Venerem interdiu, quam sequitur cibum, quam noctu, quam sequitur labor, & vigilia.

Aliqui magis in die Venereum concubitum exerceri laudant, quia statim à prandio, vel Cœnâ, post cæteris, & Bacchi munera, spiritus promptiores, alacriores, & vegetiores sunt, a homo ardentius Veneris connubia celebrat. Quidem noctu potiùs, quia calor per somnum, & tenebras intus collectus melius coctionem perficit, & phantasia ab aliis objectis non distracta melius veneris dulcedini incumbit, & pudor, cum sit veneri inimicus, & in nocte nullus sit pudor, nocturnum tempus Veneti magis arridet.

Verum in Veneris usu plurimum valet consuetudo, & particularis quædam subiecti natura; nam alii alacrius noctu, alii promptius, & fortius interdiu hoc munus obeunt: alii pleno stomacho melius, alii commodius jejuno stomacho. Quapropter non potest homo in Veneris usu exquisitâ uti methodo, nè aliquem committat errorem, præcipue si libidinis æstro percitus occasionem habeat promptam, ac proindè ad valetudinem tuendam in omnibus non

non oportet medicis credere, qui nè nihil dicere videntur rerum quarumdam usum, & præsertim in rebus venereis, ubi *trahis sua quemque voluptas*, & omnino errores sunt inevitabiles ob innatum species propagandi desiderium. Qua de re consulendæ sunt in hac materiâ mulieres, quia ipse noster, & die, & toties, quoties occasio dabitur, Veneri indulgendum esse assument.

Juvat in majorem conjugum commoditatem jucundis digressionibus aliquantulum in Veneris palestrâ spatium circa modum, quo quisque uti possit, sed, quia verecunda res est, & noster o cœlebatûs statui abscondenda, nè pagina evadat impudica, esto non erubescat, & castæ nè lædantur aures, pauca leviter attingemus.

Quidam medici, ut Arabes, figuram damnant, in qua vir mulieri subijcitur, quia laborat vir in seminis emissionem, & non raro in veretrum aliquod descendit excrementum ex utero, quod plurimum obesse potest, præcipue si spurca fuerit mulier lue Venereâ. Addimus & nos utrorum semen intra uterum ejaculari non posse, sed in emissionem per veretrum labi, & foras excerni.

Alii commendant, ut coitus quadrupedum more exerceatur, ita Arabes medici, *Mercurialis lib. 2. de morbis mulierum*, *Paulus Ægineta*, & quamplurimalii. Et reverà hic modus naturalis est, cum omnibus animantibus sit communis, & Veneris furtis commodior, ac compendiosior; nam sic vir angustè concumbit, penis capulo tenus admittitur, præsertim si mulier aliquantu-

lùm inclinata decumbat. Præterea ad concipiendum maximopere confert, si à tergo belluatum more vir cum muliere Venere utatur, ita philosophans cecinit *Lucretius lib. 4.*

Et quibus ipsa modis traheatur blanda voluptas,

Id quoque magni refert. Nam moresciturum,

Quadrupedumque magis ritu, plurimumque putantur

Concipere uxores, quia sic loca sumere possunt

Pectoribus positæ, sublatis semina lumbis.

Imò si mulier sit sterilis, hoc modo fecundatur, ut *Q. Serenus Gordiani Imperatoris præceptor*, cum scripsit super hic *Lucretii carminibus*:

Irrita conjugii sterilis si munera languent,

Nec sobolis spes est, multos jam vana per annos

Fœmineo fiat vitio res, nec nè, si lebo.

Hoc poteris magni quartus monstrare Lucreti.

Qui modus non est ita explosendus, ut secundum magnam non habeat rationem, & potius dictu turpe, quam factu videatur. A tergo coitum conceptum juvare ostendunt, confirmantque peritorum anatomicorum observationes, qui observarunt, ut semen virile rectè uteri orificium percuteret, ab eodemque attraheretur, naturâ ita fabricasse viri foramen in inferiori glandis parte, atque uteri os ad superiorem pudendi regionem, ut in naturali copulâ more omnium animalium factâ, hæc duo foramina ita è directo sibi mutuo occurrant, ut semen è co-

è coleprodiens', statim in utero, nullà aliâ re impedito concipiatur, adduntque hunc solum generandi gratiâ esse naturalem coeundi modum: ita enim dicunt mulieres naturalem illum brutorum coeundi modum minus laboriosè sustinere, frænum, & nympham invicem atteri, quæ patres præcipuè sedes sunt ad coeundum in utroque sexu feminis motum, tandemque oscula genitalium sibi mutuè è directo occurrere,

Huic anatomicæ observationi addimus, & nos ita virum cum uxore utero gerente concubescere, ut absque abortus suspitione immoderatum Veneris usum exercere posse, aliàs facie ad faciem præcipuè si vir concubens in seminis emissionem moretur, vel fortis sit, abdominis musculos comprimit, vel ligamenta, quibus fœtus utero annectitur, rumpit, uterum agitando, vel vasa umbilicalia rumpendo, & fœtum agitando, abortus causa esse possit. Et nos multos viros novimus, qui cum prægnantibus uxoribus facie ad faciem coeuntes, præter abortum, earum fuerunt causa necis: imò aliquos, quos nos, & alii cognoscimus hos usos dolo, & incutias necarunt uxores, & ad secundas transierunt Nuptias.

Scimus nonnullos pecudum more naturalem coeundi modum explodere; ac veluti Gorgonis capite percitos contremiscere, illumque tanquam nefandum recensere, & inter capitalia referre crimina, ac proinde ut naturæ humanæ dissonum ab hominum memoriâ delendum, & eliminandum fore credunt; Cœte-

rùm dulciter decipiuntur, non enim anatomicorum demonstrationes, medicorum observationes, & ecclesiasticorum scriptorum doctrinas calant.

Unum *Thomam Sanchez* præ cæteris referemus, qui in inculcato matrimonii-usu examinando, omnes superminet, *Tomo 3. lib. 9. Diss. 16.* aliquandò situs inversionem omnino culpâ vacare probat: videlicet, ubi non captandæ voluptatis gratiâ accidit, sed aliquâ justâ causâ intercedente, ut quia corporis dispositio aliud non patitur ob pinguedinem viri, vel propter suffocandi fœtus periculum in prægnante, vel aliâ simili honestâ causâ occurrente, & cum eo se omnes DD. conveniunt, probantque hunc modum non solum non esse capitale peccatum, verum etiam licitum culpâ vacare, & in aliquibus casibus esse præceptum. Quod si in justâ causâ licet, non licet, quia malum, sed quia bonum, si bonum in justâ causâ etiam quomodolibet bonum, quod enim est tale, semper est tale. Præterea, remota justâ, & honestâ causâ, idem author variis rationibus culpâ lethali vacare docet, quia servato legitime vase, solus situs, & concubendi modus variatur; naturalis enim est, quia mulier est succuba, & vir incubus, vir agens, & femina patiens. Insuper ordinis perversio est in solis accidentibus, cum vas legitimum observetur, & modus est accidens. Tandem præposterè non impediunt generatio, imò ad concipiendum maximè confert, & præcipuè si mulier si sterilis, hoc modo fecundatur; nec adeo effusio-

nis seminis extra vas periculum, quia semen rectè ad uteri fundum ejaculatur, præsertim si mulier aliquantulum inclinata succumbat: cum igitur in sitûs inversione servetur finis matrimonii legirimus, qui est sobolem concipi, est inordinatè quærat delectatio intra matrimonii limites, culpâ vacare capitalli, & licitè exerceri posse putamus.

Alium eodèndi modum alii commendant, nempe facie ad faciem, præsertim si mulier formosa sit, ita cecinit *Naso lib. 3. de arte amandi*:

Qua facie præsignis erit, resupina jaceo:

Spilletur tergo, cui sua terga placent.

Cæterum hic modus est meræ hominum lasciviorum delectationis inventum, qui oscula, mammarum contactus, aliasque delicias generationi nihil famulantes quærant. Undè positum, quo venter ventri, pectus pectori, & os ori admoveatur, sat celebrare nequeunt, pro cuius commoditate, ut nudi in letto cubant, etiam subuculâ spoliati præcipiunt: sed hæc dicta sint theoricè, non verò practicè.

Sed in dubium vertunt authores, an accensâ candelâ Veneris scelus celebrari debeat? Pro qua re dicunt, si deformis sit mulier, aut vecerunda nimis, exerceatur in tenebris; si verò maximè formosa, tria accendantur lumina.

Post celebratum hymeneum laudandi sunt illi viri, & mulieres, qui statim à Venere genitales partes siccant, vel urinâ abluunt; solent enim quædam fordes genitalibus adhærere, quæ ni tollantur, brevi

D. Caroli Musiani Tom. II.

contactu pustulas inducunt.

Cæterum hic eam tantum Venerem intelligere protestamur, quæ ad generis humani propagationem spectat, modo legitimo, & divinis legibus concessio; neque enim ad valetudinem servandam illicitâ Venere quisquam uti debet, sed simul uterque finis coire, & conjungi potest, scilicet ut liberis opera detur, & sanitatis corporis habeatur ratio: nihilque valetudini conservandæ gratia tentare opus est, quod legibus divinis sit contrarium: & Creator homini tantum, & hac in re indulget, quantum ad omnia, quæ sanitati obesse possunt vitanda, est necessarium.

Verum quia non omnes esse possunt licito hymeneo conjuncti, & plerique castitatem servare vel volunt, vel debent: quomodò isti, quibus Venus est omnino interdicta, se gerere debent, postremò inquiremus oportet.

Primò, prohibeatur seminis generatio, vel resolutio multis laboribus, & vitâ parsimoniâ cum omnimodâ à vino abstinentiâ, nam *sine Cerere, & Baccho friget Venus*. Sancti patres ad servandam castitatem frequenter orabant, & jejunabant, nam *hoc genus daemoniorum non ejicitur nisi in oratione, & jejunio*.

Secundò extenorum habenda est ratio, juxta illud:

Quid facies facies. Veneris cum Veneris aule?

Nè sedes, sed eas, nè pereas per eas. Et *Lucretius lib. 4. de rerum natura* à his verbis mulierum aspectum fugiendum esse suadet:

è coleprodiens, statim in utero, nulla aliâ re impedito concipiatur, adduntque hunc solum generandi gratiâ esse naturalem coeundi modum: itâ enim dicunt mulieres naturalem illum brutorum coeundi modum minùs laboriosè sustinere, frœnum, & nympham invicem atteri, quæ partes præcipuæ sedes sunt ad coeundum in utroque sexu feminis motum, tandemque oscula genitalium sibi mutuo è directo occurrere,

Huic anatomicæ observationi addimus, & nos itâ virum cum uxore utero gerente concubere, ut absque abortûs suspitione immoderatum Veneris usum exercere posse, aliâs facie ad faciem præcipuè si vir concubens in seminis emissionem moretur, vel fortis sit, abdominis musculos comprimit, vel ligamenta, quibus fœtus utero annectitur, rumpit, uterum agitando, vel vasa umbilicalia rumpendo, & fœtum agitando, abortûs causa esse possit. Et nos multos viros novimus, qui cum prægnantibus uxoribus facie ad faciem coeuntes, præter abortum, earum fuerunt causa necis: imò aliquos, quos nos, & alii cognoscimus hos usos dolo, & incautas necarunt uxores, & ad secundas transierunt Nuptias.

Scimus nonnullos pecudum more naturalem coeundi modum explodere; ac veluti Gorgonis capite percitos contremiscere, illumque tanquàm nefandum recensere, & inter capitalia referre crimina, ac proindè ut naturæ humanæ dissonum ab hominum memoriâ delendum, & eliminandum fore credunt; Cœte-

rùm dulciter decipiuntur, non enim anatomicorum demonstrationes, medicorum observationes, & ecclesiasticorum scriptorum doctrinas calant.

Unum *Thomam Sanebez* præ cæteris referemus, qui in inculpato matrimonii usu eximino, omnes superminet, *Tomo 3. lib. 9. Diss. 16.* aliquandò sitûs inversionem omnino culpâ vacare probat: videlicet, ubi non caprandæ voluptatis gratiâ accidir, sed aliquâ justâ causâ intercedente, ut quia corporis dispositio aliud non patitur ob pinguedinem viri, vel propter suffcandi fœtus periculum in prægnante, vel aliâ simili honestâ causâ occurrente, & cum eo se omnes DD. conveniunt, probantque hunc modum non solum non esse capitale peccatum, verum etiam licitum, culpâ vacare, & in aliquibus casibus esse præceptum. Quod si in justâ causâ licet, non licet, quia malum, sed quia bonum, si bonum in justâ causâ etiam quomodolibet bonum, quod enim est tale, semper est tale. Præterea, remota justâ, & honestâ causâ, idem author variis rationibus culpâ lethali vacare docet, quia servato legitime vase, solus situs, & concubendi modus variatur; naturalis enim est, quia mulier est succuba, & vir incubus, vir agens, & femina patiens. Insuper ordinis perversio est in solis accidentibus, cum vas legitimum observetur, & modus est accidens. Tandem præposterè non impeditur generatio, imò ad concipiendum maximè confert, & præciue si mulier sit sterilis, hoc modo fœcundatur; nec adest effusio-

nis seminis extra vas periculum, quia semen rectè ad uteri fundum ejaculatur, præsertim si mulier aliquantulum inclinata succumbat: cum igitur in sitis inversione servetur finis matrimonii legimus, qui est sobolem concipi, estò inordinatè quærat delectatio intra matrimonii limites, culpà vacare capitali, & licitè exerceri posse putamus.

Alium cœundi modum alii commendant, nempe facie ad faciem, præsertim si mulier formosa sit, ita cecinit *Naso lib. 3. de arte amandi*:

Qua facie præsignis eris, resupina jaceo:

Spilletur tergo, cui sua terga placeant.

Cæterum hic modus est meræ hominum lasciviorum delectationis inventum, qui oscula, mammarum contactus, aliasque delicias generationi nihil famulantes quærunt. Undè positum, quo venter ventri, pectus pectori, & os ori admoveatur, sat celebrare nequeunt, pro cuius commoditate, ut nudi in letto cubant, etiam subuculâ spoliati præcipiunt: sed hæc dicta sint theoricè, non verò practicè.

Sed in dubium vertunt authores, an accensa candelâ Veneris scelus celebrari debeat? Pro qua re dicunt, si deformis sit mulier, aut verecundanimis, exerceatur in tenebris; si verò maximè formosa, tria accendantur lumina.

Post celebratum hymeneum laudandi sunt illi viri, & mulieres, qui statim à Venere genitales partes siccant, vel urinâ abluunt; solent enim quædam sordes genitalibus adhærere, quæ ni tollantur, brevi

contactu pustulas inducunt.

Cæterum hic eam tantum Venerem intelligere protestamur, quæ ad generis humani propagationem spectat, modo legitimo, & divinis legibus concessio; neque enim ad valetudinem servandam illicitâ Venerere quisquam tui debet, sed simul uterque finis coire, & conjungi potest, scilicet ut liberis opera detur, & sanitatis corporis habeatur ratio: nihilque valetudini conservandæ gratia tentare opus est, quod legibus divinis sit contrarium: & Creator homini tantum, & hac in re indulget, quantum ad omnia, quæ sanitati obesse possunt vitanda, est necessarium.

Verùm quia non omnes esse possunt licito hymeneo conjuncti, & plerique castitatem servare vel volunt, vel debent: quomodo isti, quibus Venus est omnino interdita, se gerere debent, postmodò inquiramus oportet.

Primò, prohibeatur seminis generatio, vel resolutio multis laboribus, & viduus parsimonia cum omnimodâ à vino abstinentiâ, nam *sine Cerere, & Baccho friget Venus*. Sancti patres ad servandam castitatem frequenter orabant, & jejunabant, nam *hoc genus demoniorum non ejicitur nisi in oratione, & jejunio*.

Secundò externorum habenda est ratio, juxta illud:

Quid facies facies. Veneris cum veneris aute?

Nè sedas, sed eas, nè pereas per eas.

Et *Lucretius lib. 4. de rerum natu* his verbis mulierum aspectum fugiendum esse suadet:

*Sed fugitare docet simulacra, & pa-
bula amoris*

*Absterrere sibi, aique aliò converte-
re mentem.*

Unde mulierum imagines cavendæ, epistolæ amatoriarum mulieris haud legendæ, nec amatorij libri, & præcipuè earum fugiendus aspectus, id nos docet rudis asellus, qui onustus, & labore consumptus, visâ asellâ, statim rudis, qui paulò antea neque minis, neque clamoribus, aut verberibus ad motum concitati poterat, currit postea onustus, & fatigatus suam tentat explere libidinem: Videte, quantum valeat rei amoris aspectus! Et denique sermones impudici, conversationes fœtidæ, & omnia alia vitanda, ut in eodem asello didicimus, qui statim, olfactâ asellæ urinâ, ad Venerem incitatur, & dum nos aliquem in pariete mingentem vidimus, statim mingere cogimur, quia tunc acrimoniam advertimus, quàm antea, quia mens aliò vagabatur, non advertebamus, ita etiam & spiritus sensitivus molestans, qui antea ob inadvertentiam non sentiebat, quia postea propter pravam consuetudinem advertitur, mirè nos angit, & ad Venerem movetur.

Est itaque Veneris usus ulceratis vitandus, ne breve illud dulcedinis tempus diuturna reddat ulcera.

Tandem moderata animi pathemata ad conservandam totius corporis constitutionem non solum maximam habent energiam, sed corpus à naturali statu in morbos conjicere, & interdum subitè morti dare possunt immodici eorum excessus, ac propterea medicis fuerit, diligen-

ter in eorum, quorum cura sibi concredita est, affectus inquirere, ut si quos vehementiores adesse animadvertat, eos quantum potest corrigere, & si quid mali sanitati asserere possint, ostendere. Cæterum animi motus in toto corpore non parvam efficiunt mutationem, tamen illud membrum imprimis, & maxime afficitur, quod primò in affectibus movetur. Fiunt hi subiti motus vel à corporis centro ad circumferentiam, ut est ira, gaudium &c. vel à circumferentiâ ad centrum, ut timor, mœror &c. Qui igitur incolumem vitam servare cupit, animum sedatum, & tranquillum aucupari, & vehementibus passionibus resistere debet. Verùm quia impossibile est ab omnibus animi pathematibus sese immunem reddere, adnendum propterea summâ rationis vi illis obistere, eorumque impetus coercere.

Benignæ animi passionēs sunt gaudium, & spes, exteræ verò dicuntur malignæ, & à Platone animi ægritudines nuncupantur, & non solum sunt ira, timor, mœror, invidia, pudor, desperatio, sed etiam anxietas, exclamatio, impetus, rixa, odium, temeritas, audacia, incontinentia, iniquitas, & omnes alij similes animi motus, qui si modum excedant, magnas in corpore efficiunt mutationes.

Pro tuendâ tamen valetudine, & naturali corporis constitutione aptissimus, corporique nostro amicissimus affectus est gaudium; spes namque cum sit futuri boni expectatio, est afflictorum medicina; gaudium itaque moderatum, & non re-

penitum ad conservandam valerudinem principem tenet locum, totum enim corpus, atque imprimis cor, & spiritus vitales recreat, calorem, spiritus, & sanguinem à centro ad corporis periferiam diffundit, undè functionum vigor excitatur, corporis habitus nutritur, humectatur, vido, ac florido suffunditur colore, senectus retardatur, & vitæ tempora producuntur, tandem multos præ solo gaudio morbos evasisse observavimus. Si gaudium sit immodicum, vel repentinum, cor relaxat, nam in gaudio spiritus à centro ad circumferentiam moventur, veluti dilata-tione quadam factâ ad præsentis objecti fusionem, spiritus nimium dissipat, ad externas diffundit partes, dissolvit, qui cor deserunt, & internas refrigerant partes; undè ex nimio gaudio, vel repentino molos in syncopen incidisse compertum est & interdum plerique exemplo occubuisse historiz testantur.

Sicut gaudium animi securitatem, placiditatem, & quietem affert, irâ mœstitia, quæ gaudio est opposita, quia spiritus, & sanguinem à corporis circumferentiâ ad centrum retrahit, oppositos inducit affectus, nam subitas mutationes in corpore, ut terror panicus, non efficit: tamen sensim, & pederentim id plurimum immutat; nativum enim debilitat calorem, corpus refrigerat, siccatur, dissolvit, faciem reddit decolorem, pulsusque imminuit ob cordis constrictionem, interdum febrem ob prohibitam transpirationem accendit, coctionem vitiat, vigilias inducit, spiritus obtenebrat, ingenium

obtundit, memoriam debilitat, rationem impedit, & insaniam inducit. Naturalis facultatis imbecillitatem parit, spiritus, & sanguinem ob frigiditatem crassiores reddit, & hinc morbos melancholicos inducit à quibus non facillè tristes se extricant.

Ira, cum sit sanguinis accensio, sive ebullitio circa cor propter appetitum vindictæ, spiritus, & sanguinem turbat, exagitat, accenditque; ea propter spiritus, & sanguis effervesceat, & cum impetu ab interioribus ad exteriora moventur, & hac ratione irati sunt rubicundiores, & ad omne scelus promptiores, corpus calefacit, pulsus augeat, accelerat, febres accendit, aliosque excitat morbos. Si valde effrænis sit ira, rationem subigit, & de sede suâ dimoveret. Patiuntur quoque irati artuum tremores, spirituum dissipationes, virium resolutiones, cordis palpirationes, convulsiones quandòque & mulieres abortum.

Cæterum quærimus, an ira aliquem interimere possit? Respondemus affirmativè, estò in irâ nec calor extinguitur, nec suffocatur, sed liberè saltè, & cum impetu per universum corpus diffundatur, nam hoc verificatur de frigidis corporibus, in his namque calor debilior exsuscitatur, vegetior redditur, vires augentur, undè his naturis irasci valde utile est. Hinc in morbis frigidis dictis excitanda est ira, & in calidis vitanda; si verd in corporibus calidis exerceatur, potest spiritus dissipare, vires dissolvere syncopen inducere, & consequenter mortem, vel ex humorum agitatio-

ne vertiginem, apoplexiam, & epilepsiam afferre potest, & postremo mortem.

Timoretiam insignes in corpore efficit mutationes, nam in hoc calor, sanguis, & spiritus exteriora deserunt, & ad cor subito revocantur, undè partes externæ algescunt, corpus pallet, pulsus fit parvus, artus contremiscunt, dentes strident, vox interrumpitur, vires concidunt: interdum alvus soluitur, & urina involuntariè profunditur ob musculorum imbecillitatem, vel resolutionem, testanturque historiæ quosdam metu mortis, & pœnarum unicâ nocte canos factos. Observatum fuit puellulum, dùm duo sui fratres majores laqueo suspenderentur, quia delicti erat particeps, & in pœnam juxta patibulum spectaculo affabat, sanguinem toto corpore sudasse. Imò in nimio timore, suffocato calore, quosdam expirasse compertum est. Non ita tamen lædit timor, ut aliquando etiam aliqua commoda non afferat, nam quandò moderatus est, & præcipuè in corpore calido, solet calidam partium constitutionem moderari, fluxiones frigiditate, quam inducit; cohibere, & furem animum reprimere. Et nos multos morbos, timore incusso, sublato observavimus.

Tandem in pudore primò sanguis, & spiritus à corde ad externas partes fertur, deindè à partibus externis ad cor se retrahit; undè in pudore sanguis, & spiritus has assiduas efficit vicissitudines, & variæ colorum mutationes brevi tempore in pedibundis conspiciuntur.

Enarratis sex rebus nonnaturalibus,

bus, communi statuimus sententiæ ex earum legitimo, & moderato usu sanitatem conservari, & languores abjici, contrà verò ex importunâ earundem administratione morbos generari, atque foveri: in omnibus itaque mediocritas seligenda est, & idèd *Hip.* inquit: *labor, cibus, potus, somnus, & Venus, omnia mediocria,* quia

Est modus in rebus, sunt certi denique fines,

Quos ultra, citraque nequit consistere rectum.

C A P. X.

De Ulcere simplici.

Illud ulcus simplex, seu vulgare dicimus, quod à sale simpliciter corrosivo, parùm exaltrato produci-tur, nec aliorum salium energiam habet adjunctam, nec ullo alio symptomate stipatur.

Signa.

Ulcus simplex omnibus corporis partibus evenire potest, tam externis, quàm internis, idque pus laudabile reddit, album, læve, æquale, & minimè fœtidum, vel ichore madet, nec symptomata habet adjuncta, ut sunt intemperies, inflammatio, erysipelas, humorum affluxus, & Cætera, de quibus in propriis capitibus dicemus, sed continui solutionem tantum in superficie habet, ita sunt herpes simplices, serpigines, scabies, & cæteræ simplices curantur excoitationes,

Causa.

Pro simplicis ulceris causa Galenici humores acres, erodentes, coque pituitosos, biliosos, vel melancholicos assignant. Cæterum ita perpetuè in omnibus ulceribus has repetunt insulsiates, & ineptias, ac semper in ulceribus hepar incusant, tanquam ulcerum officinam, ut nauseam, ne dicamus vomitum, pariant, & se ridiculose exhibeant.

Ulcus simplex, juxta nostram sententiam, provenit à sale balsami radicalis abundanti, qui per diaphoresim ad aliquam cutis partem, vel ad cutem totam, tanquam ad sentinam, & commune totius corporis emunctorium demandatur: Si ibi magis, ac magis desiccetur, corrosione acquirit, pruritum excitat, sensim excoriat cum aliquali subjacentis carnis diminutione, & partem ulcere simplici exulcerat, si sal nullà alià, quam simplici energiam imbuatur. Porro si sal fixior magis profundè exulceret, dummodò nullà alià qualitate, quam simplici corrosione partes afficiat, nec proinde curationem mutat, sed iisdem, & similibus omninò medicamentis ulcus sanari potest. Ulcus simplex non tantum à causâ internâ corpori advenit, verum etiam externâ, quæ contagio, vel veneno est expers.

Prognosis.

Simplex ulcus, quod cutem obfidet, & superficiale est, facilius, & breviori tempore curatur. Idem

dicendum est, siquam habeat cavitatem, & nullum accidens illi conjungatur.

Curatio.

Simplex ulcus simplici quoque curationis modo curatur, nam præter continui solutionem, nullum aliud accidens habet adjunctum.

Galenici in ulceris simplici curatione primò corpus purgant, si corpus sit cacochymum, nè humores ad partem affectam amplius fluant. Verum medicamenta purgantia in ulceribus nullatenus sunt adhibenda, quia, juxta nostra principia præter virus laxativum, balsamum radicale excalfaciunt, calorem pro enim in corpore humano augent, calor auctus salia exaltat, & in cutis superficiem, tanquam ad emunctorium exturbat, ibique ulceribus symptomata aggerant, ut in scabiosis compertum est, quos quò plus purges, eò scabiem pertinaciorem reddes. Præterea assignant Galenici pro ulcere cum suis humores acres, & corrosivos, sed medicamentis ad hos purgandos sunt expertes, nisi tantum de communi morborum omnium, quòd si per accidens hos purgari dicant, nullam habent certitudinem, an expurgentur, nec ne. Sufficit ulceratis alvum habere fluidam, & laxam, qua nisi potiat, languens, ea arte provitanda est. Deindè expurgatà alvo, si corpus sit plethoricum, ad phlebotomiam deveniunt. Cæterum plethoria rara est, ut muscæ albæ, & rarissimè ab optimè notæ medicis fuit observata, tantum à bardis sæpius observatur; *sufficit*

sufficit namque hos colorem faciei floridum, & rubicundum, vel corporis habitum carnosum, & bene compactum spectare, ut perperam pro pletorico accipiant. Expediit ulceratis sanguinem minuere, sed multo tutius, atque commodius eum per inediam solvere.

Postmodum in partis poris sanguinis, vel humoris effusi aliquid hærere supponunt, & ut illud coquant, id est in pus mutant, digestivum usurpant medicamentum, ita celebre est illud vulgare digestivum, quod paratur ex *cerebinthina Veneta*, oleo *rosaceo*, & ovorum vitello. Post digestivum abstergentibus utuntur medicamentis, ut

℞. Resina abjetina ℥j.

olei rosacei ℥vj.

pulv. iheris 3j. m.

Vel si majoris energiz absterfione opus sit.

℞. Mell. rosac. ℥j.

cerebinth. ℥. 6.

succi apri 3j.

pulv. iheris,

farina hordei ana q. s. m.

Absterfo, & mundificato ulcere incarnantia, seu sarcotica applicantur medicamenta, hujus farinae sunt unguenta, *basilicum*, *aureum*, de *intia*, *lithargyrio*, *plumbo* &c.

Nostri de ulceris simplicis curatione indicatio requirit, ut balsamum radicalem ad suam temperiem reducamus, & restituaus, nam simulatque suam naturam fuit temperiem, soluti continui unio in promptu erit, & est medicus illam impedire velit, non potest.

Si ulcer sit superficiale in cute, optimum remedium erit *aqua lapidis*

medicamentosi, vel *unguentum ex succis refrigerantibus* dictum, aliàs à nobis descriptum, vel præstantior erit *balsamus sulphuris*, vel *emplastrum Diasulphuris*. Cæterum si ulcer ex balsami torpore in unionem pigre abeat:

℞. Croci Martis opt. præp.

Et ulcer bis in die eo aspergatur, & infra duos dies solidatum erit. Ejusdem efficaciter erit *lithargyrium aureum* in pollinem redactum, & eodem modo applicatum. Notari tamen hic debet, quodd pulverum aspersio ablutionem cum vino tepido requirit, quorisc ulcer deligatur.

Si concoctam expurget materiam:

℞. Empl. de gratia Des.

quod optimè sit compositum, & ulcere superimponere, nam infra quatuor dies cicatricem inducit. Sed præstat *emplastrum nostrum Benedictum*. Si quomodo profundum sit ulcer:

℞. Empl. fodic.

quod ulcere impone, & infra sex dies ulcer ad cicatricem reducet. Remedia universum respicientia corpus in his simplicibus curandis ulceribus prætermittimus; necessariis enim non sunt, sufficitque tantum victus ratio cum mediocri dicta, ut curatio ex voto respondeat.

C A P. XI.

De Ulcere cum intemperie.

Sæpè accidit, ut ulcera simplicia non sint, sed alii ipsis conjungantur affectus, undè operæ pretium erit dicta ulcera per accidentium

tium concomitantiam distinguere, & secundum parvam, vel magnam accidentium pravitatem remedia applicentur oportet, quæ vel à balsamo, vel à continentibus partibus vitium auferant, & ulcus ad perfectam sanationem perducant, Agimus primò de ulcere cum intemperie in Galenistarum gratiam, quorum dogma est caloris, frigoris, humiditatis, & siccitatis, quia sæpè intemperies ulcus comitatur, quæ cum accidit, ulceris sanatio impeditur.

Galenus de diff. morb. c. 1. docet, quòd intemperies alia sit simplex, calida scilicet frigida, humida, & sicca: alia composita, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca; & hæc omnes rursus vel sine materiâ scilicet immaterialis, vel materialis. Immaterialis intemperies fit, cùm in parte ulceratâ intemperies inducitur, absque eo quod materia aliqua, aut noxius humor adheret, quemadmodum accidit in intemperie excitatâ ab igne, sole, aut calidorum corporum applicatione; materialis verò, quando in parte ulceratâ materia discrasata in eandem influit, aut eidem cumulatur, eidemque suas impertiendo qualitates, & intemperiem inducit, eandemque fovet. Cæterum vix intelligere possumus, quomodo intemperies nuda scilicet sine materiâ, absque causâ foveente in parte affectâ diù perdurare possit?

Sed has seniles primarum qualitatum fabellas, ex quarum combinatione Galenistæ cum eorum antesignano Galeno singulas singulis, unam in summo, alteram in remisso gradu elementis tribuunt, & hinc

temperamenta statuunt, præscrutari, & earundem contrarietatem ad trutinam revocare libet.

Non defuere, qui contenderent calorem, & humiditatem solum esse inter entia, & qualitates positivas connumeranda, frigus verò, & siccitatem esse potius non entia, seu mavis, privationes, nam frigus per caloris defectum sentitur, sic docente *Platone*. Et reverà frigida nobis videntur, quæcumque minùs calida sunt, tangente organo, & eadem manus pedi applicata sentitur calida, cordi verò, seu pectori apposita videtur frigida. Sic unum, idemque conclave ei, qui ex ambiente frigido ingreditur, calidum videtur, sed illi, qui ex hypocausto supervenit, videtur frigidum. Præterea nusquam est calor, nisi ubi adest causa caloris productiva. Sic ubi motus, atque agitatio est, ibi etiam calor percipitur. Calor à sole producitur æstate propter diurnam solis moram supra Horizontem, & radios solares in terram rectius incidentes, ac ob nimium motum corpusculis in aëre dispersis impressum; ex tali namque corpusculorum remissione, vel vehementiori motu, ne dum calor, verum & ignis excitatur, quia in illâ agitatione, & corporum confictu semina ignis suscitantur, undè ignem actualem sæpillimè elici à nobis fuit observatum. Eapropter ignem à calore, & calorem ab igne non differre multis rationibus, & experimentis in nostra *Pyrotechniâ* fusiùs probavimus. Hyeme nullum est Sydus frigoris productivum, sed sufficit ad inducendum frigus, si desint causæ, quæ calorem pro-

progignere valeant, undè si solares propellat radios, caloris fons prorsus extinguitur. In locis, quæ circa terræ polos existunt, frigus intollerabile prædominatur, propterea quòd ibi minùs valet solis efficacia: Addimus, quòd quemadmodùm calor ex motu, & agitatione proficiscitur, ità frigus ex quiete; radii namque solares terræ superficiei occurrunt tantà cum inclinatione, ità ut in eorum reflexione minimum, vel nullum motum ciant in corpuscula in aëre dispersa: at quies motûs privatio est: igitur & frigus caloris est privatio.

Sed estò hæc sententia aliquam præferat similitudinem, suos tamen patitur manes: nam privatio nullum producit effectum, sed nix aquam, vinum, & omnia contigua corpora refrigerat. Verùm scimus, quid ad hæc responsuri sunt ii, qui frigus è rerum naturâ eliminare conantur, scilicet docent nivem esse corpus caloris expers, calorem autem consistere in motu, motum prætereà esse de eorum genere, quæ alteri communicantur; sed intereà tantundem depellitur, atque adeò vinum ex nivis applicatione calorem suum amittere, dùm illum nivi impertitur, tantundem enim vinum caloris deperdet, quantum nivi communicabit. Verùm hæc responsio non nobis arridet, nam totam non evacuat difficultatem, hinc meliùs juxta nostra principia respondetur: Calor in motu consistit, qui motus à particulis exilissimis dependet, aquæ, vel vini particula propter nivem torpescunt, consoipiuntur, ligantur, ac motum amit-

tunt, undè aqua, vel vinum frigidum, quale nix potantibus sensum præbet. Intereà verò non videmus, quomodò sal petræ, quod nullum habet sensibile frigus, vinum tamen, & aquam possit insigniter refrigerare? Enimverò notabile frigus in sale petræ progignitur ex aquæ admixtione, quare videtur frigus esse ens, & inter rerum numerum collocandum potius, quàm inter non entia.

Siccitatis clarior est contemplatio, & ipsis sensibus manifesta, sed præmonere oportet plerosque decipi in definitione humiditatis, quando dicunt ea corpora vocanda esse humida, quæ facillè terminantur finibus alienis: hæc enim ratione metalla fusa humida dici deberent. Est autem liquidorum corporum proprietas illa, ut termino alieno facillè finiantur; humida verò sunt, quæ humorem in se continent. Sic aër, cùm semper liquidus sit, non tamen semper humidus dicendus erit: nam stante Austro, aër multâ humoris copiam imbutus videtur, contrà verò spirante Boreâ, siccior erit. Spongia, aut pannum humore imbutum humidum erit: igitur corpora non aliter fieri humida possunt, nisi per participationem humoris, vel potius humidæ substantiæ, secùs contingit in calore; ferrum enim incallescit sine substantiæ calidæ adjunctione: neque enim ferrum candens præter propriam materiam habet aliam substantiam, cujus admixtione ferrum incalascit. Verùm spongia humescere nequit, nisi eidem addatur humor, qui illius pondus adaugeat. Quapropter spongia
sicca

sicca in vitro imposita, si intra aquas mergatur, non humescabitur, quia nequit aqua per vitri poros penetrare, & spongiæ admisceri. Quandoquēque igitur corpora humescunt, non adipiscuntur solam qualitatem humidam, sed ipsam quoque substantiam humefacientem. Quod animadversum videmus ab Aristotele, qui 3. de animā scripsit: Corpora humescere per additionem humoris. & 2. de generat. & corrupt. tex. 54. inquit: Humidum illud esse, quod aqua est, vel habet intra se aquam, quæ est principium humiditatis omnis constitutum. Et 2. de animā tex. 2. scripsit: Humidum autem non est sine corpore, neque unum, sed necesse est aquam esse, aut habere aquam. Unde humida corpora graviora sunt seipsis, quàm fuerint exsiccata. Cū igitur hæc ita se habeant, facile videtur posse concludi siccitatem esse humoris privationem, quod etiam aliquandò falsus est Aristoteles; nam quæ exsiccantur corpora leviora evadunt, humore nimirum expresso, vel in vapores sublato. Neque verò putandum est corpora sicca terminari non posse termino alieno: nam pulveres siccissimi, argentum vivum, & metalla fusa, quæ omnino sunt humoris expertia, facile alienis terminantur finibus, glacies verò nequaquam terminatur termino alieno, nec tamen glacies sicca dicenda erit, sed potius concreta, concretum verò opponitur liquido, sicut siccum humido; constat itaque siccitatem induci non posse, nisi à causis potentibus humorem exprimere, vel in vapores resolvere; quocirca ferrum etsi siccissimum sit, nequit

humiditatem spongiæ destruere, atque inducere siccitatem in illam, sed si humor, compressa spongiā, exprimitur, vel ad ignem evaporet, perfectè spongia exsiccatur: liquet igitur siccitatem nihil esse aliud, quàm humoris defectum, seu privationem, siccum enim propriè sonat exsuccum continetque humidi privationem.

His itè, rectèque trutinatis, non extra choream erit inquirere, datà occasione, undè fiat, ut aqua ex ligno guajaco, falsā, & similibus rebus parata nostri corporis humiditates superfluas imminuat, & siccitatem quodammodò inferat. Equidè ejusmodi aquæ nequaquam exsiccandi vim, sed potius propriam humectandi naturam habent. Verùm nostro corpori siccitas diversis rationibus induci potest, vel quia per alvum, & urinam educuntur humores, vel quia humiditas ipsa sudore, vel perspiratione eliminatur. Hinc est, quod medicamentis purgantibus, vel urinam cientibus, vel diaphoreticis, & perspirationem insensilem promoventibus, supervacaneus humorè corpore educitur. Aquæ autem, & decocta ex guajaco, & falsā humores acenuant, & diaphoresim, insensilemque perspirationem promoveat: atque hinc siccitas in corpore contingit, ut fusiùs in nostiā Pyrotechniā, & de Luce Venereā docuimus.

Examinandum hic foret, quæ ratione multa corpora, quæ actu frigida videntur, calorem tamen nostro corpori inducere possunt. Sed hujus quæstionis solutio pendet à caloris cognitione, cujus natura in

eo consistit, ut particulas subtilissimæ substantiæ contentæ in corporibus agiter, continuoque motu propellar. Quocirca calor is sensus in nobis percipitur, quotiescumque spiritus, & tenuissima substantia in sentiente organo contenta agitur. Quamobrem ea nobis calida videntur, quæ spiritum magis ciere, atque agitare possunt: quæ verò vim habent motum infringendi in spiritibus existentem, ea frigida apparent. Hac ratione vini spiritus in nostro corpore calorem progignere, & excitare potest: sanguinem enim humoresque, imò & spiritus violentè agitat, undè fit calor is generatio. Videmus autem vini spiritum frigidæ aquæ permistum ejusmodi motum, agitationemque producere, ut propterea notabilis calor in aquâ progignatur, & in chymicis multa habemus, quæ cum ex seipsis minimè calida sint, simul commista calorem, fervoremque ingentem excitare solent. Sic videmus quotidie contingere, cum vitrioli spiritus oleo tartari p. d. superfunditur, vel ipse spiritus vitrioli salibus rerum vegeabilium admisceatur. Salia verò quantum in seipsis inest frigus potius, quàm calorem excitare solent, præsertim si aquæ puræ admisceantur, id evidentissimè apparet in sale petrae, vel sale armoniæ, quæ aquæ injecta notabile frigus excitant, quâ ratione vinum insigniter refrigerari solet, quæ invento utuntur sæpissimè navigantes tempore æstivo, si nive caruerint. Neque hic prætereundum est vocari potestate calida ea, quæ cum actu frigida videantur, vim progignendi

caloris in se continent, hujusmodi est vini spiritus, qui quidè non semper, & ubique calorem progignere potest. Neque externis partibus applicatus calorem magis quàm frigus excitat.

Signa.

Calidam intemperiem testantur causæ calefacientes, quæ præcesserunt, & non solum labia, verum & ipsa ulceris caro rubicundior apparet, & ipse eger calorem in ulcere sentit, cui dolor plerumque conjungitur. Ulceris excrementa acria sunt, & mordicant. Medicamenta frigida applicata juvare, & calida nocere credunt vulgares.

Frigidam indicant intemperiem causæ refrigerantes prægressæ, ulceris color albicans, ejusdem labia ad albedinem, vel livorem vergentia, & mollia sunt, atque ulceri calida utilia, frigida noxia putant.

Humidam intemperiem humectantes causæ, quæ præcesserunt, ostendunt, deinde caro mollis, flaccida apparet, & plerumque nimium excrevit; & humorum excrementorum abundantia adest.

Siccam tandem intemperiem cognoscunt ex causis exsiccantibus, quæ præcesserunt, ulceris labia siccæ, squallida, & dura, membri laborantis gracilitas apparent; excrementa ulceris pauca sunt, vel nulla,

Causæ.

Calidam intemperiem in ulceribus secundum Galenicis causare valent, aut nimis calidus, topica præ-

sidia

fidia calidiora, fasciarum nimis stricta deligatio, involucriorum nimia copia, alimenta calida, vini meracioris potus &c.

Frigidam inducunt intemperiem aer frigidus, si ulcus fasciis, & involucri contra externi aeris frigiditatem non satis muniatur, medicamenta frigida &c.

Humidam causant intemperiem aer humidus, unde nonnullis in locis aeris humiditas ulceribus valde inimica est, præsidia humida, alimenta humida, nimius potus, humorum affluxus &c.

Siccam denique excitant intemperiem aer siccus, topica vehementer exsiccantia, exulentia, & potulentæ materiæ penuria &c. Quod si prædictæ conjungantur causæ, compositam in ulceribus producunt intemperiem.

Hæ causæ, quas vulgares assignant, sunt mediatae, occasionales, & intemperierum excitativæ, non autem immediatae, & secundum nostræ theorematæ duæ tantum essent intemperies, nempe calida, & humida; frigida namque & sicca non sunt entia positiva, sed solummodo privativa. Præterquam quod calor, & humiditas non sunt qualitates nudæ, seu accidentia, ut *vulgares philosophi Aristotelici* blaterant, quia revera non dantur accidentia in universitate rerum, sed sunt substantiæ; calor enim ab igne non nisi penes gradus differe in nostrâ *pyrotechniâ* fusiùs demonstravimus, humidum verò illud dicendum fore, quod intra se humorem continet probavimus.

Excitant, juxta nostram sen-

tentiam, in, vel circa ulcus calidam intemperiem, omnia quæ subtilissimæ substantiæ particulas, ut sulphureas, salinas vitriolatas &c. in motu & agitationem adigunt, vel sanguis lymphæ liquores vitiosi, vel in canaliculis obstructions, & cætera viscerum vitia, quorum ope, vel agitatione subtiliū particularum scemèratio succedit. Ita sunt aer nimis calidus, medicamenta calidiora, potus, & cibus calidus &c. quæ hunc particulis motu inducere possunt. Frigida ulceris intemperies opposito modo produci ut, per caloris nempe defectum, per subtilissimarum namque particularum motum interdictum ab aliqua causa tam internâ, quam externâ & per harum particularum feriatiorem, & ligationem frigus in parte sentiri videtur. Hujusmodi sunt aer frigidus, medicamenta frigida &c. Humidam intemperiem illam dicimus, quæ humorum affluxum continet; impossibile namque est humidum concipere, absque eo quod humefacientem intelligamus substantiam. Humidam statuimus ulceris intemperiem hoc cum discrimine, quod sit illud, quod neque calorem, frigus, vel siccitatem habet, in ejus causâ venit etiam aer humidus; medicamenta, & alimenta humida, ac nimius potus. Siccam tandem ulceris intemperiem induci concludimus per humoris privationem, provenitque ex alimenti defectu, vel a causis illud potentibus in halitus resolvere, hujusmodi est aer siccus, medicamenta nimis exsiccantia, cibi, & potus penuria &c.

Si nulla adest in loco affecto intumescencia in ulcere, vel in parti-

bus circumjacentibus, intemperiem illam nudam, seu immaterialem appellant vulgares; si verò intumescencia ulcus, vel partes circumjacentes obfideat, materialem appellant.

Prognosis.

Ulcerà cum intemperie ægrè curantur, quia ejus curationem impedit; post habito namque ulcere, chirurgus soli intemperiei, vacare debet. Ulcerà cum intemperie calidà, frigidà, vel humida non difficulter curantur; unà enim operà & eodem tempore iisdem medicamentis intemperiei subvenire, & ulcus curare oportet, estò frigus ulceribus sit inimicum. Sicca intemperies cum ulcere difficilids tolli creditur à vulgaribus, estò clament ulcus, ut ulcus exsiccatione indigeat.

Curatio.

Nullum ulcus tam facilè curant vulgares, quàm illud, cui conjuncta est intemperies; indicat namque, ut dicunt, intemperies per contraria alterationem juxta *Galenì* Tariffam: *contraria contrariis curantur*, ut calida frigidis, & frigida calidis &c. Cum autem intemperies habeat causam rationem, & eà præsente, ulcus curari non possit, nisi priùs auferatur intemperies, primò igitur intemperiem tollunt, deindè ulcus sanant. Si intemperies sit materialis, eam adhibent curationem, qua in ulcere cum humorum affluxu proutur,

Si itaque intemperies sit immaterialis, & quidè calida, ulceris intemperies refrigerantia mitiora, vel valentiora pro caloris excessu expostulat; commendant autem communiter aquam plantaginis, endivia, portulacæ, rosarum, succum sedii, sonchi, solani, lactuca, cicuta. Hæc medicamenta refrigerantia non solùm ulceri, sed etiam partibus circumjacentibus, & vicinis imponunt, idèdque etiam unguentis, oleis, aliisque hujus farinae prædiis uruntur, ità sunt unguentum decarussà, album Rhasis, album camphoratum, rosaceum, populeum, refrigerans *Galenì*, santalinum. Oleum rosaceum, violaceum, ovi albumen, lac, acetum, oxyceratium, & id genus alia. Ori ea medicamenta, quæ refrigerant, administrant, ut sunt syr. de Nymphaea, endivia, violar. cicbor. portulacæ, itèd quatuor seminum majorum frigidorum emulsionem, iuscula &c. Cæterum frigidorum medicaminum applicatione facilè ex nativi caloris extinctione multi in gangrænam, & sphacellum, ac ipsam mortem incidunt; obstructis namque meatibus, & porositatibus, major particularum salinarum, acidarum &c. agitatio, & exaltatio excitatur, ac inflammatio, deindè gangræna, & sphacelus.

Frigidam ulceris intemperiem calefacientia requirere dicunt, idèdque ad calida topica recurrunt, qualia sunt oleum hypericonis, nardinum, irinum, ruta, anethi, de spicâ, chamamelinum, terebinthina, ceratum de betonica, vinum calidum cum spongiis applicatum. Et quidè varia linimenta, & unguenta ex his pagata ulceri imponunt. Extrà verò,

& partibus vicinis imponunt fomenta ex decocto *salvia*, *hyssopi*, *absynthii*, *pulegii*, *rute*, *oris marini*, *lavendula*, *origani*, *mentha*, *fol. lauri* parata in vino generoso. Quod si magis calefacere intendunt, *oleum euphorbii* adhibent, aut de *piperibus* instillant. Verum enim verò hæc medicamenta calida non ad Galenistarum nūtum exalfaciunt, sed iuxta partis dispositionem agunt, & nisi exilissimas particulas internas ad motum adigant, nullum in parte calorem excitare possunt. Si motus excitetur, paulatim agitatione fieri debet, alias ab uno contrario in aliud absque ullo medio fieret transitus, & phlogosim potius exciteret, quàm ad naturalem temperiem partem adigeret, & ulceris scilicet intensius agerent, fierentque exedentia, præcipuè cum ista vulgarium medicamenta ob lentorem porositates obstruerent, & intensissimam salium fermentationem excitarent.

Humida intemperies siccantia desiderat, verum quia ulcus ex se exsiccantia requirit, si deinde humidum fuerit, fortiora requirit exsiccantia, quàm ulcus simplex usurpat, qualia sunt *radices cyperi*, *marubium*, *salvia*, *chalcitis*, *plumbumustum*, *sevi squama*, *lithargyrium*, *cerussa*, *minium*, *liths*, *massice*, & his similia, ex quibus secundum intemperiei humidæ gradum varia cuique ulceri medicamenta parant. Quod ulcus humidius est, eò fortiora requirit exsiccantia; si verò minus humidum sit, mitiora exigit exsiccantia. Lavant, detergentque ulceris sordes vino, vel poscâ, in quibus adstringentia, & siccantia, ut

radic. cyperi, *hypericum*, *salvia*, *absynthium*, *betonica*, *rosa cocta* sint, deinde dictis medicamentis pulveretenus ulcus inspergunt. Quàm varia sint hæc vulgarium medicamenta siccantia ad humidæ intemperiei sanationem, facile quisquàm, qui vix chirurgiam à primo limine salutavit, conicere potest; ferrum namque, ut diximus, estò siccissimum sit, spongiæ humiditatem destruere, atque siccitatem in illam inducere nequit, sed per expressionem, vel evaporationem exsiccatur: ità est humida ulceris intemperies, nisi foras eliminetur per evacuationem sensilem, vel insensilem, nequaquàm curatur.

Sicca tandem intemperies humectantia exposcit præsidia, eapropter parti aquam calidam applicant triplici modo, foris scilicet perfusione, & balneo. Foris fit spongiâ, panno, stupâ, aut gossypio, & hic modus commodior existimatur. perfusio autem, & balneum non ità commodè adhibentur. Utilius est, si ulcus hydroleo tepido foveatur, quàm aquâ; aqua namque tepida actuali calore partem calefacit, poros aperit, & calorem dissipat, iterum post fotum refrigerat, quod prohibet oleum admittum, quia lentore suo poros obstruit. Post fotum sequens cataplasma humectans applicant, ut

℞. sol. malv. ad molliem coctior
3.℔.

farina bord.

tritici ana. 3.℔.

amgdal. d. contus.

mellis cocti 3.℔.

Croci 9. ℞.

ping. porci q. s.

m. in mortario & f. cataplasma.

Vel sequenti linimento humectante utuntur, ut

℞. fol. malv. contus. lib. ℞.

butyri recentis 3. viij.

m. coquantur ad mollitiem usque, trahantur, & deinde adde

Olei liliornum albor. 3. j. ℞.

m. f. linimentum.

In sicca intemperie vitet chirurgus exsiccantia, usque dum intemperies hæc in totum abiit, nam alias curatio pertinax & difficillima reddetur.

In intemperie composita medicamenta utrique qualitati opposita ahibent. intemperie sublata sarcoticis utuntur, & quidem in calida minus calidis, in frigida minus frigidis, in humida minus humidis & in sicca minus siccantibus, ne pars intemperata in eandem relabatur intemperiem.

Quis agaso unâ horâ non evaderet medicus Galenistâ, medendi indicatione desumptâ in omoibus morbis ab intemperies circulum committunt vitiosum, nam calide frigida, frigida calida, humide sicca, & sicce humida præsidia applicant, eapropter vulgatum medicina est caloris, frigoris & dogma ac proinde facta est fabula vulgi.

Intemperiei curationem ita instituimus, ut ulcus quantum fieri potest non negligatur. Si tamen utrique simul succurri non possit, ei quod magis urget chirurgum magis intentum esse oportet. Si itaque sit calida, utimur *foliis ebuli, & nicotiana tepore imbutis, vel aquâ spermatis ra-*

narum, phlegmate vitrioli, aquâ vitrioli, plantaginis sale Saturni imprægnatâ, vel aquâ lapidis medicamentosis, his aquis utimur tepidu, lacte tepido, linteis sanguine leporino illitis. In frigida utimur spiritu vini, tum simplicis, tum campborato, tum etiam aquâ regina Hungaria, aquis stillatitiis juniperi, florum camomilla, balsamo sulphuris terebinthinati, anisati, juniperati &c. In humida omnia siccantia describenda capite præcedenti, de ulcere cum humorum affluxu conveniunt.

In sicca tandem cuncta exsiccantia vitanda, conveniunt humifacientia, & præcipue fons ex sequenti decoctione, ut

℞. Althea,

malva ana m. j.

flor. viol.

papav.

Nymph. ana 3. j.

Coque in aquâ fontis, vel lacte vaccino, aut caprillo, & cum spongiâ tepidâ applicetur decoctio, vel immergatur pars exulcerata in ipsam. Si ex alimenti defectu dependeat, quod pars non attrahat, cibo euchymo, & facilis distributionis utimur. Si atrophîa laboret, ejus curatione removeretur.

C A P. XII.

De Ulcere cum humorum affluxu.

Rarissime sola intemperies ulcus comitatur, sed interdum ipsa cum humorum affluxu conjungitur, quam materialem intemperiem nuncupant vulgares, illamque esse volunt quadruplicem scilicet cali-

calidam, frigidam, humidam, & siccam. Cæterum hunc humorum affluxum excitant acidi, falsi, vel alijs similis indolis humores in ulcus decumbentes, vel stagnantes, & nisi his circulatio, vel resolutio restitatur, sive, ut vulgates inquirunt, talis materialis intemperies tollatur, ulcus nullam admittit sanationem.

Signa.

Ulcus cum humorum affluxuprehenditur non solum ex labiorum, sed etiam circumjacentium, ulceris partium tumore. Deinde ex dolore, præcipue si nervosæ afficiantur partes. Tertio ex excrementorum copiâ emanantium, quæ major, quàm pro ulceris magnitudine esse solet. Denique etiam, licet omnia, quæ ad curationem necessaria sunt, adhibeantur, sanatu difficile est; humorum namque affluxus curationem moratur.

Causæ.

Communiter vulgares humorum affluxus causas assignant plures, & primo peccantium succorum vel in toto corpore abundantia, vel in aliquâ corporis parte, in hepate scilicet vel liene. Deinde natura irritata, & stimolata quantitate, vel qualitate se exonerat, expellit, deponitque in partem exulceratam. Postmodum, ubi pars affecta propter dolorem, aut calorem prævos ad se alliecit humores. Tandem vel dum ad partem in loco inferiori positam humores utpotè graves suâ sponte defluunt, aut aliâ ad partem imbecil-

lem, & ignobilem moventur, ac ibi stagnant. Non confutamus Galenistarum causas, quia ineptias sapiunt, vitiosos namque assignant humores, sed quò laborent vitio, silentio involvunt. Confugiunt ad hepar, tanquàm ad omnium morborum patronum, vel ad lienem tanquàm ad humoris melancholici cloacam. Naturam se exonerantem in debilem, & vilem culpant, & humores gravitatis accusant. Deinde apud languentes oraculi instar, non ex tripode, sed ex quadrupede potius naturam commendantes, hæc verba semper pronunciant: *Natura est morborum mediatrici, medicus natura minister, & nos hos ridemus sanè medicos cum Empedocle:*

ſi quod mortales naturam nomine dicunt,

Hoc nihil est.

Cum nesciant ipsi, quid dicere velint his verbis nihil significantibus. Est itaque apud ipsos natura Deastra morborum, & sanitatis effectorix, & velut Achillis hasta, quæ ferit, & sanat:

Una manus vobis vulnus, opemque feret.

Inquirunt calorem, & dolorem attrahere, verum in rerum naturâ nullam attractionem fieri contendimus, nec ullam dari aliam præter mechanicam, quâ nimirum id, quod trahitur, corpori trahenti alligatur, atque affigitur.

Humorum affluxum in ulcere secundum nostram sententiam causant pororum, vel canaliculorum obstructions; deinetur namque sanguinis, vel lymphæ, succi alimentitii, vel aliarum substantiarum

fluidarum copia in circumjacentium ulcerum particulis a partium texturâ immutatâ. Hæc in loco laborante cumulatur, stagnat aded ut non solum porositates & canaliculi implentur sed etiam distenduntur & sanguinis limphæ succi nutritii vel aliarumque substantiarum liquidarum transitus magis impeditur. Ibidem acescunt exaltantur hi liquores & subjctarum partium fibras vellicant ac dissecant ac proinde dolorem & calorem excitant. effluit interrim ab ulcere pus vel sanies ichor vel sordes &c.

Prognosis.

Vlcus cum humorum affluxu difficile curatur quia ex affluxu ulcus humidum redditur intumescit & dolor excitatur; maior tamen vel minor curationis difficultas penderet à maiori, vel minori humoris stagnantis quantitate, tùm etiam ab ejus maiori, vel minori acrimoniâ, vel effluxus maiori, vel minori quantitate.

Curatio.

Ulcus cum humorum affluxu curare non possunt vulgares, nisi fluxum, ejusque causam tollant, ac proinde sive in toto, sive in aliquâ parte totius, hepatis vitio, aut lienis vitiosus humor generetur, ejus genesis prohibent, humorem, qui affluit decenti modo præparant, evacuantque præfidiis, quæ tonsoribus patent, præcipuè si cacoehymia exulceratus laboret. Postmodum per aliquod temporis spatium

ad talem affluxum digerendum, supurationem promovent *digestivo ex ovi vitello, oleo rosaceo, & terebinthinâ composito.* Verùm hoc modo putredinem augent, & in causâ sunt, ut chirurgi longiùs trahant ulceris curationem, ac pro dirigendo ulceris affluxu, quotidianum confluunt censum, & ægri crumenam digerunt. Non equidem Galenum legunt vulgares, qui in commento aph. 22. sect. 5. expressè docet: *In ulceribus putridis, & fluxione vexatis suppurantia non competere; putridis quidè, quia illi ardenda non sunt, quæ putredinem augere possunt; in fluxione vexatis verò, quia suppurantia affectam partem magis laxant, & disponunt ad recipiendam materiam fluentem.*

Deindè, nè humor ad partem affectam confluat, illum revellere, intercipere, repellere satagunt. Inter revulsoria præfidia fonticulos in oppositâ corporis parte excitant, qui fluentes humores, qui ad partem affectam conflunt, alio loco evacuant. Hos fonticulos necessarios esse credunt in ulceribus diuturnis, & rationem assignant; Cùm enim natura jam diu assueverit humores vitiosos per partem ulceratam evacuare, si ulcus planè claudatur, & aliquid humorum vitiosorum cumuletur, facile fieri potest, ut in venas regurgitet, & in nobiliorem aliquam partem ruat, quod fonticulo præcavei potest.

Cæterùm tantùm abest, ut fonticuli ulcera habentibus emolumento sint, quin potius detrimento, quia pro diuturno curando ulcere, novum, & diuturnius excitant, & ex-

per-

permanente ulcere ulcerati salutem mendicant; præstaret, ut primum ulcus sustentaretur globulo, chartâ bibulâ, & hederæ folio. Imaginantur per fontanellas, quasi per fontes, morbos exhauriri, quasi vitiatas humoribus per novum emunctorium ad vulgarium nutum se naturam exonerare credunt, & illorum iussibus obedituram ferid sibi persuadent. Vitiatos citant humores, ut personaliter compareant ad finem providendi, aliâs &c. Nulla est communio inter illa membra opposita, quia salebrosa est via, neque anatomicorum solertia usque modò peculiâres invenit ductus, quibus degeneres humores in brachium, femur, & tibiâ deferantur. Excrementum, quod è cauterizato loco emanat, non dissitis è partibus venit, quia non præexistebat, sed est geniale, optimum, & laudabile partium nutrimentum, quod in degenerationem abit. Hoc turpe, & putidum ignorantiæ asyllum, ad quod pro excrementorum expurgatione confugiunt vulgares, non solum humano generi officit, sed impietatem sapit, & implicitam contra Deum blasphemiam involuit; quippè in hominis opificio insufficientiæ eum accusant, quod necessaria ignorârît emunctoria, quasi tot non condidisset, quot erant necessaria. Præterea membrum cauterio infectum debito defraudatur alimento, naturale amittit robur, extenuatur, macilentum evadit, & multoties atrophias, erysipelata, inflammationes, gangrænas, & sphacelos subit, præter asfiduas callositates, carniû excre-

scientias, & sanguinis profusiones.

Ulcerum affluxum intercipiunt defensivis, quæ supra partem exulceratam in parte sanâ versus vasorum radicem, in locis ubi venæ majores, & magis conspicuæ sunt, imponunt, quæ vasa, per quæ humor affluit, constringunt, & humorem retropellere tentant, ex siccis, & adstringentibus parant, ex sanguine draconis, bolo armeno, balaustris, flor. ros. rubr. cortic. granat. myrt. alumine cum albumine ovi, ol. myrtino, rosaceo, poscâ, vino amygd., aquis adstringentibus &c. ex quibus cataplasma, vel alia medicamenta parant. Sed concessio, quod hæc constringendi potestatem habeant, vasa humores adducunt, & consequenter ipsorum affluxum impediendi, iisdem de causis talia defensiva noxia sunt; quandoquidem si constringunt arteriolas sanguinem deferentes, angustiantur quoque venulas, & lymphaticos ductus, sanguinem superfluum, & aquosam humiditatem à parte abducentes, & reportantes. Unde magis stagnabunt liquores in loco ulcerato. Pro defensiva deligandæ essent potius arteriolar, si hoc absque salutis noxâ fieri posset.

Humorem denique affluxum, qui in membro ulcerato adhuc fluctuat, repellunt; idèque partem exulceratam, vel ei proximam ablunt aquâ aluminosâ, vitriolatâ, aquâ, vel decocto plantaginis, rosarum, balaustrum, radic. cyperi, pentaphylis &c. Sed hæc repellentia acida, aultera, atque adstringentia medicamenta multis de causis suspecta sunt, nam partium porositates constipant, & san-

sanguis magis in crassatur, & coagulatur ab ipsis, & cum humor parijam impactus est, repellere nequit, & pessima mala subsequi solent. Insuper explicari, aut intelligi nequit, quomodo, & per quas vias fieri debeat talis percussio, quod enim perpetuè à corde mittitur per arterias in omnes corporis partes, sanguis est: ad hoc igitur, ut sanguinis in locum ulceratum affluxus impediatur, necesse est, ut cordis motus cesset, vel arteriolæ in affectam desinentes partem occludantur. Præterea adhibitis repellentibus magnum non tantum damnum percipitur, verum etiam ulcus augetur, nullo igitur prorsus modo adhibenda sunt ob infelicem successum, quia humor ad alias corporis partes percussus majora inferre potest incommoda. Sunt repellentia frigida, & humida in eorum sententiâ, quadere densantia, & adstringentia potius, quam repellentia appellari debent, quia partem affectam, ejusque vasa comprimunt, contrahunt, adstringunt, affluxumque humorem densant.

Interim ulcus pulveribus exsiccantibus tractant, ut *Lithargyrio, tinctâ, plumbomisso, corallis, bolo armato, chalcide &c.* Postmodum facotice utuntur, & tandem ulceri carne repleto epuloticis cicatricem inducunt.

Ulcus cum humorum affluxu, cum intemperie materiali appellatum à vulgaribus exsiccatione indiget, si *Hippocrati, & Galeno* credimus, vel ex aliorum sententiâ acidum temperantibus, & salia obtundentibus, ac castigantibus. Præter-

ea excrementa, quæ in ulcere generantur, vel confluunt, & medellæ impedimento sunt, tolli debent. Eapropter sedulæ danda est opera, ut tenues superfluitates exsiccantur, crassæ abstergentur, & optimum interea nutrimentum in corpore gignatur, & in affectam partem fluat, ut amissam substantiam denuò gignere queat. Ad hunc itaque finem primum si sanguis abundet, tenui victu imminuenda est plethora, nam ut *Hispani dicunt: La dieta es una continua sangria.* Præterquam quod tenuis victus ulceratis salubris est, & magnum succi alimentitii proventum minorat. Postmodum si lymphæ, vel aliarum substantiarum fluidarum copia in causâ sit, cathartice hos humores exurbantibus res peragenda est, ut *resinâ jalap. extract. gummi gamandra, mechoaca, Diacarthami, vel conservâ florum persicorum &c.* Hæc namque pororum, & canaliculorum obstructions reserant, & circulatio restituitur.

Deinde alkalia, quæ acidum absorbent, propinanda sunt, ut *c. c. philosophicè præp. stibium diaphoreticum, alkali cancr. fluviatil. corall. præp. oculor. cancr. pulvis, sal volatile c. c.* Decocta lignorum *sassafras, guajaci, juniperi, visci querni* maximopere conducunt ad resolvendum affluxum per sensilem, sive insensilem evaporationem. Similiter potiones vulnerariæ ex herbis plurimo alkali volatili abundantibus, ut *scabiosa, scordio, carduo benedicto, alchemilla, pilosellâ &c.* Item *tinctura martis aperitiva.* Potus ordinarius si decoctum herbæ *Thez.*

Quò ad topica parti ulceratæ
me:

medicamenta mitius exsiccantia, & detergentia conveniunt, ut nitrosâ, aut amarâ facultate prædicta, quæ excrementa producta abstergere, & blandè tenues humiditates exsiccare valent, hujusmodi erunt balsamus proprietatis, vel emplastrum fodicationum, vel stipticum Paracelsi. Emplastrum de lapide calaminari, quoque ulcera manantia desiccant, & cicatrice claudunt, cujus compositio est:

℞. Lapidis calaminarij,
tutia præp. ana. ʒ. ij.
terebinthina ʒ. ʒss.
Cera citrina,
resina ana ʒ. j.
Lithargyrii ʒ. ʒss.
olibani,
mastiches,
tragacanth. ana. ʒ. j.
olei rosar. ʒ.
myrti ana ʒ. ij.
f. empl. s. a.

Unguentum Rubrum, sive de minio camphoratum potentissimè manantia ulcera exsiccant, & humorum actionem obdundit, ut

℞. Olei ros. lib. j. ʒss.
Lithargyrii ʒ. ij.
minii ʒ. ij.
Cerussa ʒ. ʒss.
tutia præp.
Camphora ana ʒ. ij.
Cera alba ʒ. ij.

Liquatam æream cum oleo lento igne misce in mortario plumbeo, cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

Unumquodque horum topicorum per se ulceris aciditatem immutare, excrementa abstergere, tenues humores exsiccare, carne implere, & cicatricem inducere valet absque alieni medicaminis ope.

CAP. XIII.

De Ulcere cum inflammatione.

Non tantùm peccantium succorum affluxus ulceribus supervenit, sed pro succorum diversitate diversi emergunt tumores, ac propere fieri non potest, ut ulcus sanescat, quin prius intumescencia cum eo conjuncta removeatur. Scipissimè ulcera inflammatio deprehendit, quæ ortum ducit ab impedito circulari sanguinis motu in partibus ulcere circumpositis.

Signa.

Cognoscitur ulceri complicatam esse inflammationem ex tumore cum tensione, calore, rubore, dolore, partis pulsatione, & febre.

Tumor oritur ab intercepto circulari sanguinis motu in suis conceptibulis obstructis, in quibus stagnat, & liber denegatur transitus, eo sanè modo, quo superficialibus cujuspiam membri venis arctiori pressis vinculo, & sanguinis motu in ipsis impedito, talis membri intumescencia subsequitur. Quædam conceptacula tamdiu distenduntur, donec rumpantur, & sic sanguinem intus contentum effundunt, qui stagnans tumorem, & tensionem efficit.

Calor intensior oritur ab intensiori particularum motu in sanguine stagnantium, & quia quasi vi transeunt, & circulant, effervescent, & eo magis dum suppurationem

nem subeunt, qui calor utique non excitaretur, si particulis liber permitteretur transitus.

Ruborem causat sanguis diffusus, & effervescens inter tunicas, & fibrillas, vel inter obstructa vasa, cui circulationis motus denegatur, & se expandit.

Dolor provenit, quia membranæ, & fibrillæ, quasi violentiâ premuntur, tenduntur, contrahuntur, crispantur, convelluntur, imò sæpè quidè lacerantur, distumpuntur à stagnantis sanguinis particulis acidis, quæ inter partis laborantis membranas, & fibrillas incuniantur ad spinæ similitudinem, undè doloris sensus emergit. Sed de doloris causâ fusiùs diximus in nostrâ *Trutinâ de capitis dolore.*

Pulsatio ortum ducit ab arteriis compressis à sanguine evasato, qui stagnans intumescitiam parit, comprimuntur arteriæ, & fortis fit earum pulsatio, quæ aliàs arteriis liberis existentibus, tam vehemens non perciperetur.

Febris quoque inflammationem comitatur, quod in sanguine evasato salia alkalia cum acidis particulis commiscentur, ex quibus fermentationis motus excitatur, ut videre est in liquorum alkaliorum, & acidorum miscelâ, qui motus tunicis, & fibrillis impertitus illas depravatè agitat, & febris progignitur.

Causa.

Proxima cum partibus ulceri immediate proximis complicata causa fingitur à Galenistis sanguis, & qui-

dè in legitimâ purus, in illegitimâ verò non ita purus, sed cum aliorum humorum copîâ mistus; ex hac humorum varietate contingit, ut sanguis nunc lenior, nunc acrior, modò crassior, modò moderatus, ut in legitimâ deprehenditur, & hinc fit, ut juxta variorum humorum exorbitantiam sub variis larvis emergat inflammatio. Illegitimam triplicem esse dicunt, vel sanguini inflammationem causanti admista est bilis, & dicitur erysipelatodes, vel permiscetur pituita, & nuncupatur inflammatio œdematodes, vel in sanguinis massâ melancholia exorbitat, & vocatur scirrholes.

Verùm vulgares hæc sententia fallit, ita inflammationem petrum-pentes; nam erysipelas non fit à sanguine, sicut inflammatio, & sic inflammatio erysipelatodes ruit; nec rectè œmatodes cognominatur, quia non datur inflammatio œdematodes, cùm sit verum œdema; Scirrholes dici potest, nam non ita facîle curatur, quia scirrhus est affectus contumax, periculofus, & facîle in canorum degenerans, præcipuè si imprudenter medicamentis tractetur.

Cæterum hoc inflammationis discrimen magnâ indiget explicatione, cùm sanguis apud vulgares sit quatuor humorum congeries, quam non facîle ipsi venantur, sed recentiores ita rimantur: Inflammatio dicitur legitima, si intumescitiam circumpositarum ulceri partium fiat ab illâ sanguineæ massæ portione, quæ convenientium circulationum ope in corde, cæterisque visceribus depurata, atque spiritualizata fuit,

&c

& deinde in parte inflammata stagnat, vel ob vitium ibidem contractum, vel ob viarum angustiam. Vel dicitur inflammatio erysipelodes, Si sanguini inflammationem parienti admisceatur bilis, sive portio sanguineae massae portio, quae ob multiplices filtrationes, & circulationes nimium attenuata, volatilizata, & aestuosa est. Vel nominatur oedematodes, si pituita, sive melius illa sanguinis portio, quae ex chylo (ut dicunt) noviter facta fuit, sanguini inflammanti permiscetur, nec sufficienter circulata, liberata, ac preparata est, sed sanguis potius crudus, & non multum spirituosus. Vel scirrholes, si in sanguineam massam melancholia exuberet. Sive crassa sanguinis pars, faeculenta, tartarea, quae post multas fermentationes, ac spirituum evolationem superest. Sanguis hic adeo quantitate peccat, ut non solum magna vasa distendat, sed etiam parva, & cum contineri non possit, effunditur à foraminulis admodum roris, & à partibus carnosae combibitur. Ad causas antecedentes referunt partem mitentem validiorem, & recipientem imbecilliolem, quae imbecillitas vel naturalis est, vel adventitia.

Inflammatio in partibus ulcere circumpositis fit ab impedito circulari sanguinis motu. Hoc impedimentum aliquando ortum ducit à causa externa, ut contusione, punctura &c. Vel sex illae causae non naturales dicuntur etiam inflammationem excitare valent, sanguini praebentes in vasis stagnationem, vel perversionem inter tunicarum, & si-

brillarum interstitia; disruptis namque, vel obstructis arteriis, sanguis extravasatus, vel obstructione impeditus ob spirituum dissipationem acescit, grumescit, ductuum sanguiferorum extremitates claudit, & pus subit. Interdum pendet à causa interna, ab obstructionibus nempe arteriarum capillarum [dum transit ab arteriis in venas] induratis à sanguine crasso, & glutinoso, in quo acida exorbitant salia, & in vasis suis subsistit, & stagnat. Idem sanguis absque crassitie, & glutine esse potest, sed spirituosus, qui inter membranas, & fibrillas effusus, vel in suorum conceptaculorum extremitatibus remoram facit, subriles evolvant particulae, motum amittit, concrevit, & diu haerere nequit, quin acorem concipiat, & quia est, quasi extra proprias aedes depositus, proscriptus, & vitalitate destitutus in corruptionem, & pus abit, & sic abscessum parit.

Ex quibus colligimus secundum nostram sententiam non tantum plurimo, sed etiam minimo sanguine abundantes inflammationi obnoxios esse. Hinc quoque erui-mus frustaneam esse maledictam sanguinis missionem in inflammatione curanda.

Effunditur sanguis à suis conceptaculis in partium intercapedines propter eorum apertiones vel anastomosim, vel per diuresin, vel per diabrosin.

Prognosis.

Inflammatio non nimis in profundo latens & corpus non sit cacochymum

chymum, aut debile, faciliè resolui potest; omnis enim inflammatio, quæ per insensilem evaporationem non resolvitur, suppurationem accersit, vel si perperam tractetur, in gangrænam degenerat, & quandoque mortem affert. Inflammatio in partibus adenosis facillimè in gangrænam, & sphacelum desinit. Si tandem calor, dolor, & cætera imminuuntur accidentia, tumore superflite, periculum imminet.

Curatio.

Curationem inflammationis cum ulcere conjunctæ exordiantur Galenistæ à venæ sectione, quam præsertim maximè necessariam existimant, siquidem sanguine detracto, qui inflammationem faciebat, tumor, calor, rubor, & cætera accidentia desinant oportet; verùm phæbotomiâ prohibere intendunt, si verum est, ne novus sanguis ad partem affluat, respiciunt ad posterius sed prius illapsum intactum in partium intercapedinibus relinquunt, & sic perperam bardum celebrant medicamentum. Deindè blando utuntur purgante juxta humoris à sanguine peccantis exigentiam, abstinēt à vehementioribus dejectoriis, quia ab his humores impetuosè commoveantur, & in partem laborantem impelluntur. Postmodum alterantibus qualitatatum excessum in humoribus emendant, & quia inflammatio requirit partis refrigerationem, ad intentum calorem restringendum, refrigerantibus utuntur, ut *Lactucâ, violâ, portulacâ, Nympha, echinor, seminibusque frigidis*. Verùm refrigerâ-

tiatubulorum obstructions augent, humores coagulant, & ex auctâ obstructione vehementius agitantur, tumor supervenit major, & inflammatio ad gangrænam apta redditur. Præterquam quod *refrigerantia*, juxta *Hippocr. aphor.*, *ulceribus sunt hostilia*.

Post hæc commendant præcipuè revulsionem in fluxionis principio, cui satisfacere putant insensibiliter evacuâdo frictionibus, cucurbitulis, similibusq; præsidiiis. Deindè vitiosum humorem, qui jam affectum obsidet locum, sed non dum firmatū repellere tentant *succo solani, sedis majoris, lentis aquaticæ, portulacæ, acetosellæ &c.* Cæterum abstinendum est i repellentibus, quia humorem introPELLunt (sed hæc verbo tenus repellunt), & repulsū ad partes nobiles demandant; præterea ulcери nocent, ut diximus. In inflammationis deindè statu, & declinatione discutientia adhibent, ut stagnans sanguis discutiat, utuntur foru ex decoctione *malvæ, melli, otis, sanu, graci, chari, ionilla, sambuci &c.* Sed hæc cum constent ex rebus mucilaginosi, atque crassissimis magis claudunt insensiles partis affectus meatus, humoribusque in crassatis, transpirationem impediunt, ac proinde nullatenus uti debent.

Inflammatio ulcერი conjuncta curatur obstructionis vasorum reseratione, vel sanguinis effusi resolutione, ac proinde primò incommodo occurremus, si medicamenta, quæ acidum absorbent, adhibeamus, ita sunt illa, quæ plurimo constant alkali; nam sanguini fluiditatem restitunt, & circulationem consuetam promovent, talia sunt *sanguis hirci ad plenitudinem, extractum papaveris rhæ-*
dos,

*dos, oculi cancerorum, cornu cervi philosophice preparatum, stibium diaphoreticum, ebur sine igne paratum, coral-
lia preparata, stictima Ceti &c. ut*

*℞. Sang. hirco 3. j.
c. c. philosophice præp. ʒ. ij.
ocul. cancer. 3 B.
salis volatilis succini gr. iij.*

*m. f. pulvis, & divide in sex schedulas
aquaes, & utere manè, & vespere
in aquâ stillatitiâ papaveris rhæados,
vel cum potu calido herbæ Theæ,
vel in decocto radicis chinæ, & sal-
sæ parillæ; Hæc namque alkalia ita
conformatas habent vacuitates, in
quibus particularum acidarum cus-
pides incuniantur, ut obtundantur,
infringanturque & stagnans sanguis
acidis particulis destitutus fluidior
reddatur, & consuetam, ac natu-
ralem nanciscatur circulationem.*

*Sanguinem effusum resolvunt
diaphoretica, ut Bezoardicum mine-
rale, stibium diaphoreticum, unicor-
nu, mistura simplex, sal volatile c. c.
ejusque spiritus rectificatus, sal volati-
le cardui sancti &c. Hæc non tan-
tùm coagulata dissolvunt, & fluida
reddunt, sed sudorem promovent,
peccantemque expellunt materiam,
imò ipsum sanguinem effusum, aci-
ditatum, coagulatumque resolvunt,
acidi vis infringitur, nova coagula-
tio impeditur, & interim tùm sen-
sibiliter, quàm insensibiliter per
suos ductus resolvitur. Quòd si san-
guis ob lentorem in resolutionem
non habeat, ad dissolvendum ma-
gni æstimamus spiritum tartari, sa-
lis armoniaci, vel fuliginis, & ad hunc*

*etiam finem diuretica magnopere
profunt, ut lapis prunella, floris sa-
lis nistri, sal spiritum fabarum, spiri-
tus salis dulcis &c. Si dolor in in-
flammatione ulceri conjunctus ma-
ximè urgeat, anodyna diaphoretici-
cis commista celebramus; hæc nam-
que dolorem sedant, vitam conso-
piunt, acidos aculeos obviunt, &
vim diaphoreticam augent, ut*

*℞. Diascordii Hieronymi Fracastor-
rii ʒ. ij.
stibii diaphoretici gr. xii.
bezoardici mineral. gr. iij.
anodyn. minerali. ʒ. ss.
m. f. pil. v.*

*Interim pars inflammata topicis
non destituatur præsidiiis, sed fovea-
tur spiritu vini camphorato, aquâ regi-
na Hungaria, vel decocto sulphuris cum
urinâ, conducitque succus cancerorum
fluviatiliùm calidè impositus, &
sæpè renovatus. Itèm aqua vi-
rioli, vel lapidis medicamentosi ca-
lidè applicata. Similiter empla-
strum de spermato Ceti cum campho-
râ, & croco. Verùm præ cæteris
excellit decoctum ex blandis dia-
phoreticis, & aromaticis, ut radi-
ce ireos, rore marino, menihâ, scor-
dio, flor. sambuci, chamomilla &c.
cum spiritu vini camphorato, & aquâ
Regina Hungaria.*

*Quòd si hisce adhibitis, phleg-
monis materia ob aliquam crassiciem
& nimiam copiam resolvui nequeat,
fortia calefacientia, & exsiccantia
vitare oportet, ne ipsorum
ope tenuiores particulæ, crassioribus
remanētibus, exhalēt, & inflammatio in
scirrhum degeneret, undè mediocritia
cale-*

calefacientia loco affecto sunt applicanda, ut contentus in eo sanguis absque ullo capitis mortui residuo resoluatur. In inflammata etiam parte perpetuo ed respiciendum est, ne topica sint nimis calida, nam si cur ignis nimio suo calore res corrumpit, & scindit, ita & fibras plurimas ejusmodi remedia calidiora corrumpunt, & scindunt. Nec etiam frigida, humida, oleaginosa, & crassa esse debent, nam obstructis poris, magna particularum fermentatio succedit, & facile in gangrænam, & necrosim terminari potest. Si vero sanguis neque resolui, neque in naturæ gratiam redire potest, inflammationem in abscessum, & sanguinem in pus abire oportet.

Recentiores in inflammatione sanguinis missionem admittunt, præcipue si sanguis nimis premens dolorem inferat, & inflammationem augeat, quando scilicet sanguis circa inflammationis locum plus colligitur, quam ipsæ venæ absorbere possunt, & simul ex illa vehementi pressione periculum sit, ne membranae, ac vasa extendantur, & fibræ rumpantur. Hoc in casu phlebotomia celebrari potest, ut nimium sanguinis motum modere-mur, sed interponenda sunt temperantia, alias venæ sectio plus obesse, quam prodesse potest. Phlebotomia enim non intendimus sanguinis derivationem à parte affecta, cum, circulatione detecta, sanguinem per partem affectam circulari sit sole clarius, sed venæ sectio hoc in casu præstabit, quod sanguinis impetum, & copiam diminuat, unde ar-

teriarum, vasorumque latera con-cidunt, porisque eorum minus patulis factis, tanta humorum trajectio, & pressio fieri non potest, & præcaveretur, quo minus per pressionem à tergo sequentem, vel profundiores emergant obstructiones, vel ipsarum fibrarum ruptiones.

Si tandem nec obstructio à sanguine excitata referetur, nec sanguis extra sua vasa effusus, & in grumum concretus resolvatur, inflammatio discuti nequit, & abscessum fieri necesse est: quod facile deprehenditur ex majori doloris intensio-ne, & febris accensione, ut prædixit *Hip. 2. aph. 47.* *Dum pus sit, dolores, & febres accidunt magis, quam consilio.* Tunc suppurationis promovenda est externis remediis maturantibus, magis scilicet poros obstructentibus, qua obstructione facta, interior promovetur fermentatio, ac proinde rupis tubulis, materia extravasata, quæ in illis stagnabat, in unum congeritur focum, & in pus transit. Si concocta materia per ulcus liberè fluere nequit, aperiendus est abscessus, & idoneis curandus est medicaminibus, sublata namque inflammatione, facile ulcus sanatur.

C A P. XIV.

De Ulcere cum Erysipelate.

MUltoties ulceris curationem impedit superveniens erysipelas, non immerito itaque de erysipelate ulcus comitante impræsentiarum agamus oportet; si enim non submoveatur erysipelas, ulcus curari impossibile est.

Ery-

Erysipelas dicitur græcis, latinis vero *ignis sacer*, propter acriorem calorem, quam ægri in ambustis sentiunt, vel ignis dicitur sacer i, execrandus; à nonnullis medicis *ignis sylvestris* appellatur, quasi effratus ob fervoris ferociam.

Erysipelatis subiectum frequentissimè est cutis externa, atque extrema, interdum etiam membranæ, ac viscera interna, ut pulmo, cor, ventriculus, hepar, uterus &c.

Differt erysipelas ab inflammatione jam superius tractatâ, nam in hac calor ardens minor est, in illo vehementior, quia interdum cutem sicurit, ut vesiculæ excitentur. Differunt & dolore in inflammatione liquidum dolor est comprimens, & pulsans, in erysipelate vero dolor est mordens, & acicularum instar pungens. Differt colore, nam si digito pars inflammata prematur, permanet rubra, in erysipelate vero, admodò digito, recedit, cutis albescit, sed remoto, illicò rubescit. Præterea erysipelas colorem pallidum, vel flavum, vel ex utrifque mistum retinet, inflammatio vero rubrum. Tumor major in inflammatione, & non ita à premento cedit, qui tamen in erysipelate non observatur. Distinguitur etiam ratione subiecti, nam erysipelas cutem tantum obsidet, inflammatio vero præter cutem subiectam quoque carnem occupat. Inflammatio omni tempore, eodem in loco infixâ consistit, & erysipelas faciliè serpit de loco in locum, & ignis fatui instar modò in hac, modò in aliâ parte. Humor quoque erysipelas produciens tenuior est, quam inflam-

mationis. Tandem erysipelas ex febre acutâ discriminatur à phlegmone, quæ tertianæ motum habet.

Signa.

Erysipelas horripilatione incipit, calor intensior, & volatilior subsequitur, post quem febris cum siti, oris amaritie, & vigiliâ, quæ ad tertianæ typum accedit, & erysipelas antecedit. Adest in parte dolor acicularum instar pungens, color rubicundior apparet, qui loco sæpè mutatur ignis fatui instar, ac deservescente humore, ad flavedinem magis vergit. Tumor non tam altè elevatur ob minorem humorum stagnationem, nec tensio adest difficilis, cedit quoque digitis premantibus, & color rubeus in album mutatur, qui tamen illicò rubescit.

Causa.

Galenus pro erysipelatis causâ materiali bilem flavam statuit, & amarâ non absimilem illi, quæ in cysti felleâ continetur, copiosior quàm par est in jecore genita, & ex hujus visceris robore ad imbecillam partem depulsa. Ceterum parùm sibi constans idem *Galenus lib. 2. ad Glanc. c. 1.* ex tenuissimo sanguine, aut huic admistâ bile erysipeas fieri dicitur, ex purâ vero b le herpetem potius produci, quàm erysipeas. Id quoque declaravit: de tumoribus p. n. c. 10. Hanc *Galenus* inconstantiam in tradendâ erysipelatis causâ materiali multis in locis quicquam animadvertere potest.

Sed errat *Galenus* cum suis *Galenis*.

nistis, nam erysipelatis color flavus non est, ut in Ictericâ, nec pallidus, sed rubicundus, testaturque potius sanguinis, quàm bilis genesim. Præterea sanguineo temperamento præditi, & sanguine abundantes huic malo magis obnoxii sunt, quàm biliosâ temperie donati, & magnam bilis copiam habentes. Deindè appellant erysipelas apostema igneum, quia fit ex bile calidâ, & siccâ ignis elemento correspondente. Verùm videmus frustaneum bilis commentum, quia quæ ignis indolem imitantur, non sunt de biliosi humoris familiâ. Insuper in æquivoco volutantur, accipientes humorem felleum probabile, ut fusiùs in *Trutinâ cap. de Ictericâ* refutavimus. Undè falsum est quicquid de materiali erysipelatis causâ sectatores imaginantur, neque solidi quidquam habet eorum conjectura, quæ omnes morbos à quatuor humoribus mendar, qui nunquàm tales in viventium corporibus fuere, neque ii hos nunquàm viderunt, nec vident.

Dividunt in legitimum, & in illegitimum erysipelas; legitimum est, quod ex solâ bile, vel naturali, vel non naturali fieri autumant; illegitimum verò dicunt, quod ex bile non solâ, sed aliis commistâ humoribus originem ducit, ut si sanguis bilem superat, dicitur erysipelas inflammatum, si bilis à pituitâ superetur, vocatur œdematosum, si tandem bili prædominetur melancholia, dicitur scirrhusum.

Dupliciter quodcumque produci-
tur erysipelas vel ex prohibita transpiratione ab aliquâ causâ externâ

productâ, vel ex alicujus corporis partis vitio, ut vulnere, ulcere, contusione, fracturâ &c. Quoties transpiratio prohibetur, toties ultimum partium nutrimentum, quod in carnis poris retardatur, nè effluat eb pororum angustiam à causâ externâ causatam, à partium continentium calore agitur & degenerat fit, naturamque easdem continentes partes irritantem acquirit & fermentescit & fermentationis actione tumorem coloris mutationem dolorem, febrem, cuncta reliqua in parte producit. Ita quoque aliquo existente vitio in aliquâ parte sunt erysipelata, nam vitium illud partis, si assidua transpiratione non ventiletur quod remanet proximum partis nutrimentum inscit: propterea fit suis fibris continentibus exoticum & erysipelas excitat. Ultimum partium nutrimentum ex prohibita transpiratione in carnis fibris & in cutis poris retardatur salinam habet indolem ex cunctatione aciditatem concipit cui sulphureæ associantur particule, hoc mediante connubio, salinæ, acidæ & sulphureæ, quia exilissimæ sunt, fermentationis motum subeunt, quoniam per obstructos cutis poros resolvi nequeunt, à copiosioribus acidis coagulantur, & in obstructam curiem impelluntur, in hæc ob angustias remanent, eamque magis obstruunt, sanguinem, reliquosque succos circulares retardant in exilissimis vasculis non profunde latentibus, sed in cutis superficie existentibus, & ex eorum vitiata texturâ & lubricis particulis vividior *rubeus color* apparet quam in inflammatione, quæ in majoribus & profundis

fundis vas ex sanguinis coagulo fit ideoque digito premente, albescit pars quod in inflammatione non succedit. *Intumescencia, & resistentia* in erysipellate semper est minor quam in inflammatione, cum tubuli minores sint, & stagnans materia non adeo copiose congeratur, & cum fluidior facilius per vasa lateralia delabatur, nec tantam suscipit fermentationem, unde acidæ, salæ, acutæ, ceteræque particule in tubulorum fibrillas impingunt, quæ non distenduntur, quousque rumpantur, ut in inflammatione, & hinc oritur potius pruritus, quam doloris sensus, quia fibrillas afficiunt, & proximum cutis rere. Indefinens fit salium à sanguine secretio, quæ ad cuticulam demandantur, & priorum ibi commorantium copiam adaugent, cuticulam distendunt, à cute divellunt, eamque in vesiculas elevant, distentæ cuticulæ pori actiores fiunt, & diffusi per particulis salinis datur exitus, & pauciores hac de causâ exhalant. Hæ vesiculæ ichore repleta cernuntur, quem disruptæ reddunt, verum pus non exillant, quia partium corruptum, non est nutrimentum sed ichor tenuis roris instar aquæ, lucidæ, non absimilis scatet, qui sudore tenuis insensibiliter exhalare debebat, in parte coercitus fuit, & corrodentibus salinis particulis imbutus aquam causticam æmulatur.

Prognosis.

Ulcus cum erysipellate periculo non vacat, cum ob partis inbecillitatem, tum ob maximam humoris sta-

gnantis copiam, hinc est quoddam simulatum sit in parte nutrimentum degeneratum fermentescens, ita ut in continentibus altas egerit radices, satis rebelles est, vel à continentibus regi non potuerit: vel pravam acquisierit qualitatem quam natura vincere nequit, mortificatio succedit & inevitabilis mors, & quidem ob repellentium & refrigerantium remedium applicationem, vel ob aeris ambiens subitam refrigerationem aliquoties lethale observavimus quia ob hæc erysipelatis materia exhalare nequit, unde *Hip. 25 aph. sect. 6* inquit: *erysipelas foras intro verti malum, intus vero foras ex flere bonum.* & *in Co: sect. 2.* *Erysipelas vero foris quidem excare ntile, intro autem vergere lethale; ejus quidem res indicium est cum rubore evanescente, postus gravantur, & agrius spiritum trahit ager.* quia in externis exstans partibus ejus causa facilius transpirare potest; introrsum vero pulsa vitæ parat insidias, quia principes partes invadere potest. Erysipelas, quod ad alios sequitur morbos, nempe ossium denudationem, malum, ut prædixit *Hip. aph. 19. sect. 7.* *Ab ossis nudatione erysipelas malum.* In Ulcere item, vulnere, fracturis, luxationibus, difficilior est ejus curatio in his enim semper timere debemus, ne in alios exitiales degenerent morbos, nempe in ulcera sinuosa, corrosiva, phagedænica, & cetera. Si putrescit, vel suppuratur, quod rarissime contingit, malum portendit, ut asserit *Hip. aph. 20. sect. 7.* *Ab erysipellate putredo, & suppuratio, malum.* quia nimiam humoris acrimoniam, vel caloris nativi debilitatem ostendit.

dit; sæpissimè namque in prævum ulcus, vel in gangranam abit. Facile hoc malum recidivare solet, vel aliquandò in ulcera degenerat rebellia. Eventus salutis in erysipellate est ut plurimum per insensibilem transpirationem, ubi, accedente pruritu, cuticula quasi in squamas fatiscet, & calor in ordinarium, & consuetum mutabitur.

Curatio.

Ulceris erysipelatosi curationem aggrediuntur vulgares, primò visà erysipelatis facie, venam secant, & quidè miramur, si namque inflammatio adsit, sanguinem fundunt eodem pariter modo, attamen in eorum sententià inflammatio in causa sanguinem, & erysipelas bilem cognoscit, quare deindè in erysipelate venam secant, id minimè intelligere possumus. Postmodùm ad eandem educendam bilem medicamentum cholagogum præscribunt, ut

℞. Fol. sen. or.

tart. alb. ana. ʒ. i.

myrobol. citrin. ʒ. ij.

rhabarb. elect. ʒ. ʒ.

f. decoct. in aquà cichor. & in suff. quantitate diss.

manna elect. Calabrensis,

ʒr. de Cichor. Nic. ana ʒ. iij. m. f. p.

Interim fortiores injiciunt clysteres, vel prædictum reiterant purgans. Verùm in hoc morbo neque phlebotomia, neque medicamentum purgans convenit, nam ambo à circumferentia ad centrum trahunt, quæ medicamentorum genera introsum pellunt, morbiicam cau-

sam ad principales trahunt partes & exitiales morbi inde evenire possunt, ut inquit *Hip. Erysipelas foras intro verti, malum.* Præterquam quòd tali remedium supellectile curati, si quandoque curantur, in hoc malum sæpè incurrere solent. Ad sanguinis effervescentiam, & bilis correctionem varios exhibent refrigerantes syropos, ut *de endiviâ, nymphæâ, violis, cichorio &c.* cum aquis etiam refrigerantibus, ut *portulacæ, lactucæ, cherisoli, lupulorum &c.* Nec interim ulceris obliviscuntur.

Quòd ad topica, ut id, quod in partem fluit, repellunt, & erysipelati frigefacientia admovent, & id, quod jam coacervatum est, frequenter alterant herbis refrigerantibus cum humiditate absque adstrictione, veluti est *sedum, portulacæ, cucurbita, lenticula palustris, solanum, sambucus, hyoscyamus, lactuca &c.* Solent his opii quid, & succi papaveris, cicute, & mandragoræ admiscere, & composita concinnant medicamenta, vel utuntur cataplasmati de micâ panis. Applicant quoque olea refrigerantia, ut *rosaceum, violaceum, amygdalarum dulcium*, vel unguenta frigefacientia, ut est *refrigerans Galeni, album Rhafis, de santalo &c.* Cæterùm hæc topica refrigerantia perpetuò exitialia fucere; nam obstructis poris, erysipelatis causa nec attenuari, nec intro foras exhalare potest, undè tragicos eventus, quos nos autopsia docuit, expectare oportet.

Curationem ulceris erysipelatosi facile assequimur, si æger in sex rebus non naturalibus optimè regatur.

& primò ær sit temperatus ad calidum vergens, vel saltem non sit frigidus, vitatis summopere utriusque extremis; calidior namque plus iusto poros dilatando, nimis eliminare potest; frigidior cutem magis densat, & malum peiorat. Viñus temperatus, non autem refrigerans est agro adhibendus, qui potius si crassus, quam tenuis, acidis vitatis, nocent etiam omnia alimenta salsa, dulcia, saccharata, pinguis, & nimis calida. Lymphaticum exhibendum est vinum, in quo si alkali cancerorum fluviatilium infundantur, saluberrimum erit. Si vinum non bibat æger, pro potu utatur decocto cornu cervi, salsa parilia, vel *sassifraga*; & si vinum bibat, hoc decocto diluatur. Somnus multum conducit, quia transpiratio major sit in somno, quam in vigiliâ, undè si noctes vigilantur amaræ, vel *theriacâ novellâ*, vel *pilulis de cynoglossa*, vel *discordio*, vel *laudano opiato*, vel *nepenthe* concilietur somnus; anodyna enim morbo, & symptomati suffragantur. Motus intempestivus absit, quia succorum exhalationem faciliè impedire potest, undè eorum coagulatio oritur, & indè cordis palpitatio. Animi pathemata, & præcipue exardescencia, timor, & mæstitia vitentur. Alvus servetur lubrica, saltem arte, si naturaliter haberi non possit.

■ Sanguinis missio in erysipelate nullatenus præstat, estd non solum semel, & bis, sed ter, & quater in praxi à vulgaribus magno cum ægri periculo celebretur; nam erysipelatis materia non est intra venas, ac proindè phlebotomiâ depleri ne-

quit. Præterea corpus refrigeratum sit debilius, & ad exhalandum ineptius. Eadem quoque ratio pro medicamento purgante militat, cui nos addimus naturam ad motum contrarium impelli.

Indicatio ulceris erysipelatosi curativa desumenda est à causâ; reseranda est itaque pororum cutis obstructio, & ultimi partium nutrimenti in fibris coagulatio ac statui fluido reddenda est. Internè conveniunt diaphoretica, ut causa stagnans per poros sufflaminetur, ut *sibium diaphoreticum*, *bezoardicum minerale*, *martiale*, imò omnia *chalybeata*, *spiritus c.c. volatilis*, *salis fumarie*, & *cardui benedicti volatilis*, *c.c. sine igne paratum*, *ebur philosophicè præp.*, *spiritus tartari*, *oculi cancerorum*, *sanguis leporinus*, *spiritus florum sambuci*, *sal volatile succini*, *viperarum*, *aqua theriacalis cum spiritu vini* &c. ut

℞. *Bezoardici marialis* ℞j.

salis card. bened. volat. ℞j.

salis volat. c.c. gr. viij.

salis volat. succini gr. ij.

sibii diaphoretici gr. xii.

m. detur cussidatim cum aqua theriacali. Vel.

℞. *Syr. Card. bened.* ℞jss.

eboris,

c.c. sine igne præp. ana ℞j.

salis volat. viper. gr. vj.

spiritus flor. sambuci ℞ss.

spiritus viridoli Martis gutt. v.

aqua card. bened. ℞iij.

m. detur cochleatim.

Hæc medicamenta diaphoretica præterquam quòd naturæ motum adjuvant, & sufflaminant, aciditatem sub cute, & inter carnis fibras obtundunt, inscungunt, & absorbent

bent ab a'kaliū energiam.

U. verò pororum obstructio melius tollatur, & auferatur, parti affectæ adhibenda sunt varia loca- lia, & remedia topica, cæterum à refrigerantibus omninò cavendum, in parte scilicet qua erysipelas appa- ruerit, quia pertinacem redderent causam, ut multis in locis notat Galenus, & præcipuè in libello quos, & quando purgare oportet, ubi pur- gantia medicamenta, alioquin ca- lida consulit pro febrium curatione, non quia refrigerant, nàm potius calefaciant, sed quia febris mate- riam exturbant. Duo occurrunt medicis inconvenientia, qui refri- gerantibus utuntur in erysipelatis curatione; primum est, quod ery- pelatis materia à refrigerantibus re- percussa in internas, nobilioresque partes remeat; secundum, & quod frequenter accidit, est, quod cum refrigerantibus impediatur, quominus materia exhalet, & quia pravae qualitatæ, solidarum partium ca- lorem suffocat, & gangrænam in- ducit. Hæc topica sint resolen- tia, & diaphoretica, vel acidum de- struentia & coagulata materiam dissolventia, ut materia sub cute, & inter fibras stabulans dissolvatur, & liberior concedatur transfluxus. Hinc commendamus omnia alkalia, quæ etiam diaphoreticam habent energiam, & transpirationem ad- juvant. Nonnulli telam leporis sanguine martio capti imbutam, & usû, tempore aquâ florum sambuci humectatam tepidè imponunt, cui multum fidunt. Omnes ferè com- mendant forum ex vini spiritu sim- plici, vel ex aqua theriacali cum

eo sem vini spiritu elicirâ, sed cau- è procedendum est in hujus remedii applicatione, nam si ob humoris erysipelas generantis malignitatem satis cedat languens, vulgo, & vul- garibus medicis tali applicationi mortis occasio adscribetur. Vel utun- tur spiritu vini crocato, vel cam- phorato. Quidam utuntur vaporoso balneo decoctionis anodynorum; calidi namque illi halitus, qui ele- vantur, poros aperiunt, materiam coagulata, dissolvunt, attenuant, & evolare faciunt. Alii sequenti misturâ tepidè adhibent erysipelas aliquoties illiniunt, ut

℞. Aq. spermatis ranar. ʒ. iij.

spiritus vini camphor. ʒ. ss.

flor. sambuci ʒ. j.

tenâ. croci ʒ. ʒ. m.

Lapis medicamentosus aquâ si rum sam- buci solutus maximum est medica- mentum, si epidè cum petiis ap- plicetur, in cujus defectu vitriolum solum opus complet. Vel

℞. Aqua flor. sambuci,

spiritus vini ana ʒ. ij.

Camphora ʒ. ij.

salis jalmini ʒ. j. m.

qua misturâ lintheum quadruplica- tum imbutum sæpius parti affectæ imponatur, quo non tantum aci- dum peccans obrunditur, sed ob- struentes porositates referantur, qui- bus habitis, erysipelatis symptoma- ta, & igneus ardor inductus cetero certius cessabunt. Verum in hoc affectu, sicut in aliis, non semper uni medicamento insistentum est, multum namque juvat sæpius me- dicamenta mutare, quia sæpe unico effectum non prestante, aliud præ- stabit.

Si vesiculæ in loco affecto sunt excitatæ, aperiendæ sunt, ut contenta lymphæ acrior effluat, & subiectam non exulceret partem: deinde detesta curis linimento ex cerussa, & spiritu vini illiniatur, vel decocto malvarum ablatur, ut omnia salia ab ipsâ diluantur, & recentibus ulceribus non detur occasio.

Postquàm erysipelas ab ulcere ablatum fuit, ipsius ulceris curationem aggredi debemus, nec proinde perseverante erysipellate, ulceris immemores esse debemus.

CAP. XV.

De Ulcere œdematoso.

Si lymphæ in partium ulceri circumpositarum porositates è lymphaticis vasibus effundatur, nec convenientes ductus subire valeat ob eorum angustias, aut aliâ huiusmodi causâ, & ob assiduam novæ materis ejusdem naturæ effusionem aded cumulat, ut partem ulceri proximam in tumorem attollat, & sit ulcus œmatodes. Oedema est tumor aquosus, mollis, latus, digito prementi cedens, indolens, albicans, sine calore, & rubore, ortum ducens à lymphâ è suis ductibus evasata.

Signa.

Oedematis signa ex iis, quæ in ejus descriptione retulimus patescunt. Est tumor, quia reферatis vasibus lymphaticis effluit lymphæ, & diuturniori aggestione omnes partis

pori implentur, eamque in tumorem elevat. Aquosus, quia à lymphâ, seu aquâ ortum ducit. Laxus, & mollis, quia nunquàm coagulatur, idèdque rarissimè, vel nunquàm in pus abit, nisi alkalia, & acida in eodem tumore pugnant, fermententurque. Doloris expers, nam iste succus fermentationem non subit, & particularum minimarum motus intestinalis non adest, undè fibræ contrahi, convelli, distendi, & lacerari non possunt. Est sine calore, & rubore ob motus fermentativi absentiam, undè inter tumores frigidus œdema collocarunt, quia latex quantum est ex se nullam effervescentiam concipere potest. Coloris subalbidus, quia contentæ materis qualitatem in superficie ostendit. Cedit sub digitis, & impressorum vestigia perseverant, & iterum elevantur, quia pars crassâ lymphâ est reферта.

Causa.

Galenii sectatores pro œdematis causâ nimiam pituitam existimant, sanguinem nempe crudum, pituitosum, non benè ab hepate elaboratum, [credunt inepti hepar esse sanguinis officinam] ferosum, non tantum intra massam sanguineam admistum, sed etiam intra externas corporis partes è venis effusum. Hinc imaginantur œdema vel esse simplex i. verum, & exquisitum, quod ex pituitæ influxu fit; vel compositum scilicet cum ex humore pituitoso cum aliquo alio humore permisto producitur, nam cum sanguine dicitur œdema phlegmonosum, cum bile

bile erysipelatosum, miramur tamen huic divisioni non addere oedema scirrhusum. Causa antecedens abi, sit iudicatur humida ventriculi, cerebri, vel hepatis intemperies, ac partis recipientis imbecillitas. Causæ remotæ sunt crapula, somnus immoderatus, vita sedentaria, alicujus evacuationis suppressio. Cæterum oedematis causa stolidos decipit vulgares: dicant quæso, quis est iste tam sedulus in oedemate separator, qui purum à sanguine serum secernit, & intra corporis fibras à venis absque ullâ sanguinis tincturâ effundit? Si serum, sive pituita cum sanguine à venis effunderetur, fieret potius in eorum sententiâ inflammatio oedematosa quàm purum oedema phlegmonosum, quod nec veteres, nec recentiores nunquam observarunt: alia ergo oedematis causa pervestiganda est, cum muscas in aëre volitantes venentur.

Secundum nostram sententiam fit oedema in ulceribus ex obstructione vasorum lymphaticorum à lymphâ, quæ in dictis vasis coagulatur; scaturit namque lymphâ alkalibus particulis, quæ acidæ acrimonie ope in materiam crassam, & lentam transfit, non aliter ac si cornu cervi decocto acidum assunderis, & in gelatinam mutatur, & in a guttiora vasa deferretur circulationis lege, ea obstruit, & novâ adveniente lymphâ conglobatio oritur, ulterius non progreditur, in illis remoram contrahit, non circulat, & perenni novæ lymphæ succedentis affluxu vasorum tunicas ampliat, & dilatat, ac partes circumjacentes in tumorem elevat oedematofum. Inter-

dum tanta sit lymphæ coacervatio, ut tunicarum fibræ non amplius sese extendere possint, & tandem disrumpantur, vel hoc accidit ope medicaminum acrium, aut acidorum salium, quæ ulcus excitant, & vasa contentum effundant intra vicinas partes liquorem, qui hydraulicus non parit regulis, ac extra vitæ consortium semel rejecta lymphâ excrementi naturam subit, & deorsum sæpè properat, proprio gravata pondere, & hac ratione sæpè tumores oedematofos in pedibus observamus. Interim lymphâ torpida lymphaticorum vasorum ostia, à quibus reteratur, nec subingredi valere, nec subingredi valere, nec forberi, & ad renes delabi, ut ultimam lotii determinationem subbeat. Breviter igitur immediata oedematis causa est lymphæ in parte quædam stagnatio à vase lymphatico obstructo, & distento, vel ab effusione ejusdem in partem, in qua colligitur à rupto vase. Antecedentes causæ sunt obstructio cachexia, vel aliud erratum in sex rebus non naturalibus vulgè dictis, & præcipuè immodicus porus.

Prognosis.

Oedema ex obstructione periculosum pathema minime est, si exquisitis remediis tractetur, si verò ex ductuum lymphaticorum disruptione ortum ducat, nunquam in supurationem abit, & pessimi ominis est, hydropem namque ascitem irreparabilem præ foribus præstolat. Quandòque ob nimiam vasorum compressionem, & salis volatilis

illis defectum in lymphâ, œdema in gangrænâ, & sphacelum transit, prout tale quid simile hydropicis multoties accidisse observavimus.

Curatio.

Galenî affectu œdema curare flagunt vel per resolutionem, vel suppurationem. Resolutioni satisfaciunt, humorem pituitosum præparando, deinde phlegmagogis pituitam educunt vel in forma potus, vel pilulis sine quibus, de hermodactylis, vel de agarico, sed efficaciores existimant pilulas cochias Rhasis, nam omne pituitæ genus absque corporis agitatione, & alteratione purgare credunt, præsertim si cum mastichinis permisceantur. Cæterum quia pituitæ fontem, ventriculum esse imaginantur, non semel ad emetica confugiunt. Venæ sectionem in œdemate negant, quia frigidus est affectus, attamen, si à mensibus, vel hæmorrhoidibus suppressis ortum ducat, eam admittant.

Si his non cedat, ad repellentia circa initium accedunt, non tamen valde frigida, sed moderatè, & simul adstringentia, & exsiccantia, hujusmodi est oxycratum, quod ex aceto, & aquâ constat, ita tamen temperatum, ut bibi possit. Verum tam acetum, quam aqua in eorum sententiâ sunt frigida, quæ pusillum calorem in parte œdematosa extinguere, & gangrænâ inducere possunt. Priusquam oxicratum applicent, partem affectam leviter fricant, ut medicamenti vis citius penetret. Cæterum ita peragendo, malum pejorant. Spongiam oxicroto imbutam supra œdemate arde

ligant, attamen semper ligaturæ initium ab inferioribus partibus ducunt, ibique valentiùs ardeant, & ad superiores progrediendo desinunt; sic enim ab affectâ parte faciliè exprimi, ac simul dissipari humores, qui extrâ vasa existunt, ineptè credunt.

Quod si tumor non subsideat, majoris energię medicamen applicant, ut spongiam aquâ aluminosâ imbutam, cui myrsi succum admiscant. Quibus nihil proficientibus, ad validiora confugiunt medicamina, nempe ad decoctum foliorum myrsi, absinthii, chamomilla, stœcador, nucis cupressi, salvia, rosis marini, aluminis rocea, & salis communis, in quo calido linteola intingunt, & œdemati imponunt. Quibus etiam non juvantibus, ad efficiantiora, & validiora recurrunt, ut

℞. Lixivii acerrimi ex cineribus sicci, ac vitis confecti lib. ij. aceti acerrimi lib. ss. olei ʒ. iij. m.

Macerentur, & spongiam madefactam calidè loco applicant. Verum ex lixivio, quod alkalia continet, & aceto magna succedit fermentatio, undè alkalia, & aceti acor obmutuum fermentationis motum obtunduntur, præcipitantur in vasis fundum, & hebes, ac æstetum resultat medicamen. Item ex lixivio, & oleo nostrates mulieres pro capitis ablutione præsentaneum faciunt saponem, undè nullius efficacię medicamen emergit. Vel œdematoso loco spongiâ, vel linteolis aquam calcis applicant. Quod si tumor ad declinationem venerit, sequenti utuntur cataplasmate, ut

*℞. Sulphuris,
farina fabar. ana ʒ. iʒ.
stercoris columbini ʒ. iʒ.
mellis communis ʒ. i.
decoct. radic. asphodeli q. s.*

*etque ad cataplasmatibus consistentiam,
& bis in die renovant. Quod si tu-
mor in duritiem abierit, in scirrhum
degeneravit.*

Quandò oedema ad suppurationem tendit, quod rarissimè contingit, nam ad suppurationem promovendam requiritur calor, qui in hoc tumore satis est imbecillis; tunc ea, quæ concoquendi, & suppurandi vim habent, medicamina applicant. Inter suppurantia non infimum locum tenere dicunt emplastrum ex *succis lappæ, ebuli, sambuci cum althea decoctis, melle, & oleo.* Si tumor vi suppurantium non rumpatur, in loco declivi, servatâ fibrarum rectitudine vel ferro, vel corrosivo medicamento aperiunt. Verùm has suppurationes non semel in sinuosa, putrida, ac exitialia ulcera degeneratas vidimus. Ulcus apertum mundificant, & digerunt terebinthinâ ovi vitello mistâ cum pauca quantitate gummi ammoniaci in aceto soluti. Peractâ digestionem ulcus unguentis sarcoticis carne implent & tandem cicatrizant.

Sicut ulcus sanari non potest, nisi prius oedema submoveatur, ita oedema submoveri nequit, nisi duellum lymphaticorum obstructio, vel evasata lymphæcinitus tollatur, primo itaq; lympham per sedem urinam & cutem evacuari oportet. Cathartica lympham excernentia (verum nobis impossibile videtur) sunt. *resina jalappa, extractum mechoacanum, gum-*

migue, conservæ storum piscicorum, & id genus alia. Dieta similiter talis esse debet, ut lymphæ absumi valeat. Aër debet esse calidus, ut calor externus cum remediis intro assumptis simul cooperetur; frigidus namque maximè nocet. Vidus sit tenuis, & cibi coctus faciles. Aqua omnino vitanda, & vinum, vel decoctum sassafras in minimâ quantitate usurpari debet. Vigiliæ, & somnus non excedant mediocritatis limites. Exercitium sit moderatum. Excreta, & retenta naturalem servant tonum. Animi pathemate, & præsertim terror, & mæstitia vitentur.

Postmodum proficua sunt medicamenta illa, quæ lympham incidendi, & attenuandi vim habent, nam ad fluiditatem redactâ obstructiones referantur, ad pristinum circulationis motum revertitur, & per urinam, ac per sudorem eliminatur. Huic fini incumbendum tum internis, tum externis remediis: oedema igitur tractandum est medicamentis incidentibus, & simul attenuantibus lympham, ejusque stagnationem resolventibus. Commendamus itaque diaphoretica, omnia salia volatilia, & aromatica pluries decantata, quæ coagulationem destruant, & nisi diaphoresim aperiant, saltem diuretica referant vias. Magnoperè conveniunt, quæ visciditatem tollant, & obstructiones aperiunt, hujusmodi sunt *vinum absinthii, tartarus vitriolatus, sal absinthii*, omnia medicamenta ex Marte elicita multis emolumentum fuisse, quia præter incidendi, & aperiendi energiam, lymphæ ductum

membranas nimis ampliatas suâ au-
steritate constringunt, lymphamque
ad corporis cisternam propellunt.
Itèr conducunt *decolla ligni guajaci*,
salsa parilla, *ligni sassafras*, *visci quer-*
cini, *Nephriticæ* &c. Similiter, quæ
per urinam exturbant lymphæ col-
luviem ulceratam partem obsiden-
tem, ut *sal prunella*, *stipitum faba-*
rum, *genista*, *spiritus salis dulcis*, *bac-*
charum juniperi, *salis armoniaci*.
Tandem ea omnia, quæ in hydro-
pe proficua sunt, conveniunt, nam
oedema est hydrops particularis.

Internis hisce simul externa jun-
gimus, ea spirituosâ penetrantia,
poros referantia, & resolventia esse
debent, ut lymphæ coagulatio dis-
solvatur, & fluidior reddita, vel ad
ductus urinarios devehatur, vel per
partis affectæ poros exhalet. Con-
veniunt cum aqua balnes Gurgistelli ex
Pistebus delatæ, idem spiritus vini,
& Laconica dicta. Sic etiam forus
ex aromaticis, & sale volatili con-
stantibus vegetabilibus, & calidè
applicati debent. Pars arctius de-
liganda, ut vasorum amplitudo de-
bito major auferatur. *Radix bryo-*
nia confusa, & cataplasmatibus in hæc
applicata salutare præstat auxilium.
Vel cataplasma ex origano, *calamin-*
tâ, *absinthio*, *rutâ*, *ore marino*, *cha-*
momilla &c. *Velempastrum de cumi-*
no cum oleo tartari, & *succini malaxa-*
to, vel *emplastrum de bacis lauri*.
Liquores spirituosos illiniendi sunt,
ut *oleum philosophorum*, *spiritus vini*
camphoratus, *lumbicorum*, & alia
resolventia.

Ulcus tandem tractari debet haud
secus ac si adjunctam haberet humi-
dam intemperiem, de qua cap. xi.

abundè diximus.

CAP. XVI.

De Ulcere sordido, & putrido.

Solet quondòque ulcus, vel quia
negligenter curatur, non mun-
datur, nec rectè detergitur, vel un-
ctuosis tractatur medicamentis, vel
aliis de causis, in sordidum, & pu-
tridum degenerare: sordidum ita-
que ulcus illud dicitur, quod crasso
illo abundat excremento, vel cras-
sas, & viscosas habet sordes, vel
carne flaccidam, mollem, & al-
bicantem; putridum verò appella-
tur illud, quod foetorem exhalat,
quippe ab eo graveolens, & cadave-
rosus provenit odor:

Signa.

Ex suprâ dictis facillimè hæc ul-
cera dignoscuntur, & non nisi se-
cundum magis, minusvè differunt;
sordidum namque crasso, viscido,
ac subalbido nè refertur excremen-
to, quod ulceris parietibus vehe-
menter adhæret, & carne flaccidâ,
molli, & albicanti potitur; putri-
dum verò putrilagineâ crusta: ma-
teriam, quæ graveolentem, & ca-
daverosum expirat foetorem, & co-
lore fusco, vel atro est imbutum.

Causa.

Ulceris sordidi, & putridi causa
apud Galenistas est humidorum, &
oleosorum medicaminum longus
usus, & frequenter ob succorum

vitium, à quibus pars exulcerata fovetur, vel varii errores in victus ratione, simulque mali succi, undè cacochymia, & ulceris sordities, ac putrilago. Quandoque ob naturæ defectum producit, quæ aliis vexata malis, ad quæ superanda intenta, & occupata est, ità plânè ut ulcus omni auxilio destitutum relinquitur; hinc humores crassi, ac vitiosi in sordidos, & putridos degenerant, qui à naturalibus afflictæ partis facultatibus non regulati, non modò fordescent, verùm etiam putrescunt.

Excitant juxta nostram sententiam hæc ulcera particulæ acidæ, vel acido salis, quæ ulceri inhærentes, succos dulces de novo alluentes, fermentativâ vi itidè in acidos degenerare faciunt, qui ob tubulos in ulcere ruptos circulationem continuare nequeunt: à Succis ergò à tergo continuò insequentibus in ulceris cavitatem propelluntur, quam semper adimplent, & quia aciditate nimia præditi sunt, coagulationem quandam lentam habentes, sordidum efficiunt ulcus, & dùm in eo coagulantur, caro mollis, vel fungosa ab iisdem gignitur. At succi acido salis, vel acido acres temporis progressu exaltantur ob putrilaginem, & sediticam, ac resgarinam nanciscuntur naturam, & ulceris partes putrescunt, idèdque cadaverosa illa caro in suavem, & graveolentem expirat odorem.

Prognosis.

Ulcus simpliciter sordidum periculo vacat, at nisi maturè occurrat,

in putridum degenerat, cum quia sordium copiâ impediuntur effluvia subtilium particularum excrementitiarum propter prohibitam transpirationem, vel obstructionem, quæ in ulcerato membro gignuntur; tum etiam quia cumulara excrementa singulos in dies magis fermentescunt, & malignam quandam, & arsenicalem adipiscuntur indolem majori aciditatis exaltatione, undè ulcera putrida priùs in gangrænam, & deindè in sphacelum transeunt.

Curatio.

Ulceris sordidi curationem agrediuntur Galenici, primò rectâ rerum non naturalium administratione; deindè humorum viriosorum, & redundantium evacuatione, pro qua pharmaca crassos, lentosque humores evacuantia exhibent vel unicâ vice, vel paritibus vicibus, nec interim revellentium omnium genera omittunt, ut frictions, cucurbitulas, & id genus alia. Postmodùm quo ad localia, ad sorditiem detergendam, & exsiccandam conferre dicunt lotiones ex decocto lupinorum, hordei, absynthis, milii, plantaginis, in quo oxymel dissolutum fuerit, vel fiant ex aquâ aluminosâ. Post lorionem impleatur ulcus pulvere aluminis saccharini, æris usti, vel chalcantis rubri, vel applicent unguentum deterisivum, quod concinnatur ex farinâ hordei, melle, succo apii, & pulvere aluminis rocca, vel demùm, si putredo adsit, ad unguentum ægyptiacum, vel apostolorum confugiunt.

Qui

Quibus nihil proficientibus, ad incisionem, vel ignem actualem deveniunt, priusquam sordidi, ac putres humores majora accerant mala. Ulcus absterfum vino calido rubro corroborant, in quo coquant *myrrham, thūs, aloē, & similia* sarcotica, vel spongiam vino calido madidam applicant.

Ulceris sordidi curatio in eo consistit, ut succi attenuentur, fluidiores, ac spirituosiores reddantur, particulæ acidæ, vel acido-salæ abundantur, immuentur, diluantur; ad finem obtinendum, interne conducit pulvis *anisonis diaphoretici, oculi cancerum, & chalybis*, quia satis potens est in absorbendis acidi spiculis. Sudorifica, & diaphoretica pluries recensita negligenda non sunt, & etiam ad decoctorum usum, vel ad decoctiones vulnerarias confugere possumus, eo quia maximam acidum immutandi vim habent. Verum si occasiones in primis viis stagent, productorum evacuatione leniter tolli debent.

Inter topica ad abstergendam crassam sordem, & corrupta fragmenta removenda, ea sunt administranda medicamenta, quæ propriæ substantiæ tenuitate, quæ prædita sunt, in sordē illam facile penetrāt, attenuāt dissipatum, crassumque excrementū quantumvis viscidum immutant, abstergunt, & sequestrant; calidē itaque usurpamus lotiones ex *aquâ lapidis medicamentosi, vel aquâ calcis, sapherinâ, vel aluminosâ salp.* Prodest emplastrum de gratiâ Dei, vel sequentem efficaciorē compositionem adhibemus, ut

*℞. Aqua Regina Hung. ʒ. ij.
infusurâ myrrh.
aloes ana ʒ. j.
salis armoniaci ʒ. jss.
camphora ʒ. ss. m.*

quam quater de die calidē applica cum filamentis. Si sordidum in putridum jam ulcus degenerarit, supra dictâ compositione ablucendum est, vel *unguentum ægyptiacum magistrale* applicari potest, sed præstat *unguentum nostrum compositum, vel magistrale*. Cæterum ulceris putrilaginem maximē immutat, abstergit, & à parte sanâ separat *manamercurii, magnam calcinatum Paracelsi, mercurius præcipitatus tan par se, quàm unguento admixtus, vel mercurius dulcis.*

Si efficaciora applicare velis, putridum ulcus tange *aquâ persicaria spiritum mercurii albi imprægnatâ*, filamenta superponendo, & ad miraberis effectum. Tandem mundificato ulcere, sarcoticis utere ad cicatricem usque.

CAP. XVII.

De Ulcere Vermineo.

Quemadmodum in omnibus humani corporis partibus integris vermes generantur: ita in iisdem ulceratis multoties vermes inveniuntur, præcipue si imprudenter tractentur medicamenti unctuosiss, vel negligantur; tunc enim fordescunt, putrescunt, & verminans ulcera, nisi rectè à pure, & sanie mundentur, & detergantur.

Signo

Signa.

Si ulcus sit superficiale, vel patens, vermes facile visui patent; si verò sit profundum, vel angustum habeat orificium, & vermes videri non possint, ex aliis signis cognoscuntur, morfu, puncturis, doloris, & motus sensu. Plerumque & fœtor quidem in talibus ulceribus percipitur.

Causæ.

Ut horum animalculorum genuinam inquiramus causam, methodo procedamus oportet, ac proinde præmittimus, quòd animalium propagatio duplex est, una, quæ dicitur ovipera, quatenus scilicet animalia ova pariunt, ex quibus ab ipsis exclusis, animalia viventia sunt; altera vipera, quatenus animalia in se concipiunt, & viva pariunt. Ad utramque propagationem solius patris requiritur semen, à quo sit conceptus, & in quo anima est formationis viventis animalis principalis causa. Ova habere futuri animalis animam patet ex eo, quod quamprimum à debito caloris gradu foras, in iis anima exierit, & animal simile ei, à quo ova fuerunt exclusa, format. Neque generans hujus formationis causa esse potest, cum id sæpè, cum ova excluduntur, mortuum sit, neque etiam ulla alia causa univoca, vel cogitationis inveniri potest. Notandum

est ex ovis gallinarum pullos ab anatibus, & econtrà, excludi. Imò Cauri calore fornacis pullos excludi, & in multis nostris pagis simi equini calore: in quibus modis nulum agens univocum dari potest, nisi spiritus, sive anima latens in ovo.

Animalium ova media sunt inter semina plantarum, & animalium, quia cum utrisque in quibusdam conveniunt, & in quibusdam differunt: seminibus plantarum in hoc respondent, quòd & animam, & materiam corporis formandam continent; præterea verò semen cortice, & membranis tegitur, in eo verò est differentia, quòd plantarum semina, cum terræ committuntur, ex eà materiam corpori formando necessariam hauriunt, atque ex seminis materiâ primæ radiculae, & germina formantur, reliqua materia ex terrâ attrahitur. In ovis cum anima corticibus suis, & membranis ita vallata, & conclusa sit, ut extrà nihil attrahere possit, interim in ovo fœtus penè perfectus formetur: ova non solum animam, & materiam primis fœtus rudimentis formandis aptam, sed habent paratam universam illam materiam, quæ satis est, donec pulvis absolute formatus excludatur, & præter albumen complectatur etiam luteum, quo potissimum pullus jam exclusus, cum lacte quodam alatur, cum eadem primis statim diebus non sufficiat alimentum ore ingestum, Cum animalium

malium seminibus in eo conveniunt, quodd semen primò omnino in testibus, & parte testibus analogà perficitur [ut dicunt], & semen statim à mare in foeminæ uterum conjicitur, id quod non fit in plantis, quarum semina extra terram, earum nutricem, multis externis injuriis exposita sunt. Vivipera ab oviperis in eo differunt, quia vivipera non continent omnem materiam ad partum usque necessariam, ut ovipera; hanc enim dies in singulos è vasis maternis mutantur, nec præter lentorem albugineum alteram habent substantiam ovorum vitellis similem, quæ puerperio in alimentum cedere debeat. Quantobrem rectè notavit *Harvejus* non ea modò animalia, quæ dicuntur ovipera, verùm vivipera quoque & ipsum genus humanum ex ovo progigni, ne putemus hanc fuisse propriam, peculiaremque Tyndaridum sortem. Verùm nos ab *Aristotele* moniti sæpissimè observavimus in utero viviparorum certo quodam post concubitum tempore fieri conceptum oviformem, seu massulam instar ovimembranulà occulti, cui detractum sic putamen. In eo differunt ovipera à viviperis, quodd semen oviparorum non ut viviparorum in utero foeminæ, sed extrà perficitur, & propterea semen non liquidum, ut viviparorum semen permanere, sed externo adminiculo, & receptaculo regi debuit. In eo tandè plantarum, & viviparorum semina conveniunt, quodd

sicut plantarum semen terræ committitur, ibique nutritur, ità humanum semen in mulieris uterum conjicitur, ibique nutritur ad destinatum tempus usque, & sicut terra non est causa efficiens pro plantæ propagatione, sed tantùm uterus, ità & mulier non est causa efficiens respectu humanæ propagationis. Hinc mulier saccus vulgo appellatur, undè natis nunquam matris cognomen, sed tantùm patris imponitur.

Nec pater est causa efficiens immediata respectu filii, sed tantùm mediata, & occasionalis, nam licet pater generans respectu filii sit causa externa, tamen non est respectu generati immediata, quia scilicet non immediatè ex eo generatur filius, sed ex semine procedente immediatè ex patre, respectu cujus pater est immediata causa efficiens interna, cum ex ejus sensitivo spiritu viventi per concupiscentiam agitato sibi similis prodeat sigillaris veluti idea, quæ in intimà seminis parte clausa est. Atque adèd pater est causa efficiens immediata respectu seminis, & mediata, atque merè occasionalis respectu generati, seminis autem spiritus vicem efficientis immediatæ respectu filii gerit, & est respectu illius causa efficiens interna. Sic gallina non est causa efficiens respectu pulli, nec gallinam compressit, sed tantùm spiritus in ovo foecundo gliscens, quia ex ovo subventaneè non excluditur pullus.

Verùm, ne nostrum præmittendum in longum protrahatur, ex professo de oviparorum, & viviparorum

rorum propagatione suo loco agemus, desumptâ occasione ab hominis generatione; tantum hic agimus de sponte nascentibus, ut vulgè creditur, quorum generatio non univoca, sed æquivoca à vulgaribus philosophis putatur, talis est insectorum, ut ex equino stercore scarabæi, è frumento curculio, è fabis midas, colossus è lignis, è cutis, & vestium sordibus pediculi, & pulices, è caseo, & carne aliisque rebus putrescentibus vermes, & insecta, vulgè dicta varii generis, oriuntur. De horum generatione nihil aliud sciebant præsci, nisi quantum voces important: *Nascuntur ex putri.*

Quibus spontaneus hic ortus competeat non eadem fuit omnium mens. Putarunt præsci omnia insecta, bruta, ipsumque adeò hominem è terræ initio provenisse. Id *Plato*, aliique philosophi Platone longè vetustiores docuerunt, quos poëtæ secuti sunt. Verum hæc opinio ex Genesi originem habuit, & veritatem in has converterunt fabellas; cum constet Deum iussisse, ut terra animam in genere suo producat jumenta, & reptilia, & bestias terræ secundum species suas, & Deum fecisse hominem de limo terræ; ipsi verò Creatorem ignorarunt: spontaneum istum ortum inde commentifunt.

De talium viventium causâ efficienti valdè digladiantur philosophi.

Cardanus casu, & fortunâ generari contendit. Cæterum fallaciter convincitur, quia casus, & fortuna naturalibus locum non habent,

& quæcumque casu fiunt, & fortuitò, ea non semper ex iisdem principiis, & eodem modo generantur: atqui sponte nascuntur viventia, semper ex iisdem principiis, & eodem modo generantur. & habent certas causas efficientes, quæ etiam certi finis gratiâ agunt, certosque producunt effectus. Sic ex stercore equino scarabæi nascuntur, & non erucæ, à caseo sui generis vermes, alii è carnibus, & in genere semper determinata ex determinatis. Et licet variis in locis, in terrâ, in aquis, cadaveribus, & alibi generari videantur: tamen ex efficienti causâ, quæ pluribus, in locis sæpè reperiri potest, nascuntur.

Alii est casu, & fortuitò generari negant, nullam tamen causam habere efficientem proximam, sed solum communem, & remotam opinantur, & hoc discrimen ponunt inter viventia per se, & sponte orta, quòd illa præter agens universale, putà Cælum, & particulare expectunt *sol, & homo generent hominem;* sponte verò genita, causâ proximâ cum careant, absque agenti particulari producuntur. Ut ipsa appellatio id indicare videtur. Verum horum sententia falsa deprehenditur, nam inter causam, & effectum debet intercedere proportio, & effectuum universalium universales, particularium particulares debent esse causas. Præterea causæ communes, & remotæ omnes sunt externæ, & manifestæ: at sponte nascentia à causâ internâ, & latente in materia probabimus.

De causâ istâ remota in varias dividuntur opiniones philosophi.

Alii.

Aliqui prædictarum difficultatum scopulos considerantes, eosque vitare capientes, tanquam ad sacrum ignorantis azilum, confugiunt ad cælum, solem astra &c in illo existentia atque ipsis culpam generationis vermium tribuunt *alberius magnus* cœleste lumen causam proximam sponte nascentium esse dixit. *S. Thomas Aquinas* sponte nacentia à cœli motu mendicat. *Fernelius* occultas influencias infamat neque hos pudet talis inepti commentis: sed cælum sol, astra cœleste lumen, cœli motus &c generalis tantummodo causa esse possunt præparans causam, non vero particularis, & determinata ad hos producendos, & non alios vermiculos in hoc, & non alio ulcere, vel loco. Præterea lumen, calor, motus, & occultæ influentiæ accidentia sunt, at nulla substantia, quales sunt animæ sponte natorum, potest ab accidentibus produci. Insuper cælum, sol, astra &c. sunt corpora inanimata, nec animata producere possunt, quia producerent nobiliora seipsis.

Alii animam mundi causam efficientem sponte natorum viventium esse existimant: sed si mundus animam haberet, esset maximum animal mundus, & esset causa universalis, & non propria, & proxima, & sicut ab eâ sponte nascentia provenirent, ita non sponte nascentia, nec ab unâ animâ tot diversæ species sponte nascentium provenire possent.

Scotus, & alii animas viventium sponte generatorum à Deo proxima provenire statuunt, sed hi inepti.

D. Caroli Mussetani Tom. II,

tiores sunt, quia invenire nequeunt genuinam talium animalculorum effectricem causam, nec humanæ cognitionis imbecillitatem fateri volunt: opinantur Deum ipsum esse vermium causam, quod verissimum quidem est, si loquamur de causa universali, & remotâ. Difficultas tamen consistit in propriâ, peculiari, & proxima vermium causa, cui scilicet concessa fuit, dataque facultas à Deo, ut vermes generare possit. Neque enim vermes adeò nobiles, & perfecti judicari debent, ut à nobilissimâ, & perfectissima causa originem ducere debeant: Vix imò, ne vix quidem quisquam ausit illorum generationem, formationemque huic divinæ formatrici virtuti adscribere, haud intelligens, quonam pacto tam præstans, & tam nobile agens ad vilia hæc opera sine suæ majestatis læsione descendere queat; alia verò omnia ita ignobiliora, atque imperfecta, ut à vilissimis seminibus progigni tantum valeant: neque in universo condendo oblitus est consulere causis propriis vermium, cæterisque imperfectis, quemadmodum consulit aliis animantibus speciales habentibus causas. Neque tandem sunt minùs naturales, quàm cætera animalia causas naturales habentia. Denique ad adagium, quod à vulgaribus philosophis adduci solet quod *Deus nature author agere se solus tenetur id, quod causa naturales præstare non possunt*. Respondetur verissimum quidem hoc esse in supernaturalibus, non verò in instituto ordi-

K ne

ne naturæ, & in hoc non facile constat contractus cum testibus quo obligatum contendunt adversarii. quamvis enim in hac aut simili materia ab istis demonstrari non potest causa naturalis; ac proxima, non sequitur tamen ipsam nullam esse Deumque se solum vermes, & huiusmodi insecta producere: ergo ranas, muscas scarabeos, lumbricos syrones &c esse divinas creaturas sequeretur, quod ne dum absurdum verum impium putamus. Hinc magna temeritas est presumere nos nosse quidquid causatum est naturaliter & nullum fugere, quod supra ipsam naturam sit, nec verò alia possit quam ipse deus. Præterea omnium viventium generatio est naturalis, & causa naturalis inquirenda est, nec ad deum statim recurrendum est, nam *Tempus est philosopho ad Deum recurrere ubi potest causa secunda assignari*, quia postquam naturam instituit, iam immediate amplius nihil creare videtur præter animam intellectivam, & eum plantarum, ac brutorum sponte nascentium origo fit à suis parentibus, mediante semine, non à Deo nisi ut causam remotam, & universalem: eritne Deus causa proxima imperfectorum, & ignobilium animalium?

Omnes ferè nostræ tempestatibus gregarii philosophi putredinem solum proximam spontaneæ generationis causam statuunt, quibus sufficit unæversalibus quibusdam verbis quaestiones potius implicare quam solvere: dicunt gigni hæc animalia solum in corpore quam extra illud ex

putredine seu calore putredinali agente in quasdam particulas materiarum putrescentis, sed huius opinionis falsitatem ostendunt primò vermes in aceto, & nive geniti; hæc enim juxta vulgarium sententiam putredinem in misto inhihent, & in his frigiditas potius quam caliditas excedit. Deindè præclara experimenta *Francisci Rhedi* in libro de insectis descripta ostendunt, quod carnes & quodcumque aliud faciliè putrescibile inclusa in vase optimè cooperto, putrescunt, vermes tamen nunquam exhibent: tacemus, quod calor ille produceret corpus animatum, & consequenter se robilibus. Prætermittimus, quod intelligi minimè potest, quomodo calor admirabilem nervium organizationem, tot vermium species, animam, sensum, & motum producere potest: non negamus tamen necessarium esse nonnunquam calorem ad excitandum motum in interno spiritu in feminibus, sive ovulis vermium latente, sicut calor gallinæ, simi, vel fornacis Ægyptiæ, à quo fovetur spiritus in semine galli existens in ovo fovendo non est causa principalis generationis pulli &c.

Præterea tota putredinis ratio in eo consistit, quod sit misti corruptio, quatenus mistum: si verò quid præterea ex putredine oritur, id ex accidenti evenit. Insuper plantas multas, & alia sponte nasci sine omni putredine
expe-

experientia testatur : igitur sponte viventia non geneanturex putri materiâ , licet interdum nascantur in putri, & ex parte rei putrescentis.

His breviter explosis , alia causa de sponte nascentibus inquirenda est. Quæ non sponte nascuntur sunt illa , quæ semina habent manifesta , quæ verò sponte, eorum semina sunt occultissima, & omnem latent sensum ; idedque sponte nasci insecta veteres, & cum his vulgares philosophi existimârunt , quia eorum semina non semper animant, & suo tempore exerunt.

Generantur sponte viventia, cum semen , in quo est anima , occulto modo alicubi latens idoneam materiam nectum , & calore ambientis sese exierit , & vitales operationes exercere incipit. Hæc animalia ortum trahunt ex ovulis , quæ cum ab inconspicuis præ exiguitate initiis, & seminibus , quali atomis in ære volitantibus , & à ventis hinc illinc delatis, dissimatisque oriantur , sive ex putredine , seu non genitis orta esse existimantur , quia nostrorum sensuum efficaciam ludunt. Cæterum certum est animalia insecta ex semine paterno generari , & carniū , herbarum , aliarum rerum vel planè putrefactarum , vel putrescentium insectorum generatione non alias esse partes ; nec aliud officium , quàm vas , & locum mittere commodum præbeant , in quo

insecta statim ac orta sunt , in hoc nido alimentum sufficiens, & nutritioni commodissimum inveniunt , & nisi à parentibus supradictum semen hinc delatum sit, nullum ibi vermem unquam generari posse dicimus.

Sponte ortorum semina , estò in terram conjiciantur , non semper suam insistant exerunt vim, sed interdum frigore , interdum calore, vel etiam idonei alimenti defecerit corrumpuntur , interdum diu quiescunt , antequàm , sese exerant ; sicut semina multa totâ hyeme in terrâ quiescunt, donec nimirum aëris ambientis calore foveantur , & idoneum è terrâ alimentum attrahant : ita & in iis , quæ sponte provenire dicuntur , vis seminalis quiescit, donec idoneam , ex qua corpus sibi fabricet , materiam nanciscatur ; & à calore ambiente excitetur , & foveatur : undè accidit , ut animalia , quæ sponte nascuntur , non tempore hyberno, nisi sub fimo interdum , quò frigus non penetrat, sed verò, æstate, & autumno generantur , ubi scilicet à calore ambientis , quem sol extitit , materia idonea , ex qua anima latens corpus sibi fabricare possit , suppedietur , & ipsa anima ad agendum excitatur.

Et si in putrescente materiâ hujusmodi animalcula sunt, tamen non ex ea, quatenus patris est, generantur, sed potius à meliori ejus parte, quæ à patri secernitur. Unde etiâ post nerviū,

& ejusmodi animalium generationem, putris materia relinquitur, quæ non minus, quàm antè aërem inquinat. Neque etiam animalcula ejusmodi in materia putrescente genita putridâ aluntur materiâ, sed in alias res vel, ut plantas, & animalia viva delata, alimentum querunt. Neque etiam & regiones, in quibus nascuntur, & ejusmodi insectorum magna est ubertas, salubriores sunt, sed plerùmque insalubriores.

Siquis quærat, undè insecta sua primordia trahant, dicimus in illo creationis sextiduo creasse Deum omnia animalia qualiacumque perfecta, vel imperfecta, ut habetur primo Genesio v. 25. *Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas, & jumenta, & omne reptile terræ in genere suo.* Quæ mediante proprio semine suas perennant species, unde quæcumque animalcula coeunt, & ovo quid simile pariunt, ut per novorum individuum suffectionem suas perpetuent species, mediante illâ feracibien editione: *Crescite & multiplicamini.* In ejusmodi animalculis Dei O. M. sapientiam cognoscimus, licet ubique & semper sapientiam, & omnipotentiam manifestârit.

Animalculorum semina omnem humanam superant perspicaciam, nec nostris sunt obnoxia sensibus, quia *omnis nostra cognitio ortum ducit à sensu.* ò quamplurima cognosceremus, si sensus non ità hebetiores haberemus! Cœcutit animus humanus, & tanquàm Nicticoracis oculus caligat ad lumen horum generationis.

Insecta sponte nasci videntur, tamen propriè sponte non nascuntur,

sed ex semine, & ejusdem speciei animalculis; nam sicut pisces sua ovula in aquam emittunt, quæ postea in pisces ejusdem speciei excluduntur: ità & ranæ, & similia animalcula ignobiliora sua semina in aquam conjiciunt, quæ postea solis calore fovetur, & excitantur. Eterâ etiam animalia plurima nascuntur, verùm non purâ, sed limosâ, & lutosâ. Sic sperma ranarum ineunte vere, hinc indè circa lacus, & stagna reperitur, undè postea solis caloris beneficio internus spiritus in spermate latens, ranas efformat, easque in vive animalia excludit. Hanc veritatem noscens Ovid. lib. 15, metamorph. ità cecinit.

Semina limus habet virides generantia ranas

Æ lib. 1.

*Postquam vetus humor ab igne
Percaluit solis: cœnumque undeq; paludes
Intumescere aliu: fecundaque semina
verum*

*Pivaci nivistæ solo, cœu matris in
alvo*

*Creverunt, faciemque aliquam cepe-
re morando.*

Mitum etiam est ranas è terreno pulvere primis activis humecto pluviis nasci, taliter quod terræ tactu aquæ gutta illicò ranam generet. Cæterum dicant quæso, quis est ille sedulus ranarum genitor, qui extemplo tot ranarum corpora dicto citius organizavit, & omnibus partibus perfectè absolutis vitam, sensum, & motum impertivit? Concedimus utique ranulas primis activis pluviis extra civitates (sed intrâ non conspiciuntur, quare non respondent) salientes apparere, at allu-
giantur.

cinantur vulgares philosophi nam hæ ranulæ suis ortæ seminibus præ-
existerant abditæ inter herbas, ver-
pres, sepes, terræ foveas, lapidumque
rimas, deindè guttarum aquæ in
terram decidentium timore quasi
panico pervulsæ profluunt, & statim
se abdunt, ac quia antea non conspi-
ciebantur, tunc temporis vi aquæ, &
solis calore ex terræ pulvere dispo-
sitis, sponte, & sine patente natas fuis-
se ineptè imaginantur. Et nos præ-
dictas ranulas manu apprehensas
dissecuimus, & in stomacho herbas
crudas, muscas, & scarabæ os terræ
immistos, non digestos, quos devo-
rârunt, invenimus. In agris post plu-
vias innumeræ limacum copię, quæ
antea non conspiciebantur, appa-
rent. Numquid tunc sponte nasci?
Sic etiam post imbres magnam Lum-
bricorum catervam, & aggeriem
conspicimus. Dicitur numquid potest,
tunc sponte exortiri?

Horum insectorum occasione a-
gendum putamus de lumbricis, &
syronibus, qui in humano corpore
generantur. Hæc animalcula sponte,
& sine semine nasci vulgariū phi-
losophorum schola etiam conten-
dit, sed nunc talis opinio à recentio-
rum aulâ recessit, apud quos econtrà
illa invaluit sententia, quòd quic-
quid in hoc orbe sentire, imò vivere
videmus, ex ovo emerit, & ipsa in-
secta, imò plantas, & ipsum humanū
genus ex ovo ad unum univocæ ge-
nerationis principium reducimus,
ut ante nos *Harveius*, & eruditissimus
Franciscus Rhedi, Esculapius nostri
temporis validissimis rationibus, &
experimentis demonstravit, quam
doctrinam universus orbis litera-

rius amplexus est, ut aded apud eru-
ditos incluruit, ut in hac stabiliendâ
non immoramur.

Igitur quòd ad lumbricorum, &
syronum ortum sciendum est ex
quotidianâ experientiâ muscas, alia-
que animalcula ovulis suis epulas
nostras, æquè ac potus conspurcare,
eaque brevissimo spatio, per ætatem
præcipuè, in carnibus excludi, sed
cum nobis etiam mensæ accumben-
tibus, vel paulò antè, muscæ cibariorum
circumvolitent, vel ea inque ovula
erudent, qualis est panis, vel potus,
ipsis ita propè excludendis non ob-
stetricent, illa integra ore excipi-
mus; & cum ob exilem molis suæ, &
teneritudinem, dentium attritionem
declinent, intacta deglutimus, & ob
exilitatem à ventriculi fermèro non
digeruntur. Ea propter cum cibo-
rum reliquiis in eo concretis in duo-
denum descendunt, in quo uti in
reliquo intestinorum canali exclusa
in varias lumbricorum species com-
mutantur; minutiora verò aliqualia
ovula superfunè, quæ ob exilitatem,
vel immaturitatem tam in stom-
acho, quàm in intestinis cum spiri-
tuosâ ciborum substantiâ abripiun-
tur, & se insinuant, partim cum lym-
phâ permiscuntur, & circulant, par-
tim cum sanguine circulationis le-
ge, partim in universas corporis par-
tes devehuntur. Habitus autem cor-
poris passim poris est pervius, ij verò
quibusdam in locis patentioribus, &
in aliis actioribus: undè fit, ut ex
ovulis illis syrones exclusi per poros
unà cum sudore, vel habitibus, per eos
extrudantur, vel quandòque ob po-
rorum angustiam sub cuticulâ ser-
pant ab uno loco in alium, & calpa-

℞. Sulphuris,

farina fabar. ana 3. j℔.

stercoris columbini 3. j℔.

mollis communis 3. j.

decocti. radie. asphodeli q. s.

etque ad cataplasmatidis consistentiam, & bis in die renovant. Quod si tumor in duriciem abierit, in scirrhum degeneravit.

Quandò œdema ad suppurationem tendit, quod rarissimè contingit, nam ad suppurationem promovendam requiritur calor, qui in hoc tumore satis est imbecillis; tunc ea, quæ concoquendi, & suppurandi vim habent, medicamina applicant. Inter suppurantia non infimum locum tenere dicunt emplastrum *ex succis lapatii, ebuli, sambuci cum alibea decoctis, melle, & oleo.* Si tumor vi suppurantium non rumpatur, in loco declivi, servatâ fibrarum rectitudine vel ferro, vel corrosivo medicamento aperiunt. Verùm has suppurationes non semel in sinuosa, putrida, ac exitialia ulcera degeneratas vidimus. Ulcus apertum mundificant, & digerunt terebinthinâ ovi vitello mistâ cum pauca quantitate gummi ammoniaci in aceto soluti. Peractâ digestionem ulcus unguentis sarcoticis carne implent & tandem cicatrizant.

Sicut ulcus sanari non potest, nisi prius œdema submoveatur, ita œdema submoveri nequit, nisi durum limphaticorum obstructio, vel euacuatâ limpha pœnitius tollatur, primo itaq; limpham per sedem urinam & cutem evacuare oportet. Cathartica limpham excernentia (verum nobis impossibile videtur) sunt. *resina jalappa, extrahuntur methuacana, gum-*

migut, conserva sorni piscorum, & id genus alia. Dicta similiter talis esse debet, ut lymphâ absumi valeat. Aër debet esse calidus, ut calor externus cum remediis intus assumptis simul cooperetur; frigidus namque maximè nocet. Victus sit tenuis, & cibi costu faciles. Aqua omninò viranda, & vinum, vel decoctum salsastras in minimâ quantitate usurpari debet. Vigiliæ, & somnus non excedant mediocritatis limites. Exercitium sit moderatum. Excreta, & retenta naturalem servant tonum. Animi pathemate, & præsertim terror, & mæstitia vitentur.

Postmodum proficua sunt medicamenta illa, quæ lympham incidendi, & attenuandi vim habent, nam ad fluiditatem redactâ obstructiones referantur, ad pristinum circulationis motum revertitur, & per urinam, ac per sudorem eliminatur. Huic fini incumbendum tum internis, tum externis remediis: œdema igitur tractandum est medicamentis incidentibus, & simul attenuantibus lympham, ejusque stagnationem resolventibus. Commendamus itaque diaphoretica, omnia salia volatilia, & aromatica pluries decantata, quæ coagulationem destruant, & nisi diaphoresim aperiant, saltem diureticas referant vias. Magnoperè conveniunt, quæ visciditatem tollunt, & obstructiones aperiunt, hujusmodi sunt *vinum absinthii, tartarus vitriolatus, sal absinthii*, omnia medicamenta ex Marte elicitâ multis emolumentum fœdere, quia præter incidendi, & aperiendi energiam, lymphæ ductum

membranas nimis ampliatas suâ au-
steritate constringunt, lymphamque
ad corporis cisternam propellunt.
Item conducunt *decolla ligni guajaci*,
sassa parilla, *ligni sassafras*, *visci quer-
cini*, *Nephriticis* &c. Similiter, quæ
per urinam exturbant lymphæ col-
luviem ulceratam partem obsiden-
tem, ut *sal prunella*, *stipitum faba-
rum*, *genista*, *spiritus salis dulcis*, *bac-
charum juniperi*, *salis armoniaci*.
Tandem ea omnia, quæ in hydro-
pe proficua sunt, conveniunt, nam
œdema est hydrops particulavis.

Internis hisce simul externa jun-
gimus, ea spirituosâ penetrantia,
poros referantia, & resolutentia esse
debent, ut lymphæ coagulatio dis-
solvatur, & fluidior reddita, vel ad
ductus urinarios devehatur, vel per
partis affectû poros exhalet. Con-
veniunt cum aqua balnei *Gur-iselli ex
Pitheculâ* delatæ, cum spiritus vini,
& Laconica dicta. Sic etiam forus
ex aromaticis, & sale volatili con-
stantibus vegetabilibus, & calidè
applicati debent. Pars artius de-
liganda, ut vasorum amplitudo de-
bito major auferatur. *Radix bry-
onia contusa*, & cataplasmatibus in-
ter applicata salutare præstat auxilium.
Vel cataplasma ex *origano*, *calamin-
thâ*, *absinthio*, *rutâ*, *rosa marina*, *cha-
momilla* &c. Vel emplastrum de *cumi-
no cum oleo tartari*, & *succini malaxa-
to*, vel emplastrum de *baccis lauri*.
Liquores spirituosos illiniendi sunt,
ut *oleum philosophorum*, *spiritus vini
camphoratus*, *turbinicorum*, & alia
resolventia.

Ulcus tandem tractari debet haud
secus ac si adjunctam haberet humi-
dam intemperiem, de qua cap. xi.

abundè diximus.

CAP. XVI.

De Ulcere sordido, & putrido.

Solet quandòque ulcus, vel quia
negligenter curatur, non munda-
tur, nec rectè detergitur, vel un-
ctuosis tractatur medicamentis, vel
aliis de causis, in sordidum, & pu-
tridum degenerare: sordidum ita-
que ulcus illud dicitur, quod crasso
illo abundat excremento, vel cras-
sas, & viscosas habet sordes, vel
carnem flaccidam, mollem, & al-
bicantem; putridum verò appella-
tur illud, quod fœtorem exhilat,
quippe ab eo graveolens, & cadave-
rosus prouenit odor:

Signa.

Ex suprâ dictis facillimè hæc ul-
cera dignoscuntur, & non nisi se-
cundum magis, minusve differunt;
sordidum namque crasso, viscido,
ac subalbido est refertum excremen-
to, quod ulceris parietibus vehe-
menter adheret, & carne flaccidâ,
molli, & albicanti potitur; putri-
dum verò putrilaginea meretricia ma-
teriam, quæ graveolentem, & ca-
daverosum expirat fœtorem, & co-
lore fusco, vel atro est imbutum.

Cause.

Ulceris sordidi, & putridi causa
apud Galenistas est humidum, &
oleosum medicaminum longus
usus, & frequenter ob succorum

vitium, à quibus pars exulcerata fovetur, vel varii errores in victus ratione, simulque mali succi, undè cacochymia, & ulceris sordities, ac putrilago. Quandoque ob naturæ defectum producitur, quæ aliis vexata malis, ad quæ superanda intenta, & occupata est, ita plânè ut ulcus omni auxilio destitutum relinquitur; hinc humores crassi, ac viriosi in sordidos, & putridos degenerant, qui à naturalibus afflictæ partis facultatibus non regulati, non modò sordescunt, verùm etiam putrescunt.

Excitant juxta nostram sententiam hæc ulcera particulæ acidæ, vel acido salis, quæ ulceri inhærentes, succos dulces de novo alluentes, fermentativâ vi itridèm in acidos degenerare faciunt, qui ob tubulos in ulcere ruptos circulationem continuare nequeunt: à Succis ergò à tergo continuò insequentibus in ulceris cavitatem propelluntur, quam semper adimplent, & quia aciditate nimia præditi sunt, coagulationem quandam lentam habentes, sordidum efficiunt ulcus, & dùm in eo coagulantur, caro mollis, vel fungosa ab iisdem gignitur. At succi acido salis, vel acido acres temporis progressu exaltantur ob putrilaginem, & fæticam, ac resargarinam nanciscuntur naturam, & ulceris partes putrescunt, idèdque cadaverosa illa caro in suavem, & graveolentem expirat odorem.

Prognosis.

Ulcus simpliciter sordidum periculo vacat, ac nisi maturè occurrat

tur, in putridum degenerat, tum quia à sordium copiâ impediuntur effluvia subtilium particularum excrementitiarum propter prohibitam transpirationem, vel obstructionem, quæ in ulcerato membro gignuntur, tum etiam quia cumulata excrementa singulos in dies magis fermentescunt, & malignam quandam, & arsenicalem adipiscuntur indolem majori aciditatis exaltatione, undè ulcera putrida priùs in gangrænam, & deindè in sphacelum transeunt.

Curatio.

Ulceris sordidi curationem aggreduuntur Galenici, primò rectâ rerum non naturalium administratione; deindè humorum vitioforum, & redundantium evacuatione, pro qua pharmaca crassos, lentosque humores evacuantia exhibent vel unicâ vice, vel partitis vicibus, nec interim revellentium omnium genera omittunt, ut frictions; cucurbitulas, & id genus alia. Postmodùm quo ad localia, ad sorditiem detegendam, & exsiccandam conferre dicunt lotiones ex decocto lupinorum, hordei, absynthii, milii, plantaginis, in quo oxymel dissolutum fuerit, vel fiant ex aquâ aluminosâ. Post lotionem impleatur ulcus pulvere aluminis saccharini, avis nstri, vel chalcanti rubri, vel applicent unguentum deterisivum, quod concinnatur ex farinâ hordei, melle, succo apii, & pulvere aluminis rochea, vel demùm, si putredo adsit, ad unguentum ægyptiacum, vel apostolorum confugiunt.

Quibus nihil proficientibus, ad incisionem, vel ignem actualem deveniunt, priusquam sordidi, ac putres humores majora accersant mala. Ulcus abstersum vino calido rubro corroborant, in quo coquunt *myrrham*, *thus*, *aloën*, & similia sarcotica, vel spongiam vino calido madidam applicant.

Ulcus sordidi curatio in eo consistit, ut succi attenuentur, fluidiores, ac spirituosiores reddantur, particulæ acidæ, vel acido-salæ obtundantur, immuentur, diluantur; ad finem obtinendum, interne conducit pulvis *antimonii diaphoretici*, *oculi cancrorum*, & *chalybis*, quia satis potense est in absorbendis acidi spiculis. Sudorifica, & diaphoretica pluries recensita negligenda non sunt, & etiam ad decoctorum usum, vel ad decoctiones vulneraria confugere possumus, eo quia maximam acidum immutandi vim habent. Verùm si occasiones in primis viis stagnent, productorum evacuatione leniter tolli debent.

Inter topica ad abstergendam crassam formem, & corrupta fragmenta removenda, ea sunt administranda medicamenta, quæ propriæ substantiæ tenuitate, quæ prædita sunt, in fordē illam facili penetrant, attenuant dissipatum, crassumque excrementum quantumvis viscidum immutant, abstergunt, & sequestrant; calidè itaque usurpamus lotiones ex aqua lapidis medicamentosi, vel aqua calcis, *sapherinâ*, vel *aluminosâ salisop*. Prodest *emplastrum de gratiâ Dei*, vel sequentem efficaciorē compositionem adhibemus, ut

℞. Aqua Regine Hung. ʒ. ij.
incellura myrrh.
aloes ana ʒ. j.
salis armoniaci ʒ. jss.
camphora ʒ. ss. m.

quam quater de die calidè applica cum filamentis. Si sordidum in putridum jam ulcus degenerarit, supra dictâ compositione ablendum est, vel unguentum *egyptiacum magistrale* applicari potest, sed præstat unguentum nostrum compositum, vel magistrale. Cæterum ulceris putrilaginem maximè immutat, abstergit, & à parte sanâ separat *manamercuriis*, *magnum calcinatum Paracelsi*, *mercurius præcipitatus tam per se*, quàm unguento admixtus, vel *mercurius dulcis*.

Si efficaciora applicare velis, putridum ulcus tange aqua persicaria spiritu mercurii albi imprægnatâ, filamenta superponendo, & ad mirabilis effectum. Tandem mundificato ulcere, sarcoticis utere ad cicatricem usque.

CAP. XVII.

De Ulcere Verminoso.

Quemadmodum in omnibus humani corporis partibus integris vermes generantur: ita in iisdem ulceratis multoties vermes inveniuntur, præcipuè si imprudenter tractentur medicamentis unctuosius, vel negligantur; tunc enim fordescunt, putrescunt, & verminans ulcera, nisi rectè à pure, & sanie mudentur, & detergantur.

Signa.

Si ulcus sit superficiale, vel patens, vermes faciliè visui patent; si verò sit profundum, vel angustum habeat orificium, & vermes videri non possint, ex albis signis cognoscuntur, morfu, puncturis, doloris, & motus sensu. Plerumque & fœtor quidem in talibus ulceribus percipitur.

Causæ.

Ut horum animæculorum genuinam inquiramus causam, methodo procedamus oportet, ac proinde præmittimus, quòd animalium propagatio duplex est, una, quæ dicitur ovipera, quatenus scilicet animalia ova pariunt, ex quibus ab ipsis exclusis, animalia vivencia sunt; altera vipera, quatenus animalia in se concipiunt, & viva pariunt. Ad utramque propagationem solius patris requiritur semen, à quo fit conceptus, & in quo anima est formationis viventis animalis principalis causa. Ova habere futuri animalis animam patet ex eo, quod quamprimum à debito caloris gradu foras, in iis anima exerit, & animal simile ei, à quo ova fuerunt exclusa, format. Neque generans hujus formationis causa esse potest, cum id sæpè, cum ova excluduntur, mortuum sit, neque etiam ulla alia causa univoca, vel cogitationis inveniri potest. Notandum

est ex ovis gallinarum pullos ab anatibus, & econtrà, excludi. Imò Cauri calore fornacis pullos excludi. & in multis nostris pagis simi equini calore: in quibus modis nullum agens univocum dari potest, nisi spiritus, sive anima latens in ovo.

Animalium ova media sunt inter semina plantarum, & animalium, quia cum utrisque in quibusdam conveniunt, & in quibusdam differunt: seminibus plantarum in hoc respondent, quòd & animam, & materiam corporis formandam continent; præterea verò semen cortice, & membranis tegitur, in eo verò est differentia, quòd plantarum semina, cum terræ committuntur, ex eâ materiam corpori formando necessariam hauriunt, atque ex seminis materiâ primæ radiculae, & germina formantur, reliqua materia ex terrâ attrahitur. In ovis cum anima corticibus suis, & membranis ita vallata, & conclusa sit, ut extrà nihil attrahere possit, interim in ovo fœtus penè perfectus formetur: ova non solum animam, & materiam primis fœtus rudimentis formandis aptam, sed habent paratam universam illam materiam, quæ satis est, donec fœtus absolute formatus excludatur, & præter albumen complectatur etiam luteum, quo potissimum pullus jam exclusus, cum lacte quodam alatur, cum eidem primis statim diebus non sufficiat alimentum ore ingestum, Cum animalium

malium seminibus in eo conveniunt, quod semen primò omnino in testibus, & parte testibus analogâ perficitur [ut dicunt], & semen statim à mare in sœminæ uterum conjicitur, id quod non fit in plantis, quarum semina extra terram, earum nutriticæ, multis externis injuriis exposita sunt. Vivipera ab oviperis in eo differunt, quia vivipera non continent omnem materiam ad partum usque necessariam, ut ovipera; hanc enim dies in singulos è vasis maternis mutantur, nec præter lentorem albugineum alteram habent substantiam ovorum vitellis similem, quæ puerperio in alimentum cedere debeat. Quamobrem rectè noravit *Harvejus* non ea modò animalia, quæ dicuntur ovipera, verùm vivipera quoque & ipsum genus humanum ex ovo progigni, ne putemus hanc fuisse propriam, peculiaremque Tyndaridum sortem. Verùm nos ab *Aristotele* moniti sæpissimè observavimus in utero viviparorum certo quodam post concubitum tempore fieri conceptum oviformem, seu massulam instar ovi membranulâ occulti, cui detractum sit putamen. In eo differunt ovipera à viviperis, quod semen oviparorum non ut viviparorum in utero sœminæ, sed extrâ perficitur, & propterea semen non liquidum, ut viviparorum semen permanere, sed externo adminiculo, & receptaculo regi debuit. In eo tandem plantarum, & viviparorum semina conveniunt, quod

sicut plantarum semen terræ committitur, ibique nutritur, ità humanum semen in mulieris uterum conjicitur, ibique nutritur ad destinatum tempus usque, & sicut terra non est causa efficiens pro plantæ propagatione, sed tantùm uterus, ità & mulier non est causa efficiens respectu humanæ propagationis. Hinc mulier saccus vulgo appellatur, undè natis nunquàm matris cognomen, sed tantùm patris imponitur.

Nec pater est causa efficiens immediata respectu filii, sed tantùm mediata, & occasionalis, nam licet pater generans respectu filii sit causa externa, tamen non est respectu generati immediata, quia scilicet non immediatè ex eo generatur filius, sed ex semine procedente immediatè ex patre, respectu cujus pater est immediata causa efficiens interna, cum ex ejus sensitivo spiritu viventi per concupiscentiam agitato sibi similis prodeat sigillaris veluti idea, quæ in intimâ seminis parte clausa est. Atque adeò pater est causa efficiens immediata respectu seminis, & mediata, atque merè occasionalis respectu generati, seminis autem spiritus vicem efficientis immediatæ respectu filii gerit, & est respectu illius causa efficiens interna. Sic gallina non est causa efficiens respectu pulli, nec gallinam compressit, sed tantùm spiritus in ovo sæcundo gliscens, qui ex ovo subventaneus non excluditur pullus.

Verùm, ne nostrum præmittendum in longum protrahatur, ex professo de oviparorum, & viviparorum

rorum propagatione suo loco agemus, desumptâ occasione ab hominis generatione; tantum hic agimus de sponte nascentibus, ut vulgò creditur, quorum generatio non univoca, sed æquivoca à vulgaribus philosophis putatur, talis est insectorum, ut ex equino stercore scarabæi, è frumento curculio, è fabis midas, colossus è lignis, è cutis, & vestium sordibus pediculi, & pulices, è caseo, & carne aliisque rebus putrescentibus vermes, & insecta, vulgò dicta varii generis, oriuntur. De horum generatione nihil aliud sciebant præci, nisi quantum voces important: *Nascuntur ex putri.*

Quibus spontaneus hic ortus competat non eadem fuit omnium mēs. Putarunt præci omnia insecta, biuta, ipsumque aded hominem è terræ initio provenisse. Id *Plato*, aliique philosophi Platone longè vetustiores docuerunt, quos potètz secuti sunt. Verum hæc opinio ex Genesi originem habuit, & veritatem in has converterunt fabellas; cum constet Deum iussisse, ut terra animam in genere suo producat, jumenta, & reptilia, & bestias terræ secundum species suas, & Deum fecisse hominem de limo terræ; ipsi verò Creatorem ignorantes: spontaneum istum ortum inde commenti sunt.

De talium viventium causâ efficienti valdè digladiantur philosophi.

Cardanus casu, & fortunâ generari contendit. Cæterum fallitate convincitur, quia casus, & fortuna naturalibus locum non habent,

& quæcumque casu fiunt, & fortuitò, ea non semper ex iisdem principiis, & eodem modo generantur: atqui sponte nascuntur vivientia, semper ex iisdem principiis, & eodem modo generantur, & habent certas causas efficientes, quæ etiam certi finis gratiâ agunt, certosque producunt effectus. Sic ex stercore equino scarabæi nascuntur, & non erucæ, à caseo sui generis vermes, aliè carnibus, & in genere semper determinata ex determinatis. Et licet variis in locis, in terrâ, in aquis, cadaveribus, & alibi generari videantur: tamen ex efficienti causâ, quæ pluribus in locis sæpè reperiri potest, nascuntur.

Alii etiam casu, & fortuitò generari negant, nullam tamen causam habere efficientem proximam, sed solum communem, & remotam opinantur, & hoc disctimen ponunt inter vivientia per se, & sponte orta, quòd illa præter agens universale, putà Cælum, & particulare expectant sol, & homo generans hominem; sponte verò genita, causâ proximâ eum careant, absque agentis particulari producuntur. Ut ipsa appellatio id indicare videtur. Verum horum sententia falsa deprehenditur, nam inter causam, & effectum debet intercedere proportio, & effectuum universalium universales, particularium particulares debent esse causæ. Præterea causæ communes, & remotæ omnes sunt externæ, & manifestæ: at sponte nascentia à causâ internâ, & latente in materiâ probabimus.

De causâ istâ remota à in varias dividuntur opiniones philosophi.

Alii.

Aliqui prædictarum difficultatum scopulos considerantes, eosque vitare capientes, tanquam ad sacrum ignorantis azilum, confugiunt ad cælum, solem astra &c in illo existentia atque ipsis culpam generationis vermium tribuunt *alberius magnus* cœleste lumen causam proximam sponte nascentium esse dixit. *S. Thomas Aquinas* sponte nacentia à cœli motu mendicat, *Fernelius occultas* influētias infamat neque hos pudet talis inepti commentis: sed cælum sol, astra cœleste lumen, cœli motus &c generalis tantummodo causa esse possunt præparans causam, non vero particularis, & determinata ad hos producendos, & non alios vermiculos in hoc, & non alio ulcere, vel loco. Præterea lumen, calor, motus, & occultæ influentiæ accidentia sunt, at nulla substantia, quales sunt animæ sponte natorum, potest ab accidentibus produci. Insuper cælum, sol, astra &c. sunt corpora inanimata, nec animata producere possunt, quia producerent nobiliora seipsis.

Alii animam mundi causam efficientem sponte natorum viventium esse existimant: sed si mundus animam haberet, esset maximum animal mundus, & esset causa universalis, & non propria, & proxima, & sicut ab eâ sponte nascentia provenirent, ita non sponte nascentia, nec ab unâ animâ tot diversæ species sponte nascentium provenire possent.

Scotus, & alii animas viventium sponte generatorum à Deo proxime provenire statuunt, sed hi inepti.

D. Caroli Musitani Tom. II,

tiores sunt, quia invenire nequeunt genuinam talium animalculorum effectricem causam, nec humanæ cognitionis imbecillitatem fateri volunt: opinantur Deum ipsum esse vermium causam, quod verissimum quidem est, si loquamur de causa universali, & remotâ. Difficultas tamen consistit in propriâ, speculâri, & proxima vermium causa, cui scilicet concessa fuit, dataque facultas à Deo, ut vermes generare possit. Neque enim vermes adeo nobiles, & perfecti judicari debent, ut à nobilissimâ, & perfectissima causa originem ducere debeant: Vix imò, ne vix quidem quiscquam ausit illorum generationem, formationemque huic divinæ formatrici virtuti adscribere, haud intelligens, quoniam pacto tam præstans, & tam nobile agens ad vilia hæc opera sine suæ majestatis læsione descendere queat; alia verò omnia ita ignobiliora, atque imperfecta, ut à vilissimis seminibus progigni tantum valeant: neque in universo condendo oblitus est consulere causis propriis vermium, cæterisque imperfectis, quemadmodum consulit aliis animantibus speciales habentibus causas. Neque tandem sunt minds naturales, quam cætera animalia causas naturales habentia. Denique ad adagium, quod à vulgaribus philosophis adduci solet quod *Deus nature author agere se solus tenetur id, quod causa naturales præstare non possunt*. Respondetur verissimum quidem hoc esse in supernaturalibus, non verò in instituto ordi-

K ne

ne naturæ, & in hoc non facile est inditur contractus cum testibus quo obligatum contendunt adversarii, quamvis enim in hac aut simili materia ab istis demonstrari non potest causa naturalis; ac proxima, non sequitur tamen ipsam nullam esse Deumque se solum vermes, & huiusmodi insecta producere: ergo ranas, muscas scarabeos, lumbricos syrones &c esse divinas creaturas sequeretur, quod ne dum absurdum verum impium putamus. Hinc magna temeritas est presumere nos nosse quidquid causatum est naturaliter & nullum fugere, quod supra ipsam naturam sit, nec verò alia possit quam ipse deus. Præterea omnium viventium generatio est naturalis, & causa naturalis inquirenda est, nec ad deum statim recurrendum est, nam *Tempus est philosopho ad Deum recurrere ubi potest causa secunda assignari*, quia postquam naturam instituit, iam immediate amplius nihil creare videtur præter animam intellectivam, & eum plantarum, ac brutorum sponte nascentium origo sit à suis parentibus, mediante semine, non à Deo nisi ut causam remotam, & universalem: eritne Deus causa proxima imperfectorum, & ignobilium animalium?

Omnes ferè nostræ tempestatis gregarii philosophi putredinem solam proximam spontaneæ generationis causam statuunt, quibus sufficit uneverfalibus quibusdam verbis quæstiones potius implicare quam solvere: dicunt gigni hæc animalia nam in corpore quàm extra illud ex

putredine seu calore putredinali agente in quasdam particulas materiz putrescentis, sed hujus opinionis falsitatem ostendunt primò vermes in aceto, & nive geniti; hæc enim juxta vulgarium sententiam putredinem in misto iahibent, & in his frigiditas potius quàm caliditas excedit. Deindè præclara experimenta *Francisci Rhedi* in libro de insectis descripta ostendunt, quòd carnes & quodcumque aliud facilè putrescibile inclusa in vase optimè cooperto, putrescunt, vermes tamen nunquàm exhibent: tacemus, quòd calor ille produceret corpus animatum, & consequenter se robilibus. Prætermittimus, quòd intelligi minimè potest, quomodo calor admirabilem nervium organizationem, tot vermium species, animam, sensum, & motum producere potest: non negamus tamen necessarium esse nonnunquàm calorem ad excitandum motum in interno spiritu in semioibus, sive ovulis vermium latente, sicut calor galinæ, fimi, vel fornacis Ægyptiæ, à quo sovetur spiritus in semine galli existens in ovo facundo non est causa principalis generationis pulli &c.

Præterea tota putredinis ratio in eo consistit, quod sit misti corruptio, quatenus mistum: si verò quid præterea ex putredine oritur, id ex accidenti evenit. Insper plantas multas, & alia sponte nasci sine omni putredine expe-

experientia testatur : igitur sponte viventia non geneanturex putri materiâ , licet interdum nascantur in putri. & ex parte rei putrescentis.

His breviter explosis , alia causa de sponte nascentibus inquirenda est. Quæ non sponte nascuntur sunt illa , quæ semina habent manifesta , quæ verò sponte, eorum semina sunt occultissima, & omnem latent sensum ; idè quo sponte nasci infecta veteres, & cum his vulgares philosophi existimârunt , quia eorum semina non semper animant, & suo tempore exerunt.

Generantur sponte viventia, cum semen , in quo est anima , occulto modo alicubi latens idoneam materiam nactum , & calore ambientis sese exerit , & vitales operationes exercere incipit. Hæc animalia ortum trahunt ex ovulis , quæ cum ab inconspicuis præ exiguitate initiis, & seminibus , quasi atomis in aëre volitantibus , & à ventis hinc illinc delatis, dissiminati que oriantur , sive ex putredine , seu non genitis orta esse existimantur , quia nostrorum sensuum efficaciam ludunt. Cæterum certum est animalia infecta ex somine paterno generari , & carniū , herbarum , aliarum rerum vel planè putrefactarum , vel putrescentium insectorum generatione non alias esse partes ; nec aliud officium , quàm vas , & locum mittere commodum præbeant , in quo

infecta statim ac orta sunt , in hoc nido alimentum sufficiens, & nutritioni commodissimum inveniunt , & nisi à parentibus supradictum semen hinc delatum sit, nullum ibi vermem unquam generari posse dicimur.

Sponte ortorum semina , estò in terram conjiciantur , non semper suam insistant exerunt vim, sed interdum frigore , interdum calore, vel etiam idonei alimenti defeccerit corrumpuntur , interdum diu quiescunt , antequàm , sese exerant ; sicut semina multa totà hyeme in terrâ quiescunt, donec nimirum aëris ambientis calore foveantur , & idoneum è terrâ alimentum atrahant : ita & in iis , quæ sponte provenire dicuntur , vis seminalis quiescit, donec idoneam , ex qua corpus sibi fabricet , materiam nanciscatur ; & à calore ambiente excitetur , & foveatur : undè accidit , ut animalia , quæ sponte nascuntur , non tempore hyberno, nisi sub fimo interdum , quò frigus non penetrat, sed vere, æstate, & autumno generantur , ubi scilicet à calore ambientis , quem sol extirrat , materia idonea , ex qua anima latens corpus sibi fabricare possit , suppedietur , & ipsa anima ad agendum excitatur.

Et si in putrescente materiâ hujusmodi animalcula sunt, tamen non ex ea, quatenus patris est, generantur, sed potius à meliori ejus parte, quæ à patri secernitur. Unde etiâ post nervi,

cinantur vulgares philosophi nam hæ ranulæ suis ortæ seminibus præ-
existerant abditæ inter herbas, vepres, sepes, terræ foveas, lapidumque
rimas, deinde guttarum aquæ in
terram decidentium timore quasi
panico pervulsæ profluunt, & statim
se abdunt, ac quia antea non conspi-
ciebantur, tunc temporis vi aquæ, &
solis calore ex terræ pulvere dispo-
sito, sponte, & sine parente natas fuisse
ineptè imaginantur. Et nos præ-
dictas ranulas manu apprehensas
dissecuimus, & in stomacho herbas
crudas, muscas, & scarabæ os terræ
immistos, non digestos, quos devo-
rârunt, invenimus. In agris post plu-
vias innumeræ limacum copiæ, quæ
antea non conspiciebantur, appa-
rent. Numquid tunc sponte nate?
Sic etiam post imbres magnam Lum-
bricorum catervam, & aggeriem
conspicimus. Dici numquid potest,
tunc sponte exortî?

Horum insectorum occasione a-
gendum putamus de lumbricis, &
syronibus, qui in humano corpore
generantur. Hæc animalcula sponte,
& sine semine nasci vulgatum phi-
losophorum schola etiam conten-
dit, sed nunc talis opinio à recentio-
rum aulâ recessit, apud quos econtrâ
illa invaluit sententia, quod quic-
quid in hoc orbe sentire, imò vivere
videmus, ex ovo emerit, & ipsa in-
secta, imò plantas, & ipsum humanû
genus ex ovo ad unum univocæ ge-
nerationis principium reducimus,
ut ante nos *Harvæus*, & eruditissimus
Franciscus Rhedi, Esculapius nostri
temporis validissimis rationibus, &
experimentis demonstravit, quam
doctrinam universus orbis litera-

rius amplexus est, ut aded apud eru-
ditos inclauit, ut in hac stabiliendâ
non immoramur.

Igitur quod ad lumbricorum, &
syronum ortum sciendum est ex
quotidianâ experientiâ muscas, alia-
que animalcula ovulis suis epulas
nostras, æquæ ac potus conspurcare,
eaque brevissimo spatio, per æratem
præcipuè, in carnibus excludi, sed
cum nobis etiam mensæ accumben-
tibus, vel paulò antè, muscæ cibarîis
circumvolitent, vel ea inque ovula
eruant, qualis est panis, vel potus,
ipsis ita propè excludendis non ob-
stetricent, illa integra ore excipi-
mus; & cum ob exilem molis suæ, &
teneritudinem, dentium attritionem
declinent, intacta deglutimus, & ob
exilitatem à ventriculî fermêto non
digeruntur. Ea propter cum cibo-
rum reliquiis in eo conerctis in duo-
denum descendunt, in quo uti in
reliquo intestinorum canali exclusa
in varias lumbricorum species com-
mutantur; minutiora verò aliqualia
ovula supersunt, quæ ob exilitatem,
vel immaturitatem tam in stom-
acho, quàm in intestinis cum spiri-
tuosâ ciborum substantiâ abripiun-
tur, & se insinuant, partim cum lym-
phâ permiscuntur, & circulant, par-
tim cum sanguine circulationis le-
ge, partim in universas corporis par-
tes devehuntur. Habitus autem cor-
poris passim poris est pervius, ij verò
quibusdam in locis patentioribus, &
in aliis actioribus: undè fit, ut ex
ovulis illis syrones exclusi per poros
unâ cum sudore, vel habitib. per eos
extruduntur, vel quandòque ob po-
rorum angustiam sub cuticulâ ser-
punt ab uno loco in alium, & calpa-

Vel succum expriment , & talia parant medicamenta, ut

℞. Aloës 3.j.

myrrh. 3.j.

pass. Brasiliani 3.ij.℔.

fellis tauri 3.℔.

flor. aris 3.j.

mell. q.ſ.

f. linimentum.

Pro verminosis ulceribus curandis nos feliciter adhibemus *unguentum nostrum magistrale* in lue venerea descriptum, quod summum est medicamen. Vel enecari possunt vermes applicatione *elixiris proprietatis* per infusionem, & digestionem parati. Prodest *oleum buxi*, vel *feminum colocynthidos*, sed optimum, estò vile, remedium erit *olei amurca*, nam vermium perspirationem impedit, eoque idè necat. Magnoperè aliqui commendant *spiritum vini theiacalem*, vel ipsam *iberiacam* in *emplastri formâ*, sed expertissimum remedium ad vermes interficiendos, muscarum ovula dissolvenda, & ad sordes tollendas, ubi vermes nidulantur, erit *mercurius* quomodolibet præparatus, ut *unguentum mercuriale*, *mercurius præcipitatus*, *mercurius dulcis*, vel *magnum calcinatum* *Paracelsi* tam solitarie, quàm cum aliis medicamentis, sed omnium maximè præstat, si ulcus verminosum *cinnabar. suffumigetur*; nam mercurius tam crudus, quàm quomodolibet præparatus vermiculos, pediculos, & ejusmodi insecta cujuseumque magnitudinis, vel figuræ sint, statim enecat, aut fugat. *Pesi Succi*, imò ejus *folia sicca* in pul-

verem redacta, vulgò *sabacum Brasilense*, ulcera tam à verminibus, quàm ab aliis insectis eripit, eaque mundificat. Si ulcus verminosum *aquâ stillantiâ* è capis ablatur calidè, ad miraculum usque vermes enecat. Idem effluit *succus radicis vitis alba*. Si vermes à partibus internis in ulcus repant, convenit *Calomalanos Turqueti cum ibericâ internè assumi*.

CAP. XVIII.

De Ulcere cum labiis callosis.

Solent quandòque ulceris labia ità callo obduci ut ejus Sanatio tamdiù medicamentis relinqueretur, donec callus totaliter ablatus fuerit.

Signa.

Ulceris labia callosa ipso aspectu, & tactui innotescunt, decolorata namque sunt, dura, & non dolorifica, & si perfectè obducta sunt callo, novacula, vel cultro scinduntur absque doloris sensu, & ferè tactus sensus in hisce partibus abolitus est.

Causa.

Causa labiorum callosorum in ulcere apud Galenistas est pus, quod ulceris labiis ob suam crassitiem adhæret, cujus partes tenuiores à calore nativo, vel extraneo resoluuntur,

vantur, & exsiccantur; crassæ verò obdureſcunt, & fit tandè callus madore privatus, & indolens.

Labia calloſa, quæ ſcirthoſum reſerunt tumorem, originem ducunt ab acido, vel auſterius ſuccis in partem ulceratam influentibus, in eiſdem ulceris labiis congeſtis, qui adèd sæpè conſtipantur, & condenſantur, ut obcaleſcunt. Interdum eundem producunt effectum ſiccantia nimis calida, vel ambientis aëris frigidity, ac nitroſitas, vel obſtrectio à glutinoſa materiâ, vel excrementa imprudenter diu in parte ulceratâ dereliſta, & in ejus ſubſtantiâ exſiccata, vel deligata, aut quæcumque alia cauſa comprimere valens, aut obſtruere carnales, per quos alimentum illis ſuppeditatur; factâ namque ſtagnatione, & inde obſtrectione, omne ſal volatile evaneſcit in auras, & labia calloſa redduntur.

Prognofis.

Ulcus calloſa habens labia non facile curatur, niſi priùs calloſitas auferatur, attamen in principio, quando non dùm perfectus eſt callus, non ægrè tollitur. Cæterùm ſi perfectus erit, & abſque doloris ſenſu, difficiliùs curatur. Si livida ſint labia ob porofitates ſanguine coagulato reſertas, magna ſedulitas id calli remotione adhibenda eſt.

Curatio.

Calloſitatem in ulceris labiis curant vulgares emollientibus, ut mucilaginibus ſeminum malvarum, althææ, vini, ſeminiſci; oleo amygdalarum

dulcium, liliorum, alborum, emplaſtro de mucilaginibus, atque ejusmodi emollientibus, & diſſolventibus, ſed per omnibus ſequens commendant cataplaſma, ut

℞ Mucilag. ſem. alib. aquâ malv. extrah. ʒ iij.

pingued. anatiſ,

anſeris,

gallina ana ʒ. j.

farina ſem. lini. ʒ. j.

mica panis triticeæ ʒ. ij.

coque in ſufficienti quantitate lactis ad cataplaſmaticis, conſiſtentiam, ita tamen, ut ultimo pinguedines

Vel tale utuntur unguento:

℞. Mucilag. ſem. ſem. graci.

lini ana ʒ. ij.

cerebintib. ʒ. j.

ol. amygd. d.

lilior. alb. ana ʒ. iij.

m. ſ. ung.

Vel embrocationes inſtituunt ex decocto carnis arietinæ, quæ inſigniter emolliunt.

Si callus completus, & perfectus fuerit, & emollientia contemnunt, vel color niger ulceris labia obſidet, cultro à parte ſanâ eum ſeparant, vel ſcarificant, vel cauterizant ad eſcharæ decidendam, vel corroſivis fortibus tollunt.

Ulcus calloſa habens labia internè, & externè curamus; Internè decocta ſudorifica, in quibus torius curationis cardo conſiſtit, adminiſtranda ſunt: hæc namque acidos, auſteros, & vitriolicos obrundunt ſuccos, diluunt, & per ſua emundatoria eliminant, inſuper congeſtos ſuccos deſtruunt, obſtrectos referant canales. Diæta ſtriſta, & etiam ſudorifera imperanda eſt; Cæterùm, ab acidis, & ſali,

& ſalis proſus abſtinendum eſt, & præcipuè à repellentibus omninò remediis cavendum eſt, quæ omnia ſuccos coagulant, inſpiſſant, & ad circulationem reddunt ineptos.

Externè calloſis labiis, quæ duri-
ritiem, & calloſitatem perfectam
non adepta fuere, convenit *aqua*
viridis, oleum viridis æris, aqua ſalis
armoniaci n. d. Si verò callus his
obluatur medicamentis, efficaciora
conſugimus, huiusmodi ſunt *lapis*
infernalis, vel ſpiritus ſalis armoniaci,
vel tandem ſpiritus Mercurii albus,
qui abſque recidivæ metu omnem
abſumunt calloſitatem.

CAP. XIX.

De Ulcere Sinuoſo.

Quandoque ulcus anguſto præ-
litum eſt oriſicio, ſed cavita-
tem tatis amplam, profundam, &
latentem continet, abſque tamen
calloſitare, & duritie, ac pro oriſi-
cii magnitudine copioſum pus, vel
ſaniem eruct. Huiusmodi ulcus
non ſolùm ſinuofum, verùm etiam
cavernofum, cuniculoſum, & re-
conditum appellamus. Quidam et-
iam talpiarium dicunt & quidè
reſt, nàm talpæ more ſub carne
ſerpit cuniculos & cavernas, non ſe-
cūs ac talpa ſub terrâ, agit. Diſfert
ulcus ſinuofum à ſiſtuloſo, quia hoc
calloſum eſt, illud verò calloſitatem
internam non habet. Sinuoſorum
ulcerum differentie ſumi poſſunt,
Primò, à cavernarum magnitudine,
quia ſinus vel ſunt breves, vel lon-
giores, profundi, altèque penetran-

tes vel ad carnes, vel ad oſſa, vel ad
cartilaginem, vel ad nervoſas partes.
Secundò, à figurâ, quia vel ſunt re-
cti, vel flexuoſi, vel obliqui. Tertiò,
à ſitu, quia vel ſurſum, vel deor-
ſum, vel ad latera tendunt. Quartò,
à numero, quia unicuſ eſt ſinus, ſivè
ſimplex, vel duplex, vel triplex.
Quintò à majori, vel minori acrimo-
niâ materiæ purulentæ in ſinu con-
tentæ. Et tandem vel oriſicium in
parte ſuperâ, vel inferâ, vel circa
partes laterales habent.

Signa.

Sinum in ulcere latitare cognoſci-
mus, cū ex eo, quod oriſicium,
cujus conſolidatio inducta fuit, bre-
vi poſt tempore aperiatur & mate-
riæ ichoroſæ ab illo prodeant; tū
ex eo, quod turunda, quæ ſtatim in
anguſtius oriſicium introducta fuit,
deindè in amplam cavitatem im-
pellitur. Quòſque ſinus tendat,
ſpecillo, vel cereâ candellâ intra ſi-
num immiſſâ facile deprehenditur
magnitudo, figura, ſitus, numerus,
ſinis &c. nūm ad partem, ſuperam,
vel inferam, vel ad laterales ten-
dat, nūm ad nervos, vel carnes. &c.
Si ad nervos dolor, & motus paſmo-
dicus percipitur, materia eſt tenuis,
ac unctuoſa. Si ad os, durities, & af-
predo tangitur & materia erit nigra,
vel ſaltim livida, tenuis, & foetens.

Cauſa.

Galenistarum cauſa pro ulcere ſi-
nuoſo eſt pus diù in ulcere retentum,
ac deliteſcens, quod virulentam
quandam æquirit materiam, &

corrodendo cuniculos agit, partes exedit subjectas, putrefacit, & contaminat ac majus sibi spatium comparat.

Sinus Secundum nostram sententiam oritur à pure diutius in ulcere retento; retinetur autem plus justo ulceris excrementum, si illud non benè munderur, vel si debite non ligetur, ità ut productum excrementum ab ejus orificio effluere non possit, vel si post diutinam supurationem vomica aperiatur. Pus ex falsis, acidis, sulphureisque componitur particulis, quæ in ipso ulcere exaltantur, vel è proximis vasibus, vel à toto ut dicunt vulgares Galenistæ per congestionem paulatinam, vel per fluxionem, in ulcus effusæ (presertim si corpus cacochymum, lue venereâ conspurcatum, hypochondriacum, vel scorbuticum sit), subtili materiâ adventante ad partes ulceri circumpositas, & laxiores intestino motu perpetuò peluntur, deinde in ulcus, ibique exaltantur, & per fibrarum interstitia, si ibi diutius retineantur, ac per varios anfractus viam sibi aperiunt, fibras devastant, tubulos obvios, minusque resistentes exedunt, dictarum partium canaliculos erodunt, scrobem excavant, cavitatem efformant, & cuniculum agunt, qui hinc, atque illic sinum efficiunt, qui quò latior, & profundior est eò diuturniorem pus in parte remoram contrahit, quod non debite evacuari potest.

Prognosis.

Ulceris sinus parvus & in parte carnosa exortus, & qui in corpore

non valdè cachochymo existit, minus periculosus censetur; qui pus probè coctum fundit, ut album, læve æquale, minimèque foetidum, coctionem, sanitatem ac morbi breviteratè polliceur, præcipuè si dolor & tumor dispareant: Secus verò qui magnus, & nervosas partes, vel artus occupat, vel ad aliquem ventrem penetrat, malum. Pus ex sinu profluens valdè tenue, malè coloratum, viride, virulentum, nigrum, aut putridum nihil boni portendit, & præcipuè si dolores, febres, aliaque symptomata movet, valdè periculosum est. Quibus cachexia, vel virium jestura adnexa est, ut plurimum lethale. Oculissimè curandus est sinus, alioquin contumax redditur, callum contrahit, durus efficitur, & in fistulam degenerat.

Curatio.

Instituitis, præmissisque universalibus presidis, sinus curationem exordiantur Galeni sectatores, deinde, si orificium sit magnum, & in parte declivi, ut sanies per se effluere possit, apertum servant, post modum derersionem peragunt, sinum abluendo mulsâ, vel vino cum aquâ marinâ misto, aut cui sal adjectus fuerit, vel terabininâ, & farinâ hordei cum melle, aut squamâ aris cum vino, & melle. Sinum his mundatum carne implent, & cicatrizant, prospiciendo simul, ne caro nimis multa generetur, quod fasciis expulvisis peragunt, oti imponunt turundas cannulatas, quas inspergunt aliquo medicamento abstergendi &

exsiccandi vim habente & de super
emplastrum Barbarum in medio per-
foratum ad effundendam sanie[m]
extendunt.

Si verò sinûs orificium fuerit an-
gustum, & pus intûs latens perfecte
non educi, neque mundificari, ne-
que medicamenta applicari possint,
extemplo versus illam partem, ubi
major urget necessitas, secant; sic
enim puri viam præbent, & non
ægrè ad motis medicaminibus, ab-
sterfio, exsiccatio, & carnis regene-
ratio subsequitur.

Si sinûs os sit in parte superiâ, vel
ad laterales vergat partes, ita ut pus
perfectè expurgari non possit; tunc
ut educatur, optimâ opus est collo-
catione, & ligaturâ, ut sanie[m] edu-
cant, efficere possunt: verum si per
collocationem, & ligaturam educi
nequeat, ad turundas cannulatas
confugiunt, cæterum si pars haud
situari, neque per collocationem,
haud turundas cannulatas, aut li-
gaturam materiam purulentam
educere possunt, tunc, si sectio peri-
culum involuat, immisso specillo,
quâ pervenit, fundum scalpello ape-
rire magis expedire inquit *Gal. 3.
Meth. C. 4.* ut humor superstes eli-
minetur, & os superum ocludunt.

Verum perperam in ulcere sinum
secant nostri vulgares, dicant secti
superstites, claudi attracti, mellori-
bus vitæ functionibus destituti, qui
deplorabilem, inopemque trahunt
vitam. Siquidem non potest medi-
cus morbo opportunum adferre
præsidium, nisi & affectum ipsum
& locum patientem agnoscat, ita-
que hæc est omnium in curationi-
bus errorum radix: Eapropter pro-

fessionem conspurcant medicam no-
strates phisici, & Chirurghi, ac nihil
scire judicamus, quia maximo me-
dicinæ lumine carent, anatome scilicet
sine qua in tenebris ambulant,
& æger in umbrâ mortis: firmiter
asseveramus medicam artem sine
anatomicâ vix solidis fundamentis
inniti, & hanc sine illâ inutilem esse,
undè perpetuè medici titubant, &
in mille ostendicula cum multorum
exitio impingunt. Si cadaverum
anatomiam, sed tantùm ossa & his
finitima effert, ex qua nulla morbi
inspectio colligi potest: quanto ma-
gis de morborum anatomia bardè,
& inconditè differunt?

In ulcere sinuoso studendum, ut
superfluitates liberum habeant exi-
tum, & eapropter si cavitas deor-
sum, vel ad latera tendat, membrum
attollendum, & in tali collocandum
situ, ut pus à sinûs orificio stillare
possit. Debet insuper deligatio expul-
siva institui, fascias circum li-
gando, primò arctè infernæ sinûs
parti, & sensim deinde laxiùs, quò
propriùs ad orificium accedunt, ejus
orificio suppositis etiam petiis,
spleniis, & puluillis atque turun-
dis, sive pannis duplicatis, & multi-
plicatis, ut æqualiter pars affecta à
fasciis comprimatur, & in cavitate
nulla sanies subsistere queat. Sectio-
nem improbamus, tum ob anato-
miz imperitiam, tum quia ex eâ
crudum emergit vulnus, & ferrum,
quod horribile est ægris, oculos non
habet, ac proinde quod illi obijcitur,
scindit. Præterea sanguinis inflam-
mationem, erysipelas, & alia pejora
symptomata arcessere potest, ideò-
que ad deterfiones per siphonem

magis confugiendum suademus anatomie ignoros. Purgantia medicamenta tanquam maledicta in ulcererepudiamus; exaltant namque non tantum in sinu, verum etiam in toto particulas salinas, acidas, sulphureasque, quæ antea dilutæ conspicebantur, & majorem carnes depascendi energiam nanciscuntur, non enim habemus medicamenta, quæ salinas, acidas, vel sulphureas evacuant.

Curationem itaque perficimus tam internè, quàm externè remediis alkalibus, & volatilibus, quæ aciditatem, & acrimoniam domant, absorbent, deprimunt, corrigunt, hujusmodi sunt c. c. *Philosophicè pp. obur sine igne paratum, sibiini diaphoreticum, tintura viperarum, ocul. cancr.* & id genus alia pluries à nobis repetita. Item inter interna decocta vulneraria commendamus, ut.

℞. Distam. Cretici,
alchimille,

Scordij ana m. j.
vineæ pervincæ.
consolidæ regalis,
sanicula ana m. B.

Ponantur in vaso vitreo cum aqua decoct. c. c. lib. ij. B. Coque in igne cinerum, vase optimè clauso, deinde f. colatura cum leni expressione. Dosis ℥. iv vel v. in quas injice ocul. cancr. ℥. j. sumatur manè, & serò. vel

℞. c. c. crud. & limati,
rasura eboris ana ℥. ij. B.
betonica.

sampsuci,
flor. hyperici ana m. j.
radic. symphyt. mai. ℥. B.

coque in duplici vase cum suff. quantitate aqua, vel vini, si vinum bibat oger.

Cola absque expressione, & unicuique desit.

spermatis ceti ℥. j.

mumia ℥. B. m.

& exhibe. Continuari debent ad cicatrizationem usque. Vel prædictis portionibus admisceri potest gutta una, vel altera, & ulterius balsami sulphuris terebinthinati, quia non solum acidos succos sua oleositate, & sale volatili expellit, & enervat, verum etiam ulcus mundificat, & consolidationem excitat.

Externè illa commendamus medicamenta, quæ sinus acidas, acresque sordes absorbendi, abstergendi, ac afflicte partis vitalem balsamum restaurandi facultatem habent. Hæc intra sinum tepidè per siphonem injiciantur, sequens absque mordicatione detergit, & sinus ichores eluit, ut.

℞. Decoct. hord. integri lib. ij.
mell. ros. colat. ℥. iv.
m.

Fiat injectio intra sinum per siphonem rectum, atqui si crassa sanies, & multum sordida inesset, ad majorem deterfionem utimur unguento Aegyptiaco magistrali de cocto admisto, additi spiritus vini portione. Vel uri possumus aqua calcis viva, quæ magnam abstergendi vim habet ob alkalia. Vel decocto simplicium abstergentium: Coeterum præstat Aqua Regina Hungaria, vel spiritus vini simplex per siphunculum injectus; hic namque acida omnia, & acuta salia cicurat. Verum enim verò præcellit balsamus sulphuris, sed huic comparati nequit balsamus proprietatis per infusionem, & digestionem. Non desit interim emplastri op-

podetloch, vel fodicationum applicatio. Ablatij tandem curationis obstaculis, hoc est sinu mundificato, sarcotica tandem adhibenda sunt, vel per siphunculum injici potest *balsamus proprietatis*, si cavitas alijs sarcoticis in formâ solidâ obest, & ultimò cicatrizantia adhibemus.

CAP. XX.

De Ulcere fistuloso.

Cum pus ex sinuoso ulcere non prorsus eliminetur, vel ipsum ulcus negligatur, vel per exsiccantia ejus agglutinatio tentetur, callum contrahit, & tandem in fistulam degenerat: est itaque fistula ulcus illud, quod arundinis instar sinuosum est, & angustum in parte superiori habet orificium cum profundo foramine.

Signa.

Cognoscitur fistula, quia ulceris orificium, seu foraminulum plerùmque est rotundum, & angustum, substantiam habet candidam, calosam, & madore privatam, absque vel exiguo dolore. Materia, quæ è fistulâ effluit, nunc est saniosa, serosa, nunc alba, vel flava, rufa, viridis, livida, atra, aut sæci similis, modò crassa, jam tenuis, sæpè putrida, & cadaverosa, non nunquàm copiosa, quandoque pauca, interdum nihil excernitur, & sicca est. Quandoquæ fistula spumosa, vel aquosa excernit materiam, subindè virulentam, & aliquando cum sibilo ad ex-

pressionem eruat. An simplex, an in plures deducta sinus sit fistula, ex majori, vel minori effluentis materiæ copiâ conjicere possumus; si simplex tantum adsit sinus, tanta saniei copia excernitur, quanta in simplici spatio capi potest; si verò plus excernatur, quàm simplici convenit sinui, plures esse sinus conjectandum est. Brevis, aut altius penetrantem, ut & flexuosam, aut rectam ex specilli intrusione desumimus, quia, ubi recta est fistula, specillum in fundum usque liberè ingreditur; si flexuosa, vel unum, aut plures habet sinus, specilli apex ingredi nequit, quare ad explorationem ex flexili magis materiâ stylus requiritur ex plumbo, vel stamno, aut hujus loco candelam ceream substituiamus. *Gal. 1. de compos. medic. per gen. c. 7.* setâ porcinâ usus fuit. *Hip. caule, & Gnidio* cum sui temporis chirurgis, petroselinî, aut betæ radice ad fistulæ rectæ, vel obliquæ explorationem, sed tantus apparatus ad hanc explorationem necessarius non est, nam has explorationes tam perniciosas non admittimus, nec fistulæ foraminulum adeò angustum est, ut setâ porcinâ indigeat, ut Galenus refert. Num fistula ad carnem, nervum, os &c. pertingat, inquirendum est. Si in solâ hæreat carne fistula, molle est, quod ultimo stylo tangitur, pus læve, æquale, & copiosum excernitur. Si ad nervum desinat, in profunditate exploratione dolorifica est, pus tenue, virulentum, & pingue, oleo non dissimile, parcius tamen extillat, & membrum, cujus nervi est, domicilium in suis functionibus hebetatur.

Si ad os terminatur, durum quid, & renitens & æquale stylo occurrit cum nonnullo dolore, si periostium non dùm est corruptum; Si verò os cariosum sit, asperum, & inæquale tangitur, eoque magis, quò caries major, pus nigricans, graveolens, & tenue admodum effluit. Si ad venam desinat, sanies est sæculenta, & si uena est erosâ, cruenta, & crassior sanies effluit. Si ad arteriam, sanies tenuior, & saliens cum titillatione deprehenditur. Desinit quandòque fistula ad ligamenta, membranas, & non nunquam ad interna viscera.

Cause.

Putant Galenistæ eandem esse ulceris sinuosi causam, ac fistulosi, fistulam enim penes callum tantùm à sinuoso ulcere differre certum est. Callum in fistulâ fieri autumant à puris crassitie, & visciditate, quæ orificio potius, quàm toti cavitati, & fundo adhæret.

Fistularum causam ab ulcere sinuoso deducimus; si enim in ulcere sinuoso pus quod salinis, sulphureis-que particulis exaltatis scatet, non abstergetur ad moram statuat, & crassus, retrestrisque minus, jam evaporis subtilibus particulis, quibus erat refectus, comprimitur, coagularque ob acidum à fermento resultans, vel ibi exalratum, ac cliniculorum parietibus fortius adhæret, & ob succi nutritiij affluxum perennem, eatum orificia, & latera obturat, comprimit, exsiccaturque, & in scirrhosam duritiem, foraminulo ad fundum usque relicto, occallefcit.

Prognosis.

Vulgares fistulas curari non debere asseverant, quia natura eorum Deastraper eas, tanquàm per cloacam, universi corporis colluvies de turbat, quare, si hæc via impediatur, maximum vitæ impender periculum, ne insolitam, atque deerioriorem sibi viam pudent & mortem inferre a prope perpetuo patulas servandas esse dicunt, & quandòque si ex ipsis, vel alio modo occludatur, rursus aperiendas præcipiunt, quia non solum vniuersum corpus ab alijs tueretur malis, sed etiam aliorum morborum sunt medela. His, similibus falsis imaginibus mortis metum minantur. si curentur incolumitatem, si non curentur. Spondent Coeterum hac versutiâ miseris imponunt ægrotis, & quos ipsi curare nesciunt, ne alij curent, efficiunt. Eapropter fistularum curatio non barbitonsorem, vel balneatorem, non chirurgastrum, vel Galenistam requiri, sed chirurgum dextrum, peritum, & benè exercitatum.

Omnes fistulæ Generaliter curatu difficiles iudicantur, plus tamen difficultatis aliæ, aliæ minus habent, quædam aliæ planè lethales censentur. Minus curatu difficiles sunt recentes, quæ carnosas occupant partes in corpore juvenili, robusto, & faciliorem coeteris spondent curationem; difficiliorem autem minantur, quæ antiquiores, & profundiores sunt, quæ plures habent cavernulas, si languentis corpus debile, vel senile, valetudinarium sit vel praviis scatet succis, curationis difficul-

tatem auget. Periculosa judicantur, quæ ad nervos, venas, arterias, articulos, capita, musculorumque fines desinunt, vel ad alios sequuntur morbos; adhuc maximè, quæ dorsi vertebrae, ossa, thoracem, ventriculum, abdomeni obsident; quæ gravia post se relinquant symptomata, ut febrem, cachexiam, sincopen; tum quæ rectum intestinum, uterum, vesicæ collum, serotum, inter-nos oculorum angulos penetrat. Fistulæ non benè curatæ iterum recluduntur, coacta materiâ, imprimis ubi subest osium caries. Cancerosæ perdifficiles sunt curationis. Si per multos annos fistula duravit, & subito claudatur, lethalis. Ex materiâ effluente majus, vel minus periculum concludere potest chirurgus; si namque immodicam saniei materiam eruant, corpus contabescit; si saniem non amplius emittunt, & foetidos eruant halitus, in quibus etiam fistulis specillum veluti ab igne coloratur, item in quibus pus egreditur amurcæ instar, & foetidi odoris, ut plurimum moriuntur."

Curatio.

Ulceris fistulosi curationem aspiciantur vulgares ab his quæ causam respiciunt, præsertim verò colluvies jam genitas quàm citissimè e corpore educunt, probantque cathartica, quæ crassiores eliminant succos, & ne iterum prædicti regenerentur, per intervalla lenia exhibent, ut pravi humores, qui interim producuntur, evacuentur. Ad horum etiam gene-

sim inhibendam optimam victus rationem instituunt, ex cibis laudabilis succi, ac maximi nutrimenti, siccioris quoque conditionis, ac moderatæ quantitatis; nam in longioribus affectibus ob victus parsimoniam sæpè deficiunt ægroti. Deinde totum exsiccant corpus, humores per sudorem educendò, quos per decoctum ligni indicis, & salsa parilla provocant. Nisi hæc sufficiant, fonticulos aperiunt.

Demum, quia fistula curari nequit, nisi callus auferatur, & orificium taliter dilatetur, ut medicamenta ad cavitatis fundum perveniant, ab orificij dilatactione curationem exordiantur. Utuntur itaque turundis ex spongiâ contortâ, radicis gentiana, vel aristolochia, vel bryonia, vel etiam ex medullâ ligni sambucini, cum extractorio filo, ut si in sinum ipsum inciderint, ruto extrahi possint, quas turundas unguento aliquo oblitatas applicant. Talia, postquam humores imbiberunt, sese dilatant, & orificium ampliant, hinc per duodecim horas relinquenda monent, deinde extrahunt, quibus extractis, majores turundas semper introducunt, donec foramen amplum evaserit, imò ad sinuosæ cavitatis fundum usque, si fieri potest, pertingant. Hoc peracto, ad callum auferendum, si patiens unctionem, vel incisionem horreat & callus non sit admodum crassus, præmissâ prius leni scarificatione cum corrosivis sine dolore exedunt, talia sunt, quæ ex eorum serinijs depromuntur, ut unguentum ægyptiacum, apostolorum, salsura radicis aristolochia, turunda

fistula legia melle illita, vel radix ellebori nigri, præcipuè si affectus humoris melancholici naturam sapiat, & hujusmodi medicamenta per triiduum in cavitate detineantur. Potentiora ipsorum exedentia sunt *chalcantumustum*, *pulvis cantharidum*. *Lac asule*, *aqua calcis vivæ &c.* sed præ omnibus, si callus sit durus, trochiscos Ioannis Vigonij commendant pro fistulosis ulceribus curandis.

Alij pulverem ex corrosivis conficiunt, & per cannulam in foramen insufflant. Quidam eosdem pulveres cum mullâ dissolunt, & per siphonem in fistulæ foramen injiciunt, & id observant, ubi fistulæ sunt nimis profundæ, cuniculosæ, & anfractuosa; illuc enim tantum liquida penetrare possunt. Vel aquam fortem probant in tortuosis, ac labyrinthi modo flexuosis, quia omnes fistulas mortificat, earumque calum exedit; verum hæc non sine evidenti vitæ periculo administrari potest ob sævissima accidentia, quæ excitat. Dùm hæc medicamenta applicant, ad vitandam fluxionem, & inflammationem propter dolorem semper defensiva administrant. Post calli erosionem partem abstergunt, & illa administrant præsidia, quæ cavitatem implendi, carnemque regenerandi facultatem habent.

Cæterum nil efficacius, & expeditius quàm incisio, vel adustio, præsertim ubi fistulæ sunt nimis profundæ. Secant & primò specillum ligneum intradunt, supra quod incisionem instituunt. Scalpello, vitatis vitandis, fistulas operiunt, donec ad

fundum deveniant. Sequenti die calum, caustico vel corrosivo absumunt, vel ustulant, & omnino auferunt vel fistulas candenti ferro inurant: Peractâ operatione, *oleo rosaceo cum ovi vitello agitato* dolorem leniunt, quo factò, *butyro recenti*, vel alijs unctuosius cum folijs endivia escharam sensim emolliunt ad casum usque, escharâ ablatâ, si pus album, læve, æquale & minimè fœtidum compareat, & ulceri laudabilis redeat color, optimum ominatur eventum, & præsertim si dolor, tumor, aliaque symptomata seriantur, tunc per sarcotica optimam carnem in loco calli sustitui sinunt.

Quodd si ob ægroti debiles vires, vel ob loci situm, in quo fistula hæret, & ex curatione vitæ periculum impendit, institui non potest, quia neque sectionem, neque ustionem, neque corrosionem petitur locus, curam instituunt, quam *palliativam* appellant, & vere, ac aurumno, bis in anno corpus pravis refertum succis optimè deplere, ita enim credunt magnopere ad sanitatem conferre, quin & ætatum mutatione sponte sanescere. Verum, ut inquit *Paracelsus*, noster, nunquàm hætenus auditum est hoc ulcerum genus per se sanatum fuisse, sed per medicamenta solum, & optimè conditionata, aliàs verò minimè curari testatur.

Nostri de ulcere fistuloso curatio duplici instituitur modo, una interna, altera verò externa; interna per poriones vulnerarias procedit, quæ sunt *ex santiculâ*, *pyrolâ*, *vinca pervincâ*, *alchimillâ*,

aristolochia rotunda, hederâ terrestri, scordis &c. vel per diaphoretica ex antimonio, mercurio, benzoaræ, min. ocul. contr. spiritui c.c. sale volatili viper. &c. Vel per decocta lignorum, radicum, & herborum; hæc namque sanguinem, & succos corrigunt, acidum, salsumque fixum temperant, ad resolutionem disponunt, acres ichores, & superfluitates serofas ad effectum locum fluentes eminant.

Externa curatio topica expostulat, quæ callum absumendi energiam habent, hujus farinæ est *mercurius precipitatus incarnatus vel albus, vel magnum calcinatus Paracelsi*, quibus turgentæ vino madidæ, & deinde expressæ immerguntur, & intra fistulas immittuntur; quæ ante XXIV. horas non eximantur cum *emplastro fodicationum* superpositione, postmodum semper recentes intruduntur ad totalem usque calli absumptionem. Vel eodem modo *lapide infimali*, vel per cæteris *trochiscis de mercurio meteorizato popio, & gummi tragacanthi* paratis utimur. Si plures anfractus habeat fistula, apriora erunt medicamenta in formâ liquidâ, quæ a facilius totam scrobem, & anfractuositatem penetrant, & callositatem exedunt, hujusmodi sunt *aqua mercurialis, aqua salis armoniac. n.d. spiritus salis armoniaci, oleum antimonij, vel mercurij.* Amoto callo, *balsamo sulphuris cerebinthinati, vel balsamo propriatatu per infusionem, vel unguentis sarcoticis* uti possumus ad novæ carnis suffectionem.

Summopere in ulcere fistuloso commendantur Thermae quædam naturales, sic in *Anariâ balneum Gurgitelli. & fontana, in agro Puteolano*
De Caroli Musisani Tom. II,

balnea solis, & luna, ac Cantarelli. In talium aquarum defectu substituiimus decoctum *scordis, agrimonis, florum hyperici &c.* in cujus singulis libris soluta sit *lapidis medicamentosi uncinna*; debent tamen tam naturalium, quam artificialium thermarum aquæ calidæ per siphonem in fistulosum locum injici.

Aliqui chimastris, omnibus incassum tentatis, in fistulosis ulceris curatione ad *aquas stygias* confugiunt, sed semper infelici cum successu; hæc namque aqua, sicut & *oleum vitrioli, vel sulphuris* semper suspecta sunt, præsertim in fistulâ lacrymali, vel aliis in locis ejusdem conditionis, ob motum excursus in vicinas partes, & plus solidis, & crassioribus hujus metus expertibus confidimus.

In nostrâ curatione nullam de ferro, & igne mentionem fecimus, nam nos in eâ sumus sententiâ rari, vel nunquam ad ferrum, sive ignem actualem confugiendum fore; facile enim nervosæ partes, venæ, sive arteriæ læduntur: tentanda ergo sunt remedia generosa supra à nobis proposita. Præterquam quoddam quandoque loci conditio nec corrosiva, nec ferrum, neque ignem actualem admittit, & tunc ad galenistarum curam palliativam necessariò, tantquam ad sacrum asylum, recurrendum est.

CAP. XXI.

De Ulcere cum ossis Carie.

Inter cætera accidentia, quæ ulceris consolidationem remorantur,
M tur,

tur, præsertim est os cariosum, ulceri subiectum, quo existente, ulcus, quod in carne existit, ut sanescat, impossibile est; quin potius ossis caries tollatur. Quod si quandòque cicatrice obduci videatur, tempore sat exiguo denuò aperitur. Sicut propriè caries in lignis dicitur, cùm à vermiculo eroduntur, ità peculiari nomine caries ad ossa pertinere videtur, quia huiusmodi vitium est ossibus attributum; attamen etiam impropriè, & analogicè ad carnes exesas se extendit. Est igitur ossium caries ossium corrosio à succis acris, & corrosivis proveniens.

Signa.

Sine ulcere sordido, aut fistulà raro observatur ossium caries, prout enim ulcus carnosas, ac fibrosas, molles partes est, sic caries duriores, ac osseas: Ulceri igitur cum ossis carie signa partem ex se patent, partim verò iudicio explorantur. Ex se patent, ubi os est denudatum, caries visu comprehenditur; ossa enim quæ carie tentantur, livida vel decolorata, vel nigra, vel cariosa, & inæqualia spectantur. His referta coloribus apparent, quia & sphacelata sunt; nam os, dùm vivit, subrubrum est, quandò mortuum, album, cùm corruptum, lividum, vel nigrum. Caro ulceri circumposita est spongiosa, mollis, fungosa, in superficie deprehenditur sublivida, & pallida, & sæpè lardi instar.

Caries non detecta iudicio exploratur, ut si diuturnus præcesserit tumor, aut malignus abscessus, aut ulcus dysipulotum, cacochoricum,

contumax, vel vetustius, ut inquit *Hip. aph. 45. sect. 6. In ulceribus annuis, aut etiam diuturnis abscessum cum ossis communicari est necesse, & cicatrices cavas fieri.* Caro est mollis, & livida, huiusmodi namque caro ossis vitiiati quodammodò pathognomonicum signum est; siquidè ad ossis cariem cutem, & carnem non contaminari impossibile est. Sanies, quam ulcus eructat saniosum, tam est copiosa, quam ulceris conditio non fert, pinguis, oleosa, mox fætida, quandòque flava, subviridis, ut plurimum tenuis, & fluida, nigra, & in cò scærens. Si sanguis effluit, est niger, & coagulatus. Tandè ossa vitiata specillo explorantur, quæ aspera, & inæqualia deprehenduntur, quandòque mollia, & multis prædita cavernulis, ac supra turundas, aut emplastra macula nigra apparet.

Cause.

Pro ulcere carioso accusant vulgares humores acres, crassos, vel frigidos, sed frequenter malignos, virulentos, putridos, ac prorsus corruptos, qui ex alicujus visceris, & præsertim hepatis vicio producantur. Verùm hoc eorum dogma universalis continet verba, quæ multum dicere videntur, cùm nihil dicant. Prætereà non explicant, qua acrimoniâ, malignitate, & virulentâ humores scateant; nec quomodò humores crassi, & frigori ossa exedunt, intelligere possumus; nec quomodò hi humores quandòque ossa erodunt, canum instar, carne non exesâ, exponunt. Pro huius affectûs generatione in medium hepar, omnium morbo-

rum patronum, afferre sufficit.

Juxta nostram sententiam fit ossium caries in ulceribus ita: In tumoribus diuturnis, ulceribus annis, & cachecticis quando obstructa sunt vascula, liquor, sive sit succus alibilis, sive lymphæ, obstruens ob moram fermentatur propter particulas falso-acidas, & quo diutius remoratur, eo diutius fermentatur, & majorem adipiscitur exaltationem, ineptus ad ossium nutritionem redditur, & ob molem, & figuram ad evaporationem inhabilitatur; unde particulae acidæ, salinæ, & acres, acutæ, angulares suis spiculis periosmium, corrodunt, quod ex præviis sæpenuerò doloribus acerbissimis conjicimus; dolores namque à particulis acidis, salinis, acerbis provenire nemo est, qui ambigit, ut in venereis grammatibus observamus, sub quibus post diuturnas noctis torturas ossa cariosa fieri necesse est. Postmodum ipsæmet particulae ossium poros invadunt, lacerant, perforant, & cariant, quia ultimum exaltationis gradum adeptæ fuere.

Solet quandoque os tantum cariari, in columi existente carne, verum id intellectu difficile videtur, & omnem vulgarium superat intelligentiam, & tamen autopsia veritatem multoties nos cum multis edocuit, cujus ratio est, quia falsa, acida, aciaque corpuscula ossium poris non conformantur, sicuti carnibus, hoc est tali pacto sunt conformata, ut non adaptentur ossium proovertatibus, unde eas lacerant, exedunt, easque inducunt, & aliis mollioribus partibus adaptentur, atque hinc fit, ut nonnunquam ossa sint, circum-

jacentibus partibus sanis existentibus, ut in dies in illa pertinaci affectione, quam Barbari medici spinam ventosam appellant, observamus.

Prognosis.

Ulcus, uti os cariosum subest, curationi reluctatur; cicatricem enim non suscipit, & esset quandoque ad eam deveniat, brevi temporis intervallo iterum aperitur, idèdque difficilis est curationis, nisi os ad lævorem deducatur, & nihil magis medicos fatigat in curandis ulceribus, quam ossis caries, & corruptio. Si ulceri cum ossis carie circumducta caro sit livida, malum inquit Hipp. aph. 2. sect. 7. In aegrotante caro livida, malum; non enim magnam labefactionem, sed etiam insignem ossium corruptionem denotat. Augetur nihilominus curationis difficultas in corpore cacoëtico, si circa partes nervosas, ut in manibus, & pedibus, vel in juncturis, & magnorum ossium capitibus, vel circa musculorum capita, & tendines, quia plerumque nervi, ut tendines simul corumpuntur, vel circa arterias magnas, & venas, sit ossium caries, quoniam ustiones, ablationes, & fontium medicamentorum applicationes impedit, quæ alioquin indicantur, ut putrida ossis pars à sanâ separari queat. Non leve quoque interitûs discrimen mutilatio potendit, ob prava, quæ excitat accidentia, præsertim cum abraditur, vel ustulatur, vel temerè à medicamentis exagitur; horrenda enim erysipelata, ut notat

Hip. fell. 6. aph. 19. Ex ossis denudatione erysipelas, vehementissimas inflammationes, exuberantes sanguinis profusiones, & exitiales gangrenas observavimus.

Curatio.

In ulcere carioso vulgares primò humores pravi, à quibus malum fovetur, ne generentur, prohibent probâ victûs ratione, quæ non tantum ex optimis cibariis esse debet, sed etiam admodum tenuis, qualis à curante chirurgo præscribitur. Deindè humores, qui in corpore redundant, ne ad partem affectam deferantur sanguinis missione, & medicamento purgante avertunt. Postmodum, quia ulcus cariosum sanari nequit, nisi caries auferatur, carnem, cui os subjicitur, si adsit, *alumine, vel calcantio usito, vel pulvere sabina* abscindunt. Si orificium in carne sit angustum, illud *surunda ex sponsia contorta, vel radice gentiana* dilatant. Detecti ossis lævigationem moliantur euphorbio, vel peucedano, quod si non succedat, ad limæ usum confugiunt. Verum nunquam lima os læve, sed semper asperum, & inæquale reddit, præstabit cultro abrasoribz uti ad ossis lævigationem.

Si os corruptum fuerit, naturam præstolantur, ut illud propellat, sed longa, & diuturna expectanda est ejus separatio; interdum enim post quadraginta dies, interdum sexaginta: quandoque octaginta, & nonaginta juxta ossis majorem, vel minorem duritiem in his ossibus corruptis propellendis laborat. Verum

sunt quædam ossa ita dura, & densa, ut si corrumpantur, non tantum in nonaginta, vel centum non separantur, sed potius per totum vitæ curriculum, ut de calcis osse refert *Gal. 2. de frast. com. 2. l. 21.* perdurent, & interim ob moram vitium pars sincera contrahit, si totum separationis opus naturæ committunt. Hinc nonnulli nasutiores vulgares ad ossis excisionem confugiunt, quam scalpro excisorio, & malleolo assequuntur, eodem ferè modo, quo statuarii statuas efformant, quousque corruptum decisum fuerit, deindè *pulvere myrrha, aloë, aristolochia &c.* aspergunt. Sed si os corruptum ad medullam usque penetret, à chirurgiâ prorsus abstinere, siquidem sæpe observatum fuit detectam medullam putrescere, & circumpositas partes contaminare, atque corrumpere; tunc siccis medicamentis, uti sunt *radix peucedani, iris, opoponax, squama aeris &c.* vel ferro ignito nutrimento privant: inquit os nutrimento destitutum decidere, non aliter ac autumnò ab arboribus folia cadunt, cum humido radicali destituuntur. Verum neque scalpris, neque ferris igniis, neque alimentis privatione ossis caries removeri, & superari potest.

In ulceris cariosi curatione omnes intendimus nervos, ut pars cariiosa, utpotè mortua, separaretur à vivâ, cum qua nec coalescere, nec diù permanere potest, quin eandem itidem inficiat, & ad similem corruptionem sensim disponat, undè malum in dies pejorat: capropter, ne amplius incrementum sumat, exemplo, si corpus sit cacochymum,

pilulis mercurialibus deplemus, postmodum curationem tam internam, quam externam adhibemus.

Internè ea propinamus medicamenta, quæ particulas acidas, sal-
sas, acres, acutas erodentes absor-
bent, obtundunt, infringunt, cor-
rigunt, in quem finem conducet de-
coctum china, ligni visci querni, alio-
rumque lignorum. Similiter sal vo-
latile viper. c. c. succint, fuliginis, ebo-
ris. stibium diaphoreticum. Item
ebur sine igne paratum, c. c. eodem
modo preparatum, oculi cancro-
rum &c.

Externa curatio est, si os carie
affectum sub oculos non veniat,
quæ carne obductum est, specilli
exploratione deprehenditur, tunc
caro absumatur aquâ salis armoniaci,
vel mercurio precipitato albo, quod si
callosa erit, exedatur levi tactu
spiritus mercurii albi. Si detecti ossis
superficialis sit caries, ejus fiat abra-
sio ad lævorem vel caryophyllorum es-
sentiâ, vel oleo succini rectificato, vel
balsamo proprietatis, in quo facta
fueris euphorbii, pencedani, radicis
brionia, & aristolochia rotunda in-
fusio, cariem illine, & affectum admi-
raberis, postmodum sarcaticis utere.

Ossis corruptio si profundior erit,
tunc totum corruptum auferti debet,
quia quod emortuum est, neque cor-
rigi, neque emendari, neque in natu-
ræ gratiam redire potest, nam à
privatione ad habitum naturaliter
non datur regressus. Nec naturam
pro ossis corrupti separatione ex-
pectare possumus, quia expectatio
periculum minuitur, & nisi abla-
tio ocysimè fiat, irreparabilis sequi-
tur mors. Verùm difficultas in carie

curandâ est, quia remedia convenien-
tissima multoties satis convenienter
applicari non possunt; partes namq;
ossibus proximæ, tendines, nervi, &
similes ab actuali cauterio simul læ-
duntur, & intolerabiles excitantur
dolores. Imò augetur malum, quan-
dò sæpius illa actualia applicantur
cauteria, quæ unicâ vice parùm præ-
stare solent, at sæpius iteranda sunt,
si effectum producere debeant. Caro
itaque superjacens absumatur medi-
camentis suprâ propositis, vel cau-
stico, seu cauterio potentiali. vel
difficètur, quousque os corruptum
denudetur, & ne nervi, tendines,
musculorum capita, arteriæ, aut ve-
næ majores lædantur, secundum
partis longitudinem, & fibrarum
ductum, neutiquam per transversum
instituantur, verùm non semper ita
commodè fieri potest hæc operatio,
quin aliqua harum partium læsio
non oboriatur. Ad medicamenta igitur,
quæ non tantum acida, & cor-
rosiva salia cicurant, corrigunt, ob-
tunduntque, verùm etiam, quæ os
cariosum lævigant, & corruptum
à sano sequestrant, meliùs confu-
giendum potamus, hujusmodi sunt
oleum caryophyllorum, cinnamomi, suc-
cini, ligni guajaci, camphoræ, tartari
p. d. spiritus salis armoniaci cum calce
confectus, elixir vita, balsamu pro-
prietatis per infusionem, quibus sin-
gulatim uti possumus, vel compo-
sito modo ita:

℞. Ol. caryophyll.

succini, &

guajaci ana ℥ss. m. vel

vel

℞. Ol. camphor. per ovi alb. parat. ℥.

simpl. ana ℥ss. m.

Quæ

Quæ tepidè ter, vel quater in die repetenda sunt, & quidem plumaceola his imbuta imponantur. Vel hæc simplicia applicari possunt, ut myrrha, aloë, aristolochia, cortex panacis, peucedani &c. Vel ita medicamenta composita concinnamus, & præ aliis nostram emphorbij tincturam, ut

℞. Euphorbij 3.ij.
radic. peucedani,
aristolochia rotunda,
bryonia ana 3.℥.
myrrha, &
aloë ana 3.ij.
caryophyllor. 3.j.

Infunde in aquâ Regine Hungariae ℥.℥.
per quinque vel sex dies, deinde tincturam elice, & ad usum serva.

Vel

℞. Balsam. propriet. per infus. 3.iiij.
iridu florentia 3.ij.
cinnam. 3.℥.℥.
succ. bryonia 3.iiij.
camphore 3.j.

Sicent simul per duos, vel tres dies, doindè decanta, & serva.

His tincturis lintea imbuta cariosis, vel corruptis ossibus bis, vel ter in die imponi possunt. Nonnulli oleum sulphuris, vel virioli commendant, verùm quia corrosiva sunt, meritò repudiamus. Tandem de ossis carie fusiùs egimus De Lue venerea lib. 3. c. 20. de ossium corrosione, & Tomo 1. de Tumoribus cap. 70. De Spina venosa.

Ubi tandem ossis cariola, vel corrupta pars ablata fuerit, ulcus carne implendum, & cicatrizandum,

C A P. XXII.

De Ulcere cum carnis excrecentiâ.

S Olet quandòque in ulcere caro luxuriare, & nimis quàm par est, excrecere, quod vitium græcè hyperfarcosis appellatur, hoc ubi accidit, ne ulcus cicatrizari possit, impedit.

Signa.

Ulcus cum carnis excrecentiâ signis non indiget, sed visu deprehenditur, sensim namque caro quædam sylvestris incrementum sumit, solida non est, sed mollie, laxa, & spongiosa. exulcerationem secum affert, & spurcum fundit ichorem.

Cause.

Putant vulgares carnis excrecentiam ulceribus accidere vel ob sanguinis copiam ad partem ulceratam confluentis, vel ob scortica nimis debilia, & minùs quàm par est, exsiccantia adhibita. Còterùm errant vulgares chirurgi putantes sanguinem corpus nutrire, cum excarnes plurimo abundant sanguine, & corpulenti minime; id enim pluribus in locis repudiavimus, cum sanguis ad vitalitatem tantùm inserviat.

Ulceris hyperfarcotici causa est crassa, & viscosa ulceris impuritas, vel ipsa unguentorum crassities, quæ cum succo alimentatio extra solidas fibras agglutinatur, & in luxuriantes degenerat carnes, ceu à cardî conf-

C A P. XXII. De Ulcere cum carnis excreſcentiâ 95
conſpurcatione ac arboribus viſcus
innaiſcitur.

Prognofis.

Ulcerum excreſcentiâ dùm aver-
rucantur, ſi radicula remanent, ne-
ceſſariò regerminant. Ichor ex ſarco-
mate excedens tendines ligamenta,
& nervos corrumpit, ac totam affe-
ctam partem periculo ſubjicit, &
quandòque dictæ excreſcentiæ in
cancerofam migrant naturam.

Curatio.

Pro ulceris hyperſarcotici cura-
tione vulgares primò inedia m ægro
imponunt ad ſanguinis diminutio-
nem, deindè ad medicamenta car-
nes luxuriantes exedentia ſe conver-
tunt. Undè ſi ob ſarcoticorum nimis
debiliuſum uſum caro luxuriare inci-
piat, detergentia, & exſiccantia uſur-
pant. Hujus ſariniæ ſunt *linimenta*
ſicca, *ſpongia niſta aloë*, *vitriolum*, *vel*
alumen uſtum, *ſabiens pulvis*, *unguen-*
tum aegyptiacum, *vel apoſtolorum*, *aqua*
calciſ vivi, *aqua aluminofa ſatlop*. Si
his a non cedat remediis hyperſarco-
ſis, ad incisionem confugiunt. Verùm
incifio formidoloſa eſt, nec funditus
adimitur, undè hyperſarcoſeos im-
promptu eſt regerminatio. Vel ad
ignem accedunt ad quem rariffimè
confugiendum eſt, niſi ſumma ur-
geat neceſſitas, & prædicta remedia
diù, & incaſſum fuerint adhibita.

Ulceris hyperſarcotici noſtra cu-
ratio eadem expoſcit interna reme-
dia, ac in aliis ulcerum ſpeciebus di-
ximus; quò ad curationem verò
exteriorem tantummodò variat, &

quidem externa ea conducunt me-
dicamina, quæ carneas extirpant
excreſcentias. Ad hunc finem exper-
tum pulverem habemus ex alumine
uſto, & pulvere ſabinæ ana, vel vi-
triolum crudum pulvere tenuis, vel
hunc pulverem, quem centies exper-
ti ſumus, ut

℞. Virioli,

aluminis niſti, ut

ſaliſ armoniaci ana 3j.

ſiat horum pulvis ſubtiliſſimus.

Si fortia deſideras, uti poteris mer-
curio albo, vel rubro, vel magno calcina-
to Paracelli. Si hyperſarcotiſis ſit ma-
gna, & contumax maximoperè con-
ducet *lapis infernalis*, *vel oleum vi-*
trioli, *vel ſulphuris*, *vel antimonij*,
ſed in applicatione maxima ad-
hibenda eſt dexteritas, ne naturalis
tangatur caro. Sed Carnis excreſ-
centias optimè coërcet *ſpiritus ſaliſ*
armoniaci, *vel ſpiritus mercurij albus*,
quas abſque ullo recidiuſ timore ex-
terminat. Nonnulli chymicaſtri ad
has excreſcentias extirpandas aqua
ſorti utuntur, ſed non eſt laudabile
medicamen, nam cauti eſt, & quia
ſpirituofa, multùm ſe diffundit pru-
ritum excitat intolerabilem, & car-
nes exedendo inflammationem pro-
ducit.

C A P. XXIII.

De Ulcere cancroſo, lupo, & Noli
me tangere.

Supervenit interdùm ulceribus
ſumor quidam à latinis cancer, &
à græcis carcinoma appellatus, &
quandòque cancro ulcus ſupervenit.
Dicitur cancer ob ſimilitudinem,
quam

quam cum canero in aquis degente habet vel dicitur cancer, quodd sensim serpit cancri piscis similitudine. Vel quodd venas circa se habet extensas, ac turgidas, quæ cancri marini pedes expriment divaricatos. Vel ob capacitatem, quæ rei semel apprehensæ hamulosas chelas, & pedes ita infigit, ut difficilis sit extricatio, & grave effugium. Est cancer tumor lividus, durus, initio parvus, sensim, ac sensim à succo acidior, & acrior factus adjacentes corrodendo, cum dolore partis affectæ molesto.

Cancer alius est occultus, seu non exulceratus, vel ut aliqui malunt, qui sine ulcere radices in abditis corporis partibus occultas habet, ut qui in palato, sinu muliebri &c. latitat. Occultis ab aliis tumoribus multum differt, nam isti perfectam nanciscuntur suppurationem, vel sui apertione exonerantur, digerantur, mundificantur, & perfecte curantur; cancer vero apertus recrudescit, augetur, irritatur, effrascit, & nunquam curatur. Alius est manifestus, seu exulceratus, & labia habet prætumida, foris emersa, & maxime dolentia.

Nonnulli lupum, & noli me tangere à cancro sejungunt, verum hæc ulcera cancri species indicant, estd *Marcellus lib. 7. c. 1. ad phagedænas* magis referat. Est itaque lupus ulcustibias, vel crura ut plurimum obsidens, exulcerato quoque cancro non absimile. Cæterum in reliquis corporis partibus etsi ejusdem sit pravitate, lupum absolute nominari non censemus. Itaque hoc ulcus vulgè nominatum fuit, quia corrosivus succus illud causans, propinquas exedit partes, nisi obundatur ejus corrosio, & ha-

betetur appositione carniū gallinæ, ceorum, vel vitulinarum; eas famelici lupi instar exedit, & absument, estd hanc opinionem fatuitatem appellet *Iohannes Philippus Ingrassius*, tamen eodem carniū pabulo post multa medicamenta incassum adhibita, quandā mulierem ab Empirico lupo laborantem sanatam fuisse legimus.

Noli me tangere est, cum in facie, præsertim supra mentum, circa os, & nasum tumor, vel ulcus cancri speciem referens oritur, lentè initio crescens, quasi parva pustula toto anno manet, quæ aliàs minùs serpit, quàm cancer, undè noli me tangere tantum unico mense corrodit, quantum cancer exulceratus unica die. Talem nomenclaturam sortitum esse putant, vel quia contagiosum cum sit, tangentem manum male afficere potest; vel quodd fricari non debeat, cum quodd plùs manu tangitur, & fricatur, eò deterius redditur; tum demum quia exasperatur, & exacuitur potius ab applicatis remediis, quàm mitigatur, & in sanas serpit partes.

Signa.

Ulcereis cancerosi signa facillè deprehenduntur ex ulceris formà, quæ inæqualis est, cavernosa, & obstracosa; Ex odore, quem foetidum, & cadaverosum emittit; Ex excretis, effluit namq; materia sordida, foetida, ichorosa, & interdum flava; Ex dolore, qui est serè intolerabilis, & æger non aliter dolore percipit, ac si acicularum myriade pungatur, nunquam deest, saltim per intervalla, & non exasperari solet; Ex colore, qui fuscus est; ex

aspectu, qui horridus, ceter, & abominabilis est; ex tactu, qui est durus, & obstinatus, aliquando etiam mollis; Ex ulceris labilis, quæ sunt crassa, prætumida, erosa, & foris inversa. Venæ etiam circumpositæ turgidæ, varicosæ, ac nigricantes, apparent, & canceri pedes quodammodo representant, quia sanguinis motus ab affectu partis densitate, & constipatione feriatur. Interdum venarum, & arteriolarum extremitates absumuntur, & corro duntur, & magna sæpè sanguinis profusio sequitur. Carnes proximæ sæpè ita in mammarum cancro exeduntur, ut absumentis partibus musculosis, in ipsum thoracis specum inspicere possumus. Febris adest lenta, cibi fastidium, & sæpè animi deliquia. In aliquibus tandem sequitur hydrops, quem ipsa excipit mors.

Causæ.

Tanti mali causam Galeni sectatores ab atrabile deducunt, & hinc jecur, & lienem calidæ, & siccæ intemperie obsessum accusant; hæc namque viscera putant congenerem generare sanguinem calidum, & siccū scilicet adustum. Cæterum internum sanguinis ustulato rem non assignant; præterquam quodd implicat in terminis esse humorem, & esse siccum. In omni corporis parte cancerum nasci posse dicunt, in mulierum autem mammis præcipuè, quia earum substantia est laxa, & spongiosa, non primariò, sed secundariò per amicum consensum, ob uteri vitium, & mensium suppressionem laborantis; in virorum scapulis ob hæmorrhoidum retentionem, in quibus locis venas nigriore sanguine ad canceri animantis pedum similitudinem ten-

sas observari scribunt. Hujus etiam opinamenti *Paracelsus*, illum medicinæ novatorem fuisse legimus, qui alium cancro non destinavit locum, quàm ex menstrualibus ad pectus, & ex hæmorrhoidibus inter scapulas, & est id quod ad locum *Paracelsus* cum vulgaribus malè consentiat, cum omnes corporis partes tanto malo sint obnoxiæ, quod ad causam tamen ad scopum collimat, quia et alia realgarina in locustis deposita recurrit, & reverà menstrua, & sanguis hæmorrhoidalis salibus corrosivis abundat.

Pro causis remotis assignant vulgates ea omnia, quæ sanguinem adustum, & melancholicum producere possunt, ita sunt carnes fumo induratæ, allium, porrum, cæpæ, legumina, præcipuè lentium esus, cochleæ, vigiliæ, aer nimis calidus, & siccus &c. Internæ sunt menstruorum, vel hæmorrhoidum suppressiones, & sicca hepatis, vel lienis intemperies, vel imbecillitas. Conjuncta verò causa est sanguis melancholicus adustus, qui postquam acrior redditus, & contumacior factus, in venis impactus putrescit, & cancerum efficit ulceratum.

Nonnulli vulgares dubitant, an cancer inter calidos, vel frigidos tumores referendus sit, cum humor melancholicus terræ elemento correspondeat, quæ per ipsos frigida, & sicca est; hujus sententiæ fuisse eorum *Galenus* 2. ad Glave c. 10. est id libro de tumoribus c. 8. 10. 11. palinodiam canat.

Verum nonnulli etiam vulgares humoris melancholici, seu atrabilis insufficientiâ considerantes, non enim hic humor tantoperè sævit ut carnes

exedat, hujus humoris in suspicionem venire cœperunt. & ita in dissidia abierunt, ut quidam magis eorum ignaviam fateri, quàm bardis Galenicis assentiri voluerint, hujus morbi sævitiam causæ occultæ assignantes.

Quosdā vulgares, ut specioso pallio suam tegeant ignorantem non puduit pro exulcerati cancri causā uberem vermiculorum massam, præ minutie visum effugiētium, & carnes deuorantium assignare, & unā ipsis putredinem, ac vermiculorum generationē subministrantium; undē carnes tam vermiculis, quàm putredine exeduntur. Merūm hos vermiculos nec cum torso speculo in carnis cancerosæ exese frustulo, quod excidendum curavimus, præter viscidum humorem gelationes non absimilē, nec microscopij ope perspicere potuimus.

Pro legitimā ulceris cæcerosi causā supponimus glandulas in humano corpore esse veluti cribra, filtra, & secernicula, quib. liquores à sanguinis massa secernūtur; hic plurimis particulis heterogeneis luxuriant, quæ ab arteriolarum, & venularum poris in vascula, quæ glandulas constituunt, deponuntur, sed quia liquor, qui per glandulas secernitur, heterogeneus est, necesse est, ut omnes singularum particularum pori sint diversimodē confirmati, liquor glandulas permeans, particulis sulphureis, salinis, alkalicis, & phlegmaticis scateat, quodd si unicuique particulæ proportionatus non datur porus ad liberum com meatum, nec harum insensibilis succedat transpiratio, ex remorā obstruētio necessariō sequitur. Cœterū si particulæ acres, acidæ, vitrioli-

quæ per glandulas fluentes impingant, stagent, & salinis, sulphureisq; conjungantur, pedetentim fermentantur, acuntur, exaltantur, & aded realgarinam nanciscuntur corrosionem, ut aquam æmulantur stygiam, ac proindē tubulos cum carne, & membranis corrodunt, absumunt, exedunt, exulcerasque.

Antecedens causæ sunt omnes illæ, quæ salia, sulphura &c. in sāguine inducendi potestatem habent, & primò cruditates in abdomine cumulatæ ob fermentorum vitium. Secundò, viscerum obstructions, præcipuē in ipsis glandulis, quæ & à sanguine viscidæ, terrestri, sale fixo, ac acido referto oritur, à quo melior lymphæ à glandulis separari non potest, in quibus stagnant succi, & de die in diem caustici redduntur, & continuò descindunt, corroduntq; ac aliam planē texturam cancerosam in glandulis efficiunt. Tertiò, diuturna mœstitia, & similia animi pathemata, vel mœstualis, aut hæmorrhoidalis sanguinis suppressio, quoniam ab hisce multa eleuantur miasmata, quæ sanguinis massam conspurcate valent. Externæ sunt, vel fortior glandularum confusio, vel pressio, undē glandularum tubuli obstruuntur.

Dolor in cancro exulcerato intolerabilis excitatur à particulis salinis, & acidis, quæ acutissimæ sunt. prædictæ namque particulæ, dū fermentantur, fibrillas nervosas, & tubulos pungunt, contrahunt, convellunt, cortodunt, exedunt, undē necessariō continuus, vel saltim per intervalla, exquisitissimus dolor à particulis acutis oboritur.

Materia, quæ ex cancro fluit, ita

cadavericum spirat anhelitum, ut non solum adstantibus, sed etiam ipsi ægroto nauseam pariat, ex qua colligimus cancerum exulceratum à gangrænâ parùm differre, quia idem ferè in utroque observatur fœtor, fœtor hic à sulphure putrefacto, ejusque particulis oleosis, & volatilib. oritur.

Materiæ diversitas ex cancro exulcerato promanans, à diversorum tubulorum dissectione, & exsione dependet, quia in nonnullis tenuior, & albidior, in quibusdam crassior observatur succus, imò dissectis vasis sanguiferis, sanguis emanat, qui si cum impetu exilit, ex arterioliis, si absque, ex venulis effluit.

Lenta in cancro febris ab iisdem particulis corrosivis resolutis oritur, & in sanguinis massam delatis, ejusque mysturam vitiantibus.

Animi deliquium provenit ex particularum fermentatione in parte affectâ stagnantium, quarum plures acidæ particulæ ad sanguinis massam deferuntur, quæ eò delatæ ipsum incrassant, coagulantque ac circulationis motum ad tempus impediunt, & animi deliquium inducunt.

Solet quandòque cancer per plures annos sub exigui tuberculi formâ delitescere, quia salinarum, sulphurearumque acutæ particulæ phlegmatis compedibus obvolatæ vinciuntur, feriantur, sopiuntur, & nullum exsionis motum edunt, donec prædictæ particulæ à viscosi humoris vinculis, quibus antea ligabantur, extricentur, & aciculis suis pungere, scindere, & exedere incipiunt.

Prognosis.

Ulcus cancerosum vanâ spe vulgares ludit mœdentes, undè chirurgorum dicitur opprobrium, & ægrotantium dirus carnifex, ac nullus ferè morbus est, qui ægris ingentem incutit metum, quàm cancer exulceratus, nullusque est, qui chirurgos magis fatigat, & pudore afficit, quàm hoc immane portentum, tum quia sanguis in partibus concretus ægrè ob validas concretiones, & nullo modo discuti potest, tum quia ultimum acrimoniz, & malignitatis gradum nactus est, idèdque vulgò dicitur, leviora contemnit remedia, & à fortioribus exasperatur, & præcipuè ubi altas fixerit radices, nullis remittitur præfidiis. Hanc veritatem comprobavit Hip. sect. 6. aph. 38. inquires: *Quibus occulti canceri adsunt, non curare melius curati enim citius inierunt, non curati verò longius vitam trahunt.* Et hoc idem innuisse videtur Ovidius, cum cecinit:

Curando fieri quedam priora videmus

Ulcera, quæ melius non tetigisse fuit,
& ratio est, quia omnes, qui ejusmodi cancos exulceratos curare tentant, magis illos corrosivis irritant. Quod si quandòque aliqui curati fuere, vel in tuto non fuit, nam curatio radicibus subsequuta non fuit, undè malum deindè deplorabile priore peius regerminavit, & mortem intulit. Nos verò mitiorem canceri exulcerati prognosim, quàm vulgares instituiamus, præcipuè si exteriore corporis partes occupat, & remedia acere corrosivam obtrudentibus tractetur. Chirurgiam

quandoque repudiamus, quia ut plurimum non sine magno sanguinis profluvio, & vitæ periculo succedit: attamen cancer in aliquâ corporis cavitate contentus, ut in ano, vulvâ, palato, linguâ &c. difficillimè, curatur, nisi exilis valdè fuerit, & chirurgiâ faciliè tolli possit.

Curatio.

Canceri ulcerati curatio apud vulgares consistit primò in sex rerum nonnaturalium vulgè dictarum moderamine, undè aërem eligunt temperatum, victûs rationem, quæ ad humidum, & frigidum vergat commendant, cum eorum abstinentiâ, quæ atram bilem gignere, vel ex-calfacere possunt. Pro potu acida vitanda jubent. Motus magis, quàm quies conducit, quia atrabilarius humor fluidior redditur. Somnus moderatus magis prodest. Alvus servetur lubrica, & si qua consueta evacuatio fuerit suppressa, omni studio promoveatur. Veneris usus sit rarus, Mæstitia, terror, metus, aliaque hujusmodi animi pathemata magnoperè nocent; sanguinem namque aliosque humani corporis succos coagulant, & ad motum ineptiores reddunt. Lætitia, gaudium, fiducia, spes maximè profunt; hæc enim copiosam succorum distributionem per totum corpus promovent.

Deindè purgante medicamento melancholicum deplent humorem, & faculentum repurgant sanguinem; insituant tamen purgationem per inferiora, nam per has partes melancholici succi utiliter extur-

bantur, ut notavit Hip. *sect. 4. aph. 9.* *Melancholicos verò plenius per inferiora, eâdem ratione contraria apponentes.* Ad hoc ergò obtinendum primo serapiis humores præparant, quos postmodum *syr. de sumariâ majori, vel de sumariâ majori helleborato, vel pulvis de lapide lazuli* purgant, & hoc non solum in principio, sed in morbi decursu toties, quoties accidentia sæviunt. Post purgationem ea, quæ hepatis fervorem, & totius corporis calorem temperandi energiam habent, propinant. Præterea per diuturnum tempus præscribunt *seri caprini usum recto depurati, in quo inaceratus sit epithymus.* Verùm purgantia in cancro nocent, & malum non attingunt; hæret namque ut plurimum partibus solidis, & est centio. purgabis cancerum non tantum non curabis, sed nec tantillum lenies, imò magis exasperabis.

Sanguinem è venis sedis miltunt, vel salvatellam tendunt; putant enim ex harum apertione melancholicum sanguinem educi. Cæterum cancerosus ex sanguinis missione illud reportabit juvamen, quod ex medicamento purgante, imò aliquod de ipsius vitâ demetur.

Tandem ad partem affectam varia applicari jubent medicamenta, semper exasperantia vitantes, hujusmodi sunt *unguentum populeon cum succo solani, & plumbo usito simul in mortario plumbeo agitatis*, quibus quandoque addunt *oleum rosarum, succum virgæ aureæ, & peti*, ut præstantius evadat medicamentum. Vel linimentum concinnant *ex succo sedis majoris, plantaginis, solani, pulvere libargyrii, cerussa, pompholygium,* quibus

CAP. XXIII. De Ulcere cancroso, lupo, & noli &c. 101

quibus ad majorem efficaciam oleum rosarum, & ceram addunt. Hisce non juyantibus, ut semper evenire solet, ad ferrum, & ignem confugiunt, si vires, & ætas consentiant. Sed hanc curationem, quæ ferro, & igne fit, tanquam barbaram, & noxiam repudiamus.

Verùm, quia ulcus cancrosum ex atrâ bile fit, ut notavit *Gal. libello, de atrabile*, curationis spem adimit, ac proinde malum specioso tegunt pallio, & non curant, ita distante *Hip. sect. 6. aph. 38.* ad curam palliativam recurunt, nempe verè, & autumno corpus cancrosum purgant, & quoties morbi sævitia exigit, item duos aperiunt fonticulos, ut materiam cumulatam ulcus excitatum sensim ad vulgarium nutum educat.

Pro ulceris cancerosi curatione procatharticæ, evidentesque causæ, siquæ adsunt, removendæ, & sedulo incumbendum est, ne acidi, salinique succi imposterum generentur. Si cancer sit in extimâ corporis parte, & certissima mors brevi immineat, & in tali parte vel commodâ sectione radicitus excindi possit, amputandus est ad vinum usque, semper tamen sinistro se muniat prognostico chirurgus; expedit namque interdum anceps experiri præsidium, quàm nullum, atqui sectio perperam instituta in cancro incurabili sæpè recidivam minatur, & quidè majori cum tumore, & exulceratione, ut pluries observavimus. At si cancer majora vasa sanguifera obsideat, ut immodica sanguinis profusio timeatur, cuncto minime excidendus est, sed potius

ustione extirpandus, actualem ad-mouendo ignem sanâ tenus parte. Cæterum caustica non possumus non commendare, inter quæ *oleum arsenici fixum, & corollum, oleum Antimonii, vel lapu infernalis* sub formâ liquidâ excellit, attamen sat laudare non possumus *oleum mercurii album*, quo nos feliciter utimur per iteratam applicationem.

Quòd si cancer sit occultus, hoc est, penitiora obsideat membra, vel illas occupet partes, quæ viciniam, vel consensum cum nobilibus, principalibusque partibus habent, nullatenus excisionem, vel adustionem admittit, vel si magna sit ægrotantis imbecillitas, vel omnia depasta fuerint, quæ talem non sinant operationem administrari, præstat potius curatio palliativa, siue fucata vulgò dicta scilicet potius palliari quàm curari, & remediis lenioribus externis tractari, non posthabitâ internæ sanguinis, succorum correctione, & debitâ diætæ præscriptione. Lenientia, & blanda debent esse topica medicamenta, non tamen efficacia; talia namque particulas viscidas commovendo, acutas, & corrosivas quiescentes ad motum suscitarent, undè ulcus corrodingo serperet, & immanis concitaretur dolor.

Purgantia in cancro medicamenta liberrimè non convenire fatemur, quia malum solidas obsidet partes, & esto centies purgaveris, nunquàm cæcrum vel curabis, vel lenies, imò id pejus reduces, salinas, acidasque particulas agitando, & magis exaltando, acutissimas reddes, præter mercurialia, quorum sæpè optimum observavimus effectum, Eodem pariter modo

do sanguinis missio officiet, cum totus unius conditionis sit sanguis scilicet acidarum, salinarumque particularum sordie imbutus. Præterea venas impuro sanguine turgidas ulceri subiacentes nunquam deplebis.

Exulcerato cancro ea interne conveniunt medicamenta, quæ acidas, salinasque particulas exaltatas concentrant, cicurant, absorbent, & glandularum obstructions referant, huiusmodi sunt oculi cancerorum sicutiatisim, alkali chelatum cancerorum, corallia, margarita, eburi, & c. sine igne parata, crystallus montana præp. Item alkalia fixa, vel volatilia, & diaphoretica omnia, quæ acidas, salinasque particulas hebetant, & à corpore eliminant.

Ad obstructions, & præcipuè si cancer ex menstruorum, vel hæmorrhoidum suppressione ortum habeat, chalybeata adhibemus, ut est vinum chalybis, martis dulcedo, pulvis cachecticus Quercitanus, vel noster simplex ex chalybe incrocū redactis absque sulphure, & aceto, ac ex cassia lignea, vitriolum martis, tintura, Julep. &c. nec non aqua acidula chalybeæ, seu mariales; hæc namque medicamenta debile acuum fermentum, crassos, torpidosque succos ad debitum suscitant fluxum, viscerum impuritates abstergunt, tubulos permeabiles reddunt, & adstrictiva, qua pollent facultate, omnium fibrarum laxitatem tollunt, in easdem convenientem, naturalemque tonum inducunt, & tandem sanguinis, omniumque fluidorum aciditatem infringunt, & depurant.

Ad intolerabilem cancri cruciatum externè applicari potest camphora in aqua maderarum, vel spermatis ranarum dissoluta, vel melius ablatur vini spi-

ritu non deplegato; spiritus namque iste omnes particulas acutas secum rapit. Interna verò ad doloris sedationem opitata omnia, & sulphura mineralium anodyna fixa palliativè multum valent.

Topica exulcerato cancro adhibenda sunt omnia, quæ acidum acre temperant, ut emplastrum de ranis cum mercurio, unguentum nostrum magistrale, vel saturnus in laminas redactus palliativè imponatur; id saturni enim laminæ diu gestatæ, præter erosionem, in medio albicantem pulverem, seu cerussam observavimus, eodem ferè modo ac Saturnus ab acris aceti vaporibus in ventre equino in cerussam redigitur. Nonnulli, & melius, saturni laminam mercurio vivo illitam cancro imponunt. Insuper omnia medicamenta ex saturno elicta ulceribus malignis, exedentibus, cancerosis, & similibus saturninis, lupo conveniunt; hæc namque omnes particulas acutas, acres, & corrosivas, dulces, & innoxias reddunt.

Verum, ut verum fateamur, genuina cancri curatio in mercurio consistit in huius namque corpore omnia salia acuta, exaltata, & corrosiva liquores acedi, & acres immutantur emoriuntur, & absque reactione in mercurium à mercurio patiuntur Mechanicam in mercurii dulcis confectione habemus, in qua salia sublimata & supra mercurii corpus exaltata, & corrosiva reddita, venenata per novam mercurii vivi additionem omnem corrosionis activitatem amittunt, & in suave ac nobile medicamen transmutantur. Insuper ab eadem mercurii dulcis confectione didicimus arsenicum vel realgar,

algar, auripigmentum vel sandaracham quæ inter venena corrosiva haud infimum tenent locum sunt que venenorum maxima per mercurium cicurari, & dulcescere, ita deposita omni venenositate, ut tutò & salubriter tam intra corpus assumi quam extra applicari, & multis morbis mederi possint ut

*℞. Arsenici crystallini ex. c. ℥
mercurii vivi ana*

miscantur in mortario lapideo tamdiu donec nullum mercurii granulum appareat. Ponantur in aludelo & igne arena sublima per sex vel octo horas, scinde vas & arsenicum sacchari instar dulce pluribus morbis applicandum invenies. Hinc itaque discamus oportet: mercurium omnium corrosivorum strenuissimum esse domitorem.

Multifariam cancro mercurius applicatur, sed præ cæteris non quidem vulgaris, crudus, & indigestus, sed indolens, cujus nos præparationem alibi docuimus, & *Helmontius lib. de Ideis morbofis* notavit. Nonnulli per salivationem ope mercurii peractam cancerum curarunt, ut apud optimæ notæ auctores legimus. Cæterum nos in cancri curatione in paucâ dosi suffumigio utimur, absq; eo quod salivationem promoveat, ex scrupulo uno cinnabaris factitiæ, vel cinnabaris antimonii \mathfrak{B} . vel nativi gr. iij. solo quippè talis pulveris fumo in singulos dies semel continuato ad perfectam usque cicatrizationem ulcera cancroso duximus, & quoties denuò regerminavit, eodem suffumigio felici cum successu curationem complevimus,

CAP. XXIV.

De Ulcere dysepuloto, Cacoëthe, Telephio &c.

PRæter ulcera, quæ hucusque nos recensuimus, alia quamplurima per chirurgorum ora, ut dysepulota, cacoëthe, phagedænica, Telephia, chironia &c. vagantur, quæ qualia, & quid sint, hoc capite expediemus.

Dysepulota græcè, latine ægrè sanabilia, & contumacia, & ea sunt ulcera, quæ ægrè sanationem recipiunt, & cicatrice obducuntur, ex eo quia licet pars affecta influentem non vitiet humorem, ad partem nihilominus exulceratam mordaces humores perpetuò conflunt; ulcera namque diuturna necessariò viscera contaminant.

Ulcus cacoëthe, sive malignum vocatur illud, cum quo copulatur peculiaris exulcerati membri præternaturalis dispositio, humores vitians quantumvis laudabiles in laborantem fluentes.

Chironia, & Telephia malignorum ulcerum species dicuntur, appellationis tamen rationem alii aliam tradunt. Pro Chironia quidam existimant *Chironem Centaurum ab Hercule ictum immedicabile in pede vulnus accepisse*, undè perierit, & hac ratione ulcera immedicabilia chironia dicuntur. Alii ut *Ovidius P. fastorum* tradit: *Herculem à Chirone hospitio susceptum fuisse*, is cùm illius arma pertractaret, evenit, ut sagitta quædam Hydræ Lerneæ veneno imbu-

imbuta in pedes incidisset, quod malum nullâ ope sanari posset, mori tamen non potuit, quod utroque parente immortalis natus: tandem cum à superis impetrasset, ut immortalitatem sibi morte commutare liceret, in Cœlum translatus est, ubi *signum* effecit. Sed hoc Ovidij commento remoto, rei veritas est *Chironem ab Hercule* in pede vulnus perniciosum, & venenatum accepisse, & *Centaureâ*, quæ indè à posteris chironium dicta est, semetipsum sanasse, fuit *Chiron primus chirurgus, antiquioris medicinae partem, inventor*, & à manibus, manuumque operatione nomen desumpsit. Dicitur itaque chironium ulcus contumax, & malignum, quod ob contumaciam, medicam vix recipit curam, & Chironem aliquem, putâ periculosissimum chirurgum respectare videtur, vel quod à Chirone primò curata sit hæc ulceris species.

Telephium ulcus à *Telepho* nominis rationem accepit, qui ab *Achille vulneratus est*, cujus plagæ cum nulum satis efficax inveneretur remedium, & longo tempore affligeretur, tandem oraculo responsum est, fore, ut eadem hastâ, qua vulneratus erat, sanaretur. Reconciliatus itaque Achilli ab eo impetravit, ut ex hastâ, qua ictus erat subigine malagma conficeretur, & vulneri suo imponeretur: quo facto, ex tempore sanitatem esse consequutus. Est itaque Telephium ulcus, quod multum malignitatis præfert, & quod salutarem Achillis manum requirit.

Telephium ulcus idem esse cum chironio arbitramur; hoc enim dicitur tanquam Chironis ipsius operâ

ad sanitatem indigens, illud verò, quod Telephus in tali ulcere diutius perseverârît. Perperam putant aliqui chironium, & Telephium phagedænæ esse species, decipiuntur autem, cum phagedæna in erosionem consistat, & chironium, ac Telephium malignum, & contumax sit.

Phagedæna est ulceratus tumor, sive ulcus ambulativum, quod non tantum affectam carnem maximo cum dolore exedit, depascitur, corrodit, & excavat, verum etiam quasi dentibus partes adjacentes, & proximas exedendo depopulatur; propria labia in tumorem attollit, ipsumque durum, & veluti callosum, qui facilius in lupum, vel carcinoma degenerare solet, partemque totam putridis callositatibus, & excrescentiis desolat. Quò ad nominis rationem atinet, phagedæna græcè immanem comedendi appetitum designat similem ei, qui bolimum græci appellant, sive famem caninam omnia depascentem, hinc est, quod ad depascentia ulcera hæc vox quoque translata est. Distinguitur phagedæna ab herpete, quia licet in circumvicinas serpat partes, cutem nihilominus solam ambulando, & serpendo exulcerat: phagedæna verò unâ cum cute, quæ subiecta sunt, depopulatur.

Differt à lupo, quia ulcus hoc celerius carnes exedit, quàm phagedæna. Differt etiam ab aliâ ulcerum depascentium specie, quam græci *Noma* appellant, quod pascere significat; est namque. Noma ulcus, quod non solum cutem, verum etiam, & carnem erodit, qua ratione differt ab herpete, qui solam est carnem, Di-

stin-

tingitur Nome, quod in phagedenâ erosio est à malignâ qualitate, & humoris acrimoniâ carnes depascens absque ullâ putredine: in Nome præter carniû erosiones putredo conjuncta est,

Signa.

Horum ulcerum signa faciliè ex his, quæ diximus, innotescunt, ut aliis non indigeant signis, addimus tamen, quodd illorum labia sunt livida, tumida, & dolorosa. Cavitas quotidie crescit, quia continuò circumjacentes carnes absumuntur. Chironium in pede ut plurimum nascitur, alia in diversis corporis partibus evenire solent.

Causa.

Apud Galenistas horum ulcerum causæ sunt humores pravi, acres, biliosi, adusti, & præcipuè melancholici cum aliquâ atræ bilis portione admisti, qui originem ducunt ab aliquo viscere, vel à parte affectâ, putà intemperie calidâ, & siccâ laborante. Verùm causam materialem in hoc ulcerum genere melancholicum succum assignant vulgares, quia pertinacem, & remediis resistentem illum experiuntur: attamen in hujusmodi humorum fabulis passim confunduntur, eosque mutant secundum genii libidinem, & morborum proprietates.

Pro nostrâ sententiâ externæ horum ulcerum causæ esse possunt omnes, quæ generationi salium acidorum, atque lixivialium occasionem præbent, ut est aer præfervidus, ci-

D. Caroli Musitani Tom. II,

bus, & potus calidi, ira &c. Præterea medicamenta nimis acria ulceribus apposita, & diù continuata. Internæ sunt sanguis lymphæ cæterique succi talibus imbura salibus, quæ in partem ulceratam fluunt, ibi exaltantur, & ad ultimum exaltationis gradû evehuntur, & realgarinam nanciscuntur proprietatem. Hinc est, quodd ut plurimû hæc ulcera originem sumunt à malignis, erysipelatibus, aut abscessibus, vel vulneribus malè curatis, & præcipuè ob frigidorum topicorum applicationem.

Prognosis.

Omnia hæc ulcera perniciofa, rebellia, & incurabilia sunt cùm ratione febris, & aliorum symptomatum, quæ plerumque habent conjuncta, tùm quia acidissima, salia, & maligni illi succi, à quibus ortum ducunt, coctionem neutiquàm, ac perfectam admittunt suppurationem, tùm denique quia difficulter sanguis lymphæ, alique succi emendantur, & præsertim si ab inveteratis viscerum vitiis dependent: undè depascentia ulcera, nisi restè & maturè tractentur, non enim nunico obediunt medicamento, in cancrum, vel lupum degenerant, & post calamitosam, & invisam victam, exoptatam mortem causant.

Curatio.

In supradictorum ulcerum curatione vulgares talem victus rationem primo instituunt, ut humoribus

ad-

adversetur in corpore redundantibus, sunt autem isti acres, biliosi, adusti, melancholici, & attrahilarii, non quidem naturales, sed pravâ qualitate imbuti, idè tales præscribunt cibos, ut his refragari valeant. Intereâ humores peccantes cathartici evacuant, quæ illos respiciunt. Sanguinem exuperantem appositis podicis venis hirudinibus extrahunt; per has enim venas ineptè credunt sanguinem melancholicum eliminari. Ne in posterum hi pravi regenerentur humores, de ventriculo, hepate, & liene præcipuam habent rationem, idèdque ea quæ ventriculi imbecillitatem corrigunt, hepatis fervorem alterant, & lienis adustionem attemperant, exhibent, & quia impossibile est, ne amplius regenerentur, avertunt, duos aperiendo fonticulos, ut per horum apertionem, quasi per duos fontes pravi eliminentur humores.

Quæ affectam respiciunt partem, dupliciter discriminant, vel quæ ad ulcus attinent, vel quæ cum ulcere complicantur; non enim ulcus curari potest, nisi quæ præpediunt; exterminentur ac proindè primò averruncant. Undè si ulceris labia callosa sint, illa forcipe, vel novacula ad vivam usque partem abscindunt, vel causticis absumunt; sic enim laudabilis nutrimenti appositione caro præstantius nutritur, & durabilis inducitur cicatrix. Si inflammatio parti inducatur, refrigerantibus eam restingunt, ut unguento albo camphorato, albumine ovorum, oleo rosarum benè conquassatis, vel succo solani cum unguento albo *thapsi conjuncto*.

Postmodum ulcus detergunt aquâ calcis, aquâ aluminosâ, unguento diapompholygos, vel sequenti decocto adstringenti, ut

*℞. Herbar. plantag.
prunella,
bursa pastoris ana m. j.
flor. ros. rubr.
balaustior.
nucum cupressi ana ℥. iij.*

Decoquant in aquâ fabrorum, & acci partibus aequalibus, quo ulcus corrodens sæpè abluitur.

Vel sequens Unguentum ulceri admovent, ut

*℞. Resine pinl,
colophonias,
terebinth. ana ℥. iij.
pici navalis ℥. b.
cera citrina unc. ii. b.
ol. rosar. ℥. j.
ol. abietini ℥. iij.
semin. malvar.
Cardui stellati ana ℥. b.
terra Samæ,
sigillata ana ℥. j.
aloes hepatica ℥. iij.
corall. præp. ℥. vj.
sacch. opt. ℥. fl.
f. Ung. f. a.*

Hoc unguentum sine modificatione ulcus detergere, & concoquere putant. Vel tandem ulcus igni ætali tradit, & ablata malignitate, ac corrosione, aliorum more carne replent, consolidant, & cicatricem inducunt.

Horum ulcerum corrosivorum methodus curativa consistit imprimis in convenientis diætæ præscriptione, undè omnia acida, salsa, acris, saccharata, sive dulcia angue pejus vitentur; hæc enim ulceribus multum obervavimus, verum cibi omnes mul-

to fale volatili gaudentes usurpentur, ut particulæ acidæ, salinæ, acres &c. in corpore peccantes hujus salis beneficio cicizentur, & per urinam, vel sudorem exturbetur, & boni succi quantitas in affectum fluat partem. Pro potu uratur æger decocto *falsæ parisiæ*, vel *radicis china*, vel *falsæfras*, & si vinum bibat, sit oligotorum, & eodem decocto dilurum. Deinde magnam excrementorum copiam, quæ in corporibus talibus ulceribus affectis generatur, purgemus oportet per epicrasim. Cæterum inutilia, acnoxia sunt vulgarium purgantia, quia de communi morborum omnium, nec acidas, salas, acresque particulas per sedem eliminant, sed potius exagitant, exaltrantque; Mercurialia in his, aliisque ulceribus, estò non venereis, tùm internè, tùm externè maxime conducunt, & rectè usurpata, sunt veluti altera chirurgi manus, & mercurius dulcis in ulceribus nunquam nos defraudavit. Postmodò diaphoretica, & sudorifica, quæ sanguinem, succos, & lympham salinis, acidisq; particulis imbutos temperant, per cutem, universale corporis emundatorium, eliminant non desunt diuretica, vel alia negligantur, quæ passim descripsimus. Si qua imi ventris pars, ut hepar, pancreas, glandula mesentericæ, obstructa, vel alio modo affecta sint, appropriatis præsidis illius vitium aufertur debet. Si vermes, varices, ossis caries, aut simile curationis impedimentum adsit, medicaminibus propriis capitibus descriptis tollatur.

Tandem ad topica devenimus medicamenta, verum hæc nullam

mordicationem continere debent hujusmodi sint ex *Saturno parata*, quæ acidum infringunt, & salia obtundunt, nam tunc cum mordicant, & vehementer exasperant, ex eorum applicatione ulcera exasperantur, dolores concitantur, & ad multum tempus durant, inflammationes accensentur, febris inducitur, aut si adest, augetur, carnes liquefcunt, ulcera dilatantur, majora, & deteriora evadunt, ac sæpè in majora alia mala degenerant, ac propterea cautè procedendum est. Advertendum tamen est, quòd non perpetuò mitiora topica opportuna sunt, siquidem ad ulcera admodum rebellia, & maligna, velut etiam ad corpora robustiora valentioribus utimur, ad benigniora mitioribus; ad mediocria mediocribus. Hinc liquet, quantum errant nostrichirurgi gastrici, qui uno, eodemque medicamento hujusmodi ulcera curare, & ad cicatricem perducere putant. Neque hæc medicamenta fortiora, & mordicantia esse debent, ne ulcera recrudescant, sordescant, dilatentur, & in pejus ruant. Ast si humoris malignitas in exulcerato membro existentis tanta sit, ut prædicta respuat medicamenta, & continuò circumjacentes exedat partem, ad nostra suffumigia, & alia mercurialia deveniamus oportet, & ad ea, quæ in ulcere caneroso descripsimus, vel si hæc repudiat, ad ferrum, si tamen id permittat jus, ætas, membri præstantia &c. vel ad cauterizationem actualis ignis ope confagimus, juxta *Hip. ap. 6.*

ſell. 7. Quoscumque morbos medicamenta non ſanant, ferrum ſanat: quos ferrum non ſanat, ignis ſanat: quos verò ignis non ſanat, ſanari non poſſe putato: Vel hos incurabiles exiſtimari oportet.

Egimus hucusque illis de ulceribus, quæ ſparſim univerſum corporis habitum conſpurcare ſolent: nunc de illis verba faciemus, quæ propriâ obſignant ſedem, ac proinde ulcera à ſupremo capitis vertice ad ipſam pedis plantam, imò extremum ejus digitorum continuatâ ſerie, juxta noſtrum inſtitutum trutinare proſequemur, undè.

C A P. XXV.

De Tinea.

C Apillatam capitis partem præſertim puerorum ulcuſcuſcuſquamoſa cruſtoſa & ſetida, ejus cutē erodentia conſpurcare ſolent: Affectus hic tinea vocatur, & inter infantium morbos non tantum, ſed etiam paulo adultiorum refertur, & ſi quando quæ adulti hoc laborent morbo, ejus tamen rudimenta, & initia in ipſâ infantia contraxerunt. *Tinea* appellatur, eò quod, tinearum inſtar in veſtibus, capitis cutem atrodar, & corrumpat. Quo nomine hic affectus à Græcis fuerit appellatus, vix conſtat, certum tamen eſt ab iis hoc nomine non fuiſſe appellatum. Nonnulli cum tinea porriginem, achores, cru-

ſtam Laſteam, & favum perperam confundunt, nam *porrigo ſeu ſurfuratio* eſt ſcabies ſurfuracea cutis abſque ulceratione, & præſertim capitis. Hinc dicuntur ſurfuroſi, quibus aſſiduè ſquamulæ velut ſurfures peſtendo capite decidunt. *Arbores* ſunt manantia capitis ulcera, quæ ſunt in cute capitis, tenuiſſimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus ſanies effluit glutinoſa, notum mali genus, pueris adultioribus admodum familiare. *Cruſta laſtea, ſeu laſtumina*, ſunt ulcera cruſtoſa, albicantia, quæ infantibus Lactationis tempore accidunt, & non ſolum caput, & faciem occupat, ſed quandoque univerſam corporis cutem inquinat. *Favus*, græcè *ciria*, ſunt cruſtæ manantes ſubſtavi coloris, quæ unguibus ſcalptæ glutinoſam eruant ſaniem, à frigido aëre gummi inſtar in cruſtam ulteriorem concreſcentem; humani enim corporis ſucculentia non ſecus ac arborum ſuccus glutinoſus eſt, ac pariter in gummeum quid ab aëre indureſcit. Hic morbus infantibus admodum familiaris eſt ob plurimam eorum humiditatem, & pediculofitatem, quæ in conſtitutione calidâ & humidâ, ut & lumbrici uberitim proveniunt, & ſua infeſtatione ingentem excitat pruritum, undè ſcalptio, & malum augetur. Dicitur *favus* à favo, apum cellulis, & quia humorem mellis inſtar continet, & cutem foraminofam reddit favi inſtar, *favus* dicitur, ſed de his ſuſius in morbis puerorum agemus.

Diſſert tinea ab his capitis ulceribus

ut suprà notavimus, & præsertim à favo, quia hic plurimos alit pediculos, tinea verò nullos, sed omnes interimit, eò quod aciditas in hac est confirmata, & fixa, in illo verò leviter incipiens, & adhuc subdulcis, cujus exemplum etiam in caseo jam putrescere incipiente habemus, qui eandem ob causam magnam vermium copiam gignit, toto autem caseo in putrilaginem mollem resoluta, nulli amplius vermiculi in eo inveniuntur, aciditas enim fixa eos interficit. Verùm hæc de aciditate fixa ratio non militat, observamus namque in acerrimo aceto ope microscopij vermiculos, quo in tinea quoque observavimus tinearum instar, undè hic affectus nomen adeptus est, istique vermiculi oriuntur ex imperceptibilibus ovulis itidem microscopij ope detectis, & in capillis observatis, hi capillos corrodunt, & consumunt, eodem ferè modo ac erucæ arborum, fruticumque folia consumere solent.

Arabes pro tinea *Sabafati* nomen usurpant, quod secundum eorum descriptiones ulcusculis venereis multum convenire asserendum est.

Gregarij medici antiquorum traditionibus innixi, sex species distinctas ponunt, quibus tinea produci potest.

Prima est, quæ *favosa* dicitur, dicuntque ex phlegmate fieri falso, & est quoties ex subtilioribus foraminibus materia erumpit mellis similis.

Secunda *ficosa*, in qua quippiam simile sicuum granis contrahitur, quæ

que, est figuræ sphaericæ cum rubore.

Tertia est, quæ vocatur *amedæ*, & est cum ex tenuissimis foraminibus ichor effluit aquæ instar, in qua caro sit elota,

Quarta est, cum ulcuscula super planum cutis veluti papillæ mammillarum turgent, ichoremque eructant cruentum.

Quinta, quæ lupinorum & formam, & colorem representat, à qua quidem cortices squamarum candidarum, & aridatum instar decidunt.

Sexta dicitur *furfuracea*, maculas albas, & in furfures abeuntes producens, ex qua furfuracea desluunt corpuscula, interdum minutissima, aliquandò verò densiora.

Verùm non parum nos movere debet hæc scrupulosa distinctio, semper enim una, & eadem est tinea, licet recentior, vel diuturnior, formam nunc paulò aliter, atque aliter mutet.

Signa.

Tinea visu patet, & vulgo nota est; cutem enim capitis, & musculosam ejus substantiam ulcera quædam crustacea, & arida, modò viridia, modò cinerea infestant, è quibus parum, aut nihil saniei effluit, & quod emanat, foetidum est. Itæ pruritus satis molestus, dolorem mordicantem, & sætorem hoc malo laborantes patiuntur, ut ferè semper scalpere cogantur. Insuper tinea vermis instar capillorum radices putrefacit, vel erodit, & cutem exedit tam obliquate, ut à tenendo, & in-

& inherendo; quasi nomen adeptæ videatur.

Causæ.

Proximam tineæ causam vulgares putant esse humorem falsum, & acrena, sed jam in melancholiam degenerantem, quæ quidem primò ex sanguine materno, quo infans nutritus fuit, vel vitioso matris lacte ortum habuit postea verò temporis cursu, & morbi diuturnitate; & ægri negligentia, ut sæpè fit in pauperibus, in putridum, & prævum degenerat. Hic humor ad capitis cutem pulsus, inibi adhærens, ulcuscula generat, fovet, & conservat; siquidem ob sui imbecillitatem omnia excrementa, omnesque totius corporis superfluitates recipit, ut *cap. 6. lib. de causis morborum notavi Galenus*. Unde pravitatem, pertinaciam, habitualem intemperiem, affectionemque ab eo in capite impressam fovet. Item accidere potest hoc malum, quando quis nudato capite sub camino steterit, in quo succidiæ lardi fumantur; tales enim inter fumandum crebras guttas, partim ex superflua pinguedine propria, partim sale fumi resoluti constantes destillare solent, quæ si in puerorum, vel aliorum capita nuda cadant, tineam producere credunt, sed hoc est anile fabulamentum.

Tinea fit à nutrimento degeneratio in fibris cutis capitis, quod diuturniori morâ corrumpitur, & quia omnis corruptio ab acido incipit nutrimenti sal in acidum transit, &

ob moram corrosionem adipiscitur, & contagiosum redditur, quod vitium, cum profundius sit capillorum radicibus, depilationem quoque causat. In uno tantum à scabie differt tinea, quatenus scabies in cuius superficie vitium habet, tinea verò in cutis medietullio: est itaque tinea vera lepra particularis, capitis. Degenerat nutrimentum, corrumpitur, & in acido-salum transmutatur, vel ab externo miasmate, seu fermento, & per contagium facile in caput alioquin sanum hoc malum transplantatur, insinuatque, ut in infantibus observamus, dum capitis tegumenta, quibus tinea laborantes usi sunt, capiti suo imposuerunt, vel ob dormitionem in eodem lecto, vel quia eundem pectinem adhibuerunt, imò *Helmontius* tineosorum capillos tineas peperisse notavit; insuper tinea est adeò contagiosa, ut facile communicetur, & præsertim infantibus sanis, qui commercium habent cum hac labe infectis. Quandoque absque ullo contagio hoc malum infantes corripit, nimirum si crusta lactea, achores, & favi diù durent, aut tardè nimis, vel perpetuam curentur, in tineam transeunt. Vel producitur hoc malum à sanguinis materni pravitate, quæ infans in matris utero nutritus fuit, vel deinde vitioso nutritis lacte. Vel ex sordibus in capite neglectis, vel prava vivendi ratione, vel voracitate, à quibus pravi generantur succi, & habitus cacochymus. Hinc hæc affectio pueros, & præsertim pauperculos infestare solet. Addimus huic malo nimiam

capitis

capitis laxitatem, humiditatem, & imbecillitatem, & hac de causâ caput omnia humani corporis excrementa recipit, & quia imbecille, eliminare, vel resolvere nequit per sua emunctoria, capiti ulcera squamosa, & crustacea evenire necesse est.

Prognosis.

Omnia tineæ affecta contagiosa est, & curatu valde difficilis, facilius tamen curatur recens, & quæ ex humore flavo, & humida est, quàm sicca, vel pravi coloris: verum si recens sequitur tractetur, vel ejus curatio negligatur, vires acquirat eundo, sentim frontem, faciem, deinde totum corporis habitum conspurcat, & tandem in lepram transit. Diuturna difficillimè est curationis, & quò diuturnior fuerit, eò plus negotij curationi facessit, & ut plurimum circa collum adines protuberant. Rarò in confirmatâ tineâ capilli renascuntur, præsertim si cutis dura, & quasi testacea evaserit, & ad frictionem non rubeat; tunc enim ophiassim, vel alopeciam post sui curationem relinquit, & facit opprobrium sempiternum. Si cutis mollior sit, pororum vestigia appareant, & post frictionem rubere incipiat, indicium certum est caloris vegeti, & capillos renascituros fore. Si infantes tineâ corripiantur, vix curari possunt, antequàm ad eam perveniant ætatem, quæ medicamenta illa, quæ hoc malum exigit, & ipsas curationum molestias perferre possit.

Curatio.

In tineæ curatione vulgares primò pravorum succorum generem inhibent, ad quem finem non minorem obtinet locum victus ratio, quam ex optimis instituunt cibis, & abstinendum putant à cibis salis, acribus, ut alliis, cæpis, pisceis, brassicâ, carne suillâ, aliisque pravum succum gignentibus.

Deinde vitiosos humores in corpore redundantem, nè ad partem affectam transmittantur, primò præparant *styr. de sumar. simpl. infus. ros. rubr. cichor. lupul.* postmodum humores præparatos educunt *pilulis coctis, vel de lapide Lazuli*, vel in formâ potus ex *styr. de sumar. mai. ros. solut. cum confell. Hamech, & trochis. viperinis*, quæ medicamenta cathartica in curationis cursu, ne pravi regenerentur humores, & genii per alias vias eliminantur, per intervalla repetunt. Interea post totius corporis purgationem ad hepatis fervorem attemperandum, ejusdemque intemperiem corrigendam non parum probant *lactis servum*, in quo ebullierit *epistimum, radicle china decoctum, jura altorata, conservæ refrigerantes*. Post præscriptum victus regimen, & corporis purgationem, ad sanguinis missionem deveniunt ex cephalicâ ad quantitatem ægrotantis viribus, & ætati correspondentem. Hanc sanguinis, missionem ter, aut quater in anno plenilunij tempore ceterant, quia tunc sanguinem, ceterosque succos in

corpore perperam luxuriare credunt.

Quò ad topica ea usurpant medicamenta, quæ ulcuscula detergendi, attemperandi, & exsiccandi facultatem habent, sed primò crustas detrahunt medicamentis emollientibus, *huic scilicet malvarum folio decocto, ac contuso cum adipe suillo*, quæ emolliunt, & saniei exitum parant. Si ætas fortiora medicamenta, & curationis molestiam ferre possit ad valida detergentia confugiunt, ut

℞. Sulph. 3. j.

Sinap. 3. j.

Staphidis agræ,

radic. bryonia ana 3. j.

aceti acerrimi 3. j.

cerebinth 3℔.

ping. ursi q. s.

f. linimentum.

Vel recipiunt *nasturtium* terunt, & frigunt cum axungia porcinâ, & capiti cataplasmati instar imponunt, & 24. h. spatio crustam decidere facit, & si hoc cataplasma reiteretur, tineam sanat. Postmodum ad evacuandam materiam in cute imbutam, à qua ulcuscula conservantur, caput abluunt *decocto lupinorum, radicum althææ, fol. rute, flor. anethi cum panco aceto, vel aquâ aluminosa Fallopij.*

Quibus peractis, nostri chirurgastri capillis novaculâ abradunt, verum abrasi capilli ocyus excrescunt, & eorum radices infectæ non extirpantur, & hoc sædum malum nunquam eliminatur. V. Igares chirurgastri in *Incur. pileoli vesica*

ponunt, & aliquot diebus hære finunt, postea eo detracto, unâ capillos evellunt. Deinde capitis corium, quousque rubeat asperiori panno fricant, ut humores vitiosi altius latentes evocentur, & ad externa trahantur; tum demum scalpello, vel novaculâ pluribus in locis scarificant, ut vitiosus sanguis per cutem dispersus, educatur. Verum hanc scarificationem maximopere damnamus; relinquit enim post se cicatrices, in quibus impossibilis est capillorum regerminatio. His demum peractis, scarificatas partes, & totam capitis cutem *decocto lapathi, chamomille, cucumeris asinini fol. & radic. chelidonij, sem. lini, & fenugraci in lixivio dulciori parato* abluunt. Post lotionem detergunt, & exsiccant, & sequenti unguento obliniunt, ut

℞. Pulv. elleb. alb. &

sulph. vivi ana 3. ij.

flor. aris 3. ℔.

fulig. picis 3. ii. j.

ol. baccar. lauri 3. j. ℔.

ol. com. lb. ℔.

cera citrina q. s.

f. Ung. s. a.

Hoc unguento alternis diebus utuntur, donec crustæ removeantur, & cutis sana appareat. Verum si tineæ inveterata sit, & his non cedat præsidio, ablationes, fricationes, & scarificationes reiterant, quousque sanata appareat.

Aliqui chirurgastri pro tineæ curatione utuntur *arsenico, auripigmento, mercurio vivo hominis jejuni salivâ* unctis, & medicamentis admixto, caput suffumigant *cinnabari*. Cæterum arsenicum, & auripigmentum venenata sunt, & vitæ nostræ infensa,

ac cum locus affectus cerebro proximus sit, vix usurpanda sunt, ne venenum cerebro communicetur, è quo postea dolores implicabiles, contoliones, inflammationes exitialis febris acuta & mali moris, vel ipsa mors sequatur. Mercurius quoque tam sublimimenti, quam fumi formâ intra caput ingreditur, & suâ qua maximè penetrandi energiâ pollet, in minimas ejus qualque partes affatim se insinuat in ossa non solum ulque sed etiam in cerebrum, & medullas, ac variorum symptomatum vehementiam excitat.

Nonnulli chymicaltri huic sædo malo curando arsenici oleum adhibent; inquiunt enim hoc oleum esse omnium ulcerum contolivorum mors, eorumque malignitatem, & contolionem extinguere, sed an potius ulcerum corrosivum, quàm ulcerariorum mors sit, nescimus. Huic oleo tantum aquæ scabiose stillatitiæ addunt, utâ linguâ ejus sapor tolerari possit, quo tineam quotidie bis inungunt, per aliquod tempus continuando. Alii balsamo mercurii, vel oleo antimonii rubro utuntur permixto cum oleo vitellorum ovorum, vel amygdalarum dulcium, vel oleo sulphuris vel visrioli aquâ plantaginis diluto, ac post abstersionem caput abluunt bis in die balsamo tarsari per quatuor aut quinque dies, & postremò oleo ex ovorum vitellis cicatrizant. Verùm hæc medicamenta acida sunt, & potius malum augere, quàm curare possunt.

Indicatio tinea curativa est, ut vitium in cutis profundo cottigatur, eodem ferè modo ac in scabie, attamen differre à tineâ scabies, quia hæc in cutis superficie, illa verò in cutis mediuillio initium habet: ceterùm quia multo vius vitium illud in capitis cute adeò

Caroli Musitani Tom. II.

profundum non est, nam ut nobis cuncties tineas curare contingit, iisdem remediis, quæ pro scabiei curatione tradidimus. Si itaque morbus alias non fixerit radices, ea medicamina per os proponamus, quæ pro scabiei curatione descriptimus, ac deinde ulculcula aquâ sublimati ittoramus, vel frequenti unguento Nicotianæ inungimus ut

℞. fol. nicotiana lib. ij.

ping. porci recentis diligenter lota lib. i.

Hæc herba per noctem in vino rubro maceretur, manè igne lento cum pinguedine bulliat ad vini consumptionem, postea coletur, & exprimatur. Huic expresso adde succi nicotianæ depurati lib. ss. resina abietis ℥. 4. coquantur ad succi consumptionem, quibus circa finem adde,

radic. arist. ros. subitir. pulv. ℥ij. cere nova q. s.

f. ung.

Hoc inunge ter, quoties, & ad plurimum sexies, & per viginti dies curam expecta, quam si obtinebis, gaude, sin minus ad hæc quæ sequuntur, transeundum est, quæ tineas radicibus curari cum capillorum renascentiâ.

Capillos omnes à capite novaculâ abrade, deinde leni lixivio calido quicquid furfuraceum, vel purulentum, est, absterge, postea totum caput frequenti unguento inunge semel in die, usque dum tinea curata est, quod cursu viginti dierum evenire solet, ut

℞. Succ. chelidonia, & ol. veteris ana ℥. j. b.

Simul bulliant ad consumptionem tertia pars tunc adde

viridis aris ℥. b.

sulphuris ℥. v.

cera ℥. b.

Simul bulliant parùm, optime commisit.

cendo omnia, auferatur vas ab igne & momento adde ol. juniperi, paulatim agitando illud, diem frigidum factum sis, & utere. Vel hoc alio uti poterimus, ut.

*℞. ol. ros. &
junip. ex ligno elicisi ana 3vj.
sulphuris vivi,
stercoris columb. ni,
viridis aris ana 3℔,
cera q. s.
f. ung.*

Si inveterata sit tinea, & altas fixerit radices, facilliter descripta medicamenta omnino illam eradicare non poterunt, quod ex morbi pertinaciâ cognoveris, nec capillorum ablatio quicquam proderit, cum eorum radicibus infectio hæreat, tunc ea convenienti medicamento, quæ partis nutrimentum in particulas acido salis degeneratum ciculant, nitrigunt, & depurant, ne cutem amplius exedant, & malignitate inficiant. Deinde quæ ipsi glutinosum incidunt, & subtiliant, ut tenues evanesceant in auras, ac tandem abstergunt, & sic partem affectam in statum naturalem restituunt, ejusque consolidationem promovent.

Hæc medicamenta duplicis sunt generis, alia interna, alia verò externa. Interna sunt purgantia, & ea propinare possumus, quæ in scabiei curâ descriptissimus, attamen cum contagium in cutis medullio profundius hæreat, ut plurimum externa sufficere posse existimamus. Inter interna abso bentia connumeramus, ut *sal volatile urinarum c. c. launbricorum, diaphoretica, ut sibi.* sulphur auratum &c.

Per externa curatio obtinetur illinendo, vel alio modo medicamentum applicando, quæ quoscunque acutes, af-

peritates exoticas, & corruptiones destituunt, ita est *se. m. t. s. r. p. d.* & quæ sulphur continent; unde *oleum tarsi* *p. d.* *spongia crassius applicatum* nunquam nos fefellit, *oleo Laurino cum sulphure* multo, curavimus, & *balsamum sulphuris* omnibus palmam præcipit.

Optima sunt hæc medicamenta, sed non semper semper felicem consequuntur effectum, quia contagij fomes non in cure, vel panniculo carnosum, sed in pericranij medullio stabulatur, ad quod medicamentorum energia non collimat: alia igitur vestiganda sunt, quæ necessariò suum sortiantur effectum, aliàs esset operam, & oleum perdere.

Habemus nos infallibile, & expertum remedium, quod nunquam nos fefellit, & multos pueros origine claros ab hoc spurco malo eripimus, quos non recensemus, ut eorum æstimationem tueamur. Hinc charitas erga teneosos nos suadet, ut hoc nostrum medicamentum sine invidiâ communicemus, illinc vulgare hebetudo, & temeritas, ne margaritas ante hos porcos projiciamus, nobis remoram imponit ut illud silentio involuamus, attamen prævaleat charitas & illud ingenuè communicamus, ut chirurgastri confundantur, & pereant.

Primo itaque teneosus catharticus, quibus in scabie utimur, purgetur & hoc ut domesticorum patientis morem à vulgaribus insitum geramus, potest tamen omitti purgans, cum malum sit topicum, & topica exigat medicamentum. Deinde sensim evellantur capilli, nontamen vossellâ, nam potius sumuntur, & eorum radices non eradicantur, sed si fiat instrumento ferreo à nobis excogitato post quorundam evulsionem,

eodem instrumento crassa abradantur, & sequenti linimento penicillo illiniantur, ut.

℞ ol. tuffinum ℥. iij.

cera citrina q. s.

fiat massa unguenti mollis instar, super calidos cineres.

Oleum Bufonum in nostrâ Pyrotechniâ lib. 5. cap. 1. art. 3. descriptissimum, ut.

℞ Bufones. iij. vel. iv.

Purgentur in ollâ, cujus fundum multis foraminibus sit pervium, & in ore suum imponatur operculum per quatuor, vel quinque dies. Inde olla nona vitriata, quibus supersunde olei olivarum lib. v. vel. vj. Clude vas, ne quid expiret, bull in aperto loci, lento carbonum igne per sex horas. Permite vas sponte refrigerari, aperi, decanta & ad usum serva. Post modum bis in hebdomadâ caput sequenti decocto abluatur, & pannis exsicceetur, ut.

℞. Aq. bord. q. s. in qua ebulliant

scabiose,

adianthi,

roris marini,

malvarum,

salvia,

Lavendule ana m. j.

flor. ros. rubr. incomplet. p. j.

Hoc decoctum quoties adhibendum est, recens fiat. Diebus à Lotione vacuis, superadicto linimento caput illinatur, donec renati capilli ferreo instrumento iteratò evellantur. post quorum avulsionem ad abluiones, & illiniciones alternatim recutimus. Ter capillos evellimus radicibus corruptos, sanis remanentibus, & tinea quantumvis inveterata & rebellis his nostris præsidijis non reluctabitur. Verum enim verò, ut veritatem ingenuè fateamur, pro huius spurci morbi curatione sufficit ca-

pillorum evulsio, & quodcumque vulgare topicum ad hunc suum paratum. Verùm si tinea sicca sit, tunc humectantibus tractetur præsidijis, & non agrè cedit.

CAP. XXVI.

De Aurium dolore.

A Capite ad auditus organum, tanquam partem ipsi proximiorē descendimus, & juxta nostram methodum tantum de aurium ulcete tractare deceveramus, sed quorundam amicorum suasionibus, quibus libenter auscultamus, cohortati sumus, ut de omnibus aurium morbis in Galenistarum gratiam ageremus, qui surdastri, ut erat *Marcus Crassus*, veram non hauriunt sapientiam, & quod pejus, malè audiunt, & nisi resipiscant, muti evadent. Hinc.

Gravissimum, & periculosum malum est *otalgia*, hoc aurium dolor, qui nisi statim sederet, graviora excitabit symptomata & agrum extingnet. Aurium dolor est affectus oculorum dolor! gravior, quia oculorum dolor in oculis tantum persistit, aurium verò facile cerebro impertitur, undè insomnia, deliria, convulsiones, syncope, apoplexiæ, & tandem mors.

Quinque sunt dolorum species, & partim ex partis affectæ naturâ, & partim à causis delumuntur: Gravis, sensibilis, stimulan, punctorius, & pulsabilis. Omnes hæc species & qualescunque adhuc inveniri possent, ferè simul in atroci aurium dolore concurrere, ita ut simul & semel dolor atrociter gravas, pūgēs, lancinans, stimulan, & pulsas excusceat, & id tā excessivâ acerbitate, ut

sæpè æger in magno vitæ discrimine
vescitur, ut Hippocrati præfag. innuit: *Auris
dolor, cum febre non intermitte, ve-
mentique, grave periculum minatur,
nam & mentem turbat, & hominem
rapit.*

Signa.

Ad aurium dolorem cognoscendum
non opus est signis, cum ex ægri rela-
tione patescant; causarum verò signa,
quæ varia esse solent, tantum recensere
oportet. Primum itaque diligenter in-
quirere debemus, an aliquid dolorem
efficit, de foris auri immissum sit,
quod ex ægri relatione, auris inspec-
tione, & exploratione patet, an auri
vulnus in fluctum sit, vel alia illi violentia
illata sit, & id quoque ex ægri rela-
tione manifestum esse potest. Si occa-
sionalis causa fuerit aer frigidior, vel
Boreæ status, tum etiam ex ægri con-
fessione patescit. Si oriatur à spiritu
flatulento, dolor est vehemens cum
rinnitu & strepitu manifesto apud
ægrotum, & dolor non est assiduus,
sed per intervalla recurrit. Verum fre-
quentissima doloris causa est inflam-
matio, cujus signa *Tomo 1. de Tumori-
bus cap. 42. De Aurium inflam-
matione*, proposuimus: Si ex ulvere, fit reten-
tâ sanie. Si ex nervi auditorii vicio, læ-
ditur auditus.

Causa.

Galenus sectatores doloris aurium
causam continui solutioni refundunt,
ut sunt sanies, sordes, vermes, exter-
na illapsa, ut capilli, ossicula, item me-
dicamenta incongrua, sonitus, vel
strepitus vehemens, & horribilis, to-
nitru, tormenti bellici explosio, & id

genus alia, quæ continui solutionem
inferunt, & tristem sensationem. Vel
calidam vel frigidam causant intempe-
riem, ut est magnus calor, frigus,
ventorum, pluviarum &c. appulsus,
qui naturalem aurium unitatem solve-
re possunt. Verum hæ causæ tantum
remoræ, & occasionales esse possunt,
non verò proximæ, & immediatæ, ut
filius explosimus in nostrâ *Tympana* de
capitis dolore.

Vera aurium doloris causa oritur à
particulis sulphureis, acidis, salinis,
vel à quopiam alio id genus internæ
aurium fibras nervosas, membranotas,
& musculosas distendente, divellente,
contrahente, vellicante, vel à materia
peregrinâ, quæ fibrosas aurium par-
tes divellit, spasmosque dolorificos in
iisdem excitant; internæ namque au-
rium partes exquiritæ gaudent sensu.
Quandoque partes externæ dolore ten-
tantur, verum cum dolor hic non sit
magnus, de eo non agimus, sed de eo
qui internum meatum, membranas,
& nervum auditorium obsidet.

Prognosis.

Vehemens aurium dolor in juveni-
bus valdè periculosus est; seprimo
namque die, vel citius moriuntur, quia
facile cerebrum in consentum rapit, &
gravissima excitat symptomata, inter-
num scilicet erysipelas, febrem acutam, in-
somnia, delirium, convulsionem, lipo-
thymiam, & mortem. Senes autem in
vehementibus aurium doloribus minus
periclitantur, quia frigidum habent
corpus, ideoque vehementi inflamma-
tione, febribus acutis, & deliriis non
ita facile corripuntur; sensus etiam
tactus in senibus est obtusior, ideo diu-
tius illos ferunt dolores, unde apud
illos

illos facilius materia aurium dolorem efficiens, in suppurationem abit. Recidiva tamen periculum subeunt senes, cum materia dolorem excitans non bene concoqui possit ob frigidam constitutionem. Si vehemens sit aurium dolor, & in penetrabilibus hæreat, mortem portendit, significat enim auditorium nervum affectum. Aut si morbus curetur, auditus gravitatem, vel surditatem relinquit.

Curatio.

Galenī procuratores aurium dolorem curant, aufertendo causas, à quibus dolor ipse fovetur, quod si virium resolutio immineat propter doloris vehementiam, & tempus non suppetit pro sedantium exhibitione, extempio humorum colluvie corpus depleat, præmissis internis, deinde externis frictionibus, cucurbitulis, scarificationibus, & enematum injectionibus. Pro frigida intemperie in aures instillant *oleum amygdalar. amararum, aneth. chamomel. croci.* Vel decolli *caryophyllor. aromaticor. in vino rubro gutta dua,* vel tres tripidè in aurem instillant, deinde *caryophyllo* costò aurem obturant. Vel *capa excavata in medio* indunt *parum euphorbij, & oleum commune, illamque super prunis ponunt ad olei ebullitionem,* quod repidè in aurem instillant. Vel in uno, aut pluribus ex prædictis oleis coquere solent *sumpficum, stœcad. rorem marinum. Lavendulam, castoreum, crocum &c.* & in aurem instillant. Vel forum ex quatuor anodynīs applicant.

In calidà intemperie affectæ parvis venam secant, solutà prius alio stylicoribus, *lac sepidum* dolenti immittunt auri, cui quandòque *ovi visellum* im-

miscent. Vel *oleum amygdal. dulc. aut rosaceum* guttatim instillant. Vel decocto *malu. alib. viol. bord. fœnu grac.* Vel *cataplasmate de micâ panis* locum foveat.

Si auri dolor ex flatibus exciteur, illum discutientibus, & carminantibus sedant, fomento scilicet *furfuris, milii, salis, arisi, vel sacco flor. chamom. nuc. mosch. caryophyll. masis* repleto, & imposito, vel auri immittunt *Zibethum, moschum, crocum, castoreum &c.*

Si dolor ità perseveret, ut vires prosternantur, ad narcotica confugiant pro partis sensus hebetatione, ad quem finem *Philon. Romanum, succum mandragoræ cum castoreo, iberiacâ, Alibridatio, & opio* usurpant.

Dolor si gravior, & diuturnior fuerit, vesicatorium in nucâ applicant, cui si reluctetur, Setaceum inter secundam, & tertiam vertebrae excitant, vel tandem fonticulos aperiunt, & demittunt.

Aurium dolor tripliciter aufertur, primò iis, quæ doloris causam tollunt, Secundò anodynīs, quæ doloris causam consopiant, æquabilem reddunt, & leniter ratefaciunt; tertio Narcoticis, quæ dolorem sedare, & pacare valent, & id non per molestantis causæ ablationem, sed quia doloris sensationem obstupefaciunt, soporem inducendo, à quo ferè omnia mala sedantur. Dolor vehementissimus narcoticum, & minor anodynum indicat.

Undè si à rebus extraneis intra aurem immixtis pendeat tollendæ sunt. Itaque si sint vermes in auri geniti, vel foris ingressi, ad hos enecandos, & extrahendos magnopere valet *oleum philosphorum* guttatim instillatum, vel *unguentum ex capi axungia, & oleo co-*

ryli cum paucis mercurio dulci mistum, gij. roris marini, succini &c.
ne

℥. Annungia capi 3 ss.

ol. coryli gnti. xv.

merc. dulc. gr. xv. m.

& in aurium orificio cum gossipio ponatur. Vel *sulphuris fumus* per infundibulum exceptus, deinde enecati auriscalpio extrahendi sunt. Si pulices sunt, qui in aure vagantes, ingentē strepitū aures percipere faciūt eosque ut vulgares statim adhærescere naturaliter ipso duto auribus fasciculo ex pilis caninis, & sic extrahi. Si aqua in aurem illapsa sit, inclinato capite, rursus effluere sinatur, vel per calamum ipsa exsugatur.

Si à spiritu flatulento dolor sit, cum flatus materiam præsupponat, à qua elevatur, ea primò expurganda est. postmodum discutienda *aliqua essentia nucia myristica, anisorum, corisauri aurantiorum, sampsoci, roris marini, bac. inniperi &c.*

Si doloris causa sit inflammatio, quæ ratione curanda est, diximus *Tomo i. de tumoribus p. n. cap. 42.*

Si ex membrana perfrigeratione, ab inspiratâ aërâ gelidâ, à ventorum afflatu oriatur dolor, instillantur olea calida, ut *oleum essentiale laurinum, de castoreo, destillatum, essentiale pule-*

Si dolor sit mitior, tollitur anodynus, quæ leniter rarefaciendo, & contracturam leniendo, doloris causam consopiant, & ita erunt *oleum amygdal. dulc. litor. albor. cum lacte muliebri*, quæ cum specillo molli lanâ involuto tepidè in aurem immittantur. Utile est *oc. ros. cum roris marini succo, ni & muciago sem. psyllij, fenugraci*. Item solis *Nictiana viridis, vel etiam exsiccata, sed iterum humectata*, mirificè profuit. Magnoperè dolorem pacant *quatuor anodyna in hydroleo*, si auris affecta calidè spongiâ foueatur, vel eorum vapor in aurem excipiat. Sequentem solum multoties profuisse experti sumus, ut.

℥. Radie. Lillor.

alib. cum toto:

fol. malu.

viol. ana m. j.

Sem. cydon.

malu. &c.

lini ana 3. iij.

flor. ros. rubr.

chamomill. &

anethi ana p. ij.

f. decoctio.

quæ auris frequenter foueatur. Sed sequens vapor vehementissimum auium dolorem semper pacavit, ut

℥. fol.

℞. fol. roris marini,

Sampfuci.

betonice ana m. j.

flor. ros. rubr.

mellissi, ℥

chamomill. ana p. j.

Sem. Cini, ℥

foenugrac. ana p. ℥

fiat decoctio pro vapore excipiendo.

Oleum etiam è ligno coryli acerbissimos aurium dolores statim sedat.

Ubi tandem aurium dolor est acerbissimus, quia delitij, convulsionis, syncopes, & mortis imminet periculum, ad narcotica confugiendum est, quæ dolorem percipi non faciunt, vitam sopiendo, quæ est immediata causa doloris, talia erunt *Laudanum opiatum*, vel vulgaria, ut *Requies i Nicolai*, *Philonium Romanum*, *Persicum*, *pilul. de cynoglossa* &c. Sequens decoctio narcotica in formâ fortis, vel vaporis miraculi adinstar quoscunque aurium dolores extemplo sedat, ut

℞. fol. la Tuca,

nymphae.

solani,

hyoscyami, ℥

mandragoræ ana m. j.

capisa papav. num. iij.

f. decoctio.

qua auris frequenter soveatur, vel vaporetentis in affectu recipiatur, aures.

Cave, ne intra aurem liquorem instilles aliquem, qui opium exceperit, quia licet dolorem sedes, alia deteriora mala excitabis.

C A P. XXVII.

De i Aurium Ulcere.

VT ulcera alijs corporis partibus, sic quoque auribus vel per abscessu, vel per alicujus liquoris acrimoniam evenire possunt, quorum curatio peculiaris est.

Signa.

Aurium ulcus ex sanie, vel sanguine egrediente cognoscitur, ut accidit in suppuratâ aurium inflammatione, in qua primò satis in magnâ copiâ exit, deindè paulatim fluit, donec sponte cesset. Ulceris aurium signa sunt, dolor, ardor, vehemens punctio, quæ tactu exacerbatur, saniei fluxus, & interdum sanguinis. Si ulcus sit in nervo auditorio, acerbissimus adest dolor, vel præcessit. Vlcus profundum copiosam sanie, sed lentè emittit; & undum laudabilem; sordidum crassam; virulentum citrinam & tenuem, putridum foetentem; corrosivum sanguinem post sanie emittit; fistulosum ex sanie virulentâ, carnis callositate, & duritie, postea tandem

scil. 7. Quoscumque morbos medicamenta non sanant, ferrum sanat: quos ferrum non sanat, ignis sanat: quos verò ignis non sanat, sanari non posse putato: Vel hos incurabiles existimari oportet.

Egimus hucusque illis de ulceribus, quæ sparsim universum corporis habitum conspurcare solent: nunc de illis verba faciemus, quæ propriâ obsignant sedem, ac proinde ulcera à supremo capitis vertice ad ipsam pedis plantam, imò extremum ejus digitum continuatâ serie, juxta nostrum institutum trutinare prosequemur, undè.

C A P. XXV.

De Tinea.

Capillatam capitis partem præsertim puerorum ulcusculasquamosa crustosa & foetida, ejus cutē erodentia conspurcare solent: Affectus hic tinea vocatur, & inter infantium morbos non tantum, sed etiam paulo adultiorum refertur, & si quando quæ adulti hoc laborent morbo, ejus tamen rudimenta, & initia in ipsâ infantia contraxerunt. *Tinea* appellatur, eò quod, tinearum instar in vestibus, capitis cutem atrodāt, & corrumpat. Quo nomine hic affectus à Græcis fuerit appellatus, vix constat, certum tamen est ab iis hoc nomine non fuisse appellatum. Nonnulli cum tinea porriginem, achores, cru-

stam Lacteam, & favum perperam confundunt, nam porrigo seu fursuratio est scabies fursuracea cutis absque ulceratione, & præsertim capitis. Hinc dicuntur fursurosi, quibus assidue squamulæ velut fursures pestendo capite decidunt, *Achores* sunt manantia capitis ulcera, quæ fiunt in cute capitis, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus sanies effluit glutinosa, notum mali genus, pueris adultioribus admodum familiare. *Crusta lactea, seu lactumina*, sunt ulcera crustosa, albicantia, quæ infantibus Lactationis tempore accidunt, & non solum caput, & faciem occupat, sed quandoque universam corporis cutem inquinat. *Favus*, græcè ciria, sunt crustæ manantes subflavi coloris, quæ unguibus scalpæ glutinosam eruant saniem, à frigido aëre gummi instar in crustam ulteriorem concretescentem; humani enim corporis succulentia non secus ac arborum succus glutinosus est, ac pariter in gummeum quid ab aëre indurefcit. Hic morbus infantibus admodum familiaris est ob plurimam eorum humiditatem, & pediculositatem, quæ in constitutione calida & humidâ, ut & lumbrici ubertim proveniunt, & suâ infestatione ingentem excitat pruritum, undè scalptio, & malum augetur. Dicitur favus à favo, apum cellulis, & quia humorem mellis instar continet, & cutem foraminosam reddit favi instar, favus dicitur, sed de his fusiùs in morbis puerorum agemus.

Differt tinea ab his capitis ulceribus

ut suprâ notavimus, & præsertim à favo, quia hic plurimos alit pediculos, tineâ verò nullos, sed omnes interimit, eò quod aciditas in hac est confirmata, & fixa, in illo verò leviter incipiens, & adhuc subdulcis, cujus exemplum etiam in caseo jam putrescere incipientem habemus, qui eandem ob causam magnam vermium copiam gignit, toto autem caseo in putrilaginem mollem resoluta, nulli amplius vermiculi in eo inveniuntur, aciditas enim fixa eos interficit. Verùm hæc de aciditate fixâ ratio non militat, observamus namque in acerrimo aceto ope microscopij vermiculos, quo in tineâ quoque observavimus tinearum instar, undè hic affectus nomen adeptus est, istique vermiculi oriuntur ex imperceptibilibus ovulis itidem microscopij ope detectis, & in capillis, observatis, hi capillos corrodunt, & confumunt, eodem ferè modo ac erucæ arborum, fruticumque folia confumere solent.

Arabes pro tineâ *Sabafati* nomen usurpârunt, quod secundum eorum descriptiones ulcusculis venereis multum convenire asserendum est.

Gregarij medici antiquorum traditionibus innixi, sex species distinctas ponunt, quibus tineâ produci potest.

Prima est, quæ *favosa* dicitur, dicuntque ex phlegmate fieri falso, & est quoties ex subtilioribus foraminibus materia erumpit mellis similis.

Secunda *ficsa*, in qua quippiam simile sicum granis continetur, quæ

que, est figuræ sphaericæ cum rubore.

Tertia est, quæ vocatur *amedâ*, & est cum ex tenuissimis foraminibus ichor effluit aquæ instar, in qua caro sit elota,

Quarta est, cum ulcuscula super planum cutis veluti papillæ mammillarum turgent, ichoremque eruant eruentum.

Quinta, quæ lupinorum & formam, & colorem representat, & quæ quidem cortices squamarum candidatum, & aridarum instar decidunt.

Sexta dicitur *furfuracea*, maculas albas, & in fures abeuntes producens, ex qua furfuracea defluunt corpuscula, interdum minutissima, aliquando verò densiora.

Verùm non parum nos movere debet hæc scrupulosa distinctio, semper enim una, & eadem est tineâ, licet recentior, vel diuturnior, formam nunc paulò aliter, atque aliter mutet.

Signa.

Tineâ visu patet, & vulgo notum est, cutem enim capitis, & musculosam ejus substantiam ulcera quædam crustacea, & arida, modò viridia, modò cinerea infestant, è quibus parum, aut nihil saniei effluit, & quod emanat, foetidum est. Itâ pruritus satis molestus, dolorem mordicantem, & fetorem hoc malo laborantes patiuntur, ut ferè semper scalpere cogantur. Insuper tineâ vermis instar capillorum radices putrefacit, vel erodit, & cutem exedit tam obstinatè, ut à tenendo, & in-

& inhzendo ; quali nomen adepta videatur.

Causa.

Proximam tineæ causam vulgares putant esse humorem salsum , & acrem , sed jam in melancholiam degenerantem , qui quidem primò ex sanguine materno , quo infans nutritus fuit , vel vitioso matris lacte ortum habuit postea verò temporis cursu , & morbi diuturnitate ; & ægri negligentia , ut sæpè fit in pauperibus , in putridum , & prævum degenerat. Hic humor ad capitis cutem pulsus , inibi adhærens , ulcuscula generat , fovet , & conservat ; siquidem ob sui imbecillitatem omnia excrementa , omnesque totius corporis superfluitates recipit , ut *cap. 6. lib. de causis morborum notavi Galenus*. Undè pravitatem , pertinaciam , habitua-lem intemperiem , affectionemque ab eo in capite impressam fovet. Item accidere potest hoc malum , quando quis nudato capite sub camino steterit , in quo succidiæ lardi fumantur ; tales enim inter fumandum crebras guttas , partim ex superfluo pinguedine propria , partim sale fumi resoluti constantes destillare solent , quæ si in puerorum , vel aliorum capita nuda cadant , tineam producere credunt , sed hoc est anile fabulamentum.

Tinea fit à nutrimento degeneratio in fibris cutis capitis , quod diuturniori morà corrumpitur , & quia omnis corruptio ab acido incipit nutrimenti sal in acidum transit , &

ob moram corrosionem adipiscitur , & contagiosum redditur , quod vitium , cum profundius sit capilogum radicibus , depilationem quoque causat. In uno tantum à scabie differt tinea , quatenus scabies in cutis superficie vitium habet , tinea verò in cutis medullis : est itaque tinea vera lepra particularis , capitis. Degenerat nutrimentum , corrumpitur , & in acido - salsum transmutatur , vel ab externo miasmate , seu fermento , & per contagium facillè in caput alioquin sanum hoc malum transplantatur , insinuatque , ut in infantibus observamus , dum capitis tegumenta , quibus tinea laborantes uti sunt , capiti suo imposuerunt , vel ob dormitionem in eodem lecto , vel quia eundem pedinem adhibuerunt , imò *Helmontius* tineosorum capillos tineas peperisse notavit ; insuper tinea est adeò contagiosa , ut facillè comunicetur , & præsertim infantibus sanis , qui commercium habent cum hac labe infectis. Quandoque absque ullo contagio hoc malum infantes corripit , nimirum si crusta lactea , achores , & favi diù darent , aut tardè nimis , vel perpetuè curentur , in tineam transeunt. Vel producit hoc malum à sanguinis materni pravitate , quæ infans in matris utero nutritus fuit , vel deinde vitioso nutritis lacte. Vel ex sordibus in capite neglectis , vel pravà vivendi ratione , vel voracitate , à quibus pravi generantur succi , & habitus cacochymus. Hinc hæc affectio pueros , & præsertim pauperculos infestare solet. Addimus huic malo nimiam capitis

capitis laxitatem, humiditatem, & imbecillitatem, & hac de causâ caput omnia humani corporis excrementa recipit, & quia imbecille, eliminare, vel resolvere nequit per sua emunctoria, capiti ulcera squamosa, & crustacea evenire necesse est.

Prognosis.

Omnis tineâ affecta contagiosa est, & curatu valdè difficilis, facilius tamen curatur recens, & quæ ex humore flavo, & humida est, quàm sicca, vel pravi coloris: verum si recens sequitur tractetur, vel ejus curatio negligatur, vires acquirat eundo, sentim frontem, faciem, deinde totum corporis habitum conspurcat, & tandem in lepram transit. Diuturna difficillimè est curationis, & quò diuturnior fuerit, eò plus negotij curationi facessit, & ut plurimum circa collum adines promberant. Rarò in confirmatâ tineâ capilli renascuntur, præsertim si cutis dura, & quasi testacea evaserit, & ad frictionem non rubeat; tunc enim ophiassim, vel alopecia post sui curationem relinquit, & facit opprobrium sempiternum. Si cutis mollior sit, pororum vestigia appareant, & post frictionem rubere incipiat, indicium certum est caloris vegeti, & capillos renasci: utros fore. Si infantes tineâ corripiantur, vix curari possunt, antequàm ad eam perveniant ætatem, quæ medicamenta illa, quæ hoc malum exigit, & ipsas curationum molestias perferre possit.

Curatio.

In tineâ curatione vulgares primò pravorum succorum genesim inhibent, ad quem finem non minorem obinet locum victûs ratio, quàm ex optimis instituunt cibis, & abstinendum putant à cibis salis, acris, ut alliis, cæpis, piscis, brassicæ, carne suillâ, aliisque pravum succum gignentibus.

Deinde vitiosos humores in corpore redundantes, nè ad partem affectam transmittantur, primò præparant *syrr. de fumar. simpl. infus. ros. rubr. cicbor. lupul.* postmodum humores præparatos educunt *pilulis coctis, vel de lapide Lazuli*, vel in formâ porûs ex *syrr. de fumar. mai. ros. solut. cum confell. Hamech, & trochis. viperinis*, quæ medicamenta cathartica in curationis cursu, ne pravi regenerentur humores, & geniti per alias vias eliminantur, per intervalla repetunt. Interea post totius corporis purgationem ad hepatis fervorem attemperandum, ejusdemque intemperiem corrigendam non parum probant *lactis servum*, in quo ebullierit *optimum, radicle china decoctum, jura alterata, conservæ refrigerantes*. Post præscriptum victûs regimen, & corporis purgationem, ad sanguinis missionem deveniunt ex cephalicâ ad quantitatem ægrotantis viribus, & ætati correspondentem. Hanc sanguinis, missionem ter, aut quater in anno plenilunij tempore reiterant, quia tunc sanguinem, cæterosque succos in

corpore perperam luxuriare credunt.

Quò ad topica ea usurpant medicamenta, quæ ulcuscula detergendi, attemperandi, & exsiccandi facultatem habent, sed primò crustas detrahunt medicamentis emollientibus, *huic scilicet malvarum folijs decoctis, ac contusis cum adipe suillo*, quæ emolliunt, & saniei exitum parant. Si ætas fortiora medicamenta, & curationis molestiam ferre possit ad valida detergentia confugiunt, ut

℞. Sulph. 3.ij.

Sinap. 3.j.

Staphidis agria,

radic. bryonia ana 3.j.

aceti acerrimi 3.j.

terebinth 3℔.

ping. urfi q.f.

f. linimentum.

Vel recipiunt *nasturtium* terunt, & frigunt cum axungia porcinâ, & capiti cataplasmati instar imponunt, & 24. h. spatio crustam decidere facit, & si hoc cataplasma reiteretur, tineam sanat. Postmodum ad evacuandam materiam in cute imbutam, à qua ulcuscula conservantur, caput abluunt *decocto lupinorum*, *radicum althea, fol. ruta, flor. anethi cum pauco aceto*, vel aquâ *aluminosa Falloppij*.

Quibus peractis, nostri chirurgastri capillis novaculâ abradunt, verum abradi capilli ocyus excresecunt, & eorum radices infectæ non extirpantur, & hoc fœdum malum nunquam eliminatur. Vulgares chirurgi in *incurabilem nosocomia pileola*, vel *vesicâ suillâ pice navali inducto* utuntur, quod pluries repetunt, quem toti capiti seu loco à tineâ obfesso im-

ponunt, & aliquot diebus hæere sinunt, postea eo detracto, unâ capillos evellunt. Deindè capitis corium, quousque rubeat asperiori panno fricant, ut humores vitiosi altius latentes evocentur, & ad externa trahantur, tum demum scalpello, vel novaculâ pluribus in locis scarificant, ut vitiosus sanguis per eam dispersus, educatur. Verum hanc scarificationem maximopere damnamus; relinquit enim post se cicatrices, in quibus impossibilis est capillorum regerminatio. His demum peractis, scarificatas partes, & totam capitis cutem *decocto lapathi, chamomilla, cucumeris asinini fol. & radic. chelidoni, sem. lini, & sanuigraci in lixivio dulciori parato* abluunt. Post lotionem detergunt, & exsiccant, & sequenti unguento obliniunt, ut

℞. Pulv. ellob. alb. &

sulph. vivi ana 3.ij.

flor. aris 3℔.

fulig. picu 3.ij.

ol. baccar. lauri 3.j.℔.

ol. com. lb.℔.

cera citrina q.f.

f. Ung. sa.

Hoc unguento alternis diebus utuntur, donec crustæ removeantur, & cutis sana appareat. Verum si tineæ inveterata sit, & his non cedat præsidii, abluiones, fricationes, & scarificationes reiterant, quousque sanata appareat.

Aliqui chirurgastri pro tineæ curatione utuntur *arsenico*, *auripigmento*, *mercurio virgo hominis jejuni salivâ extinilo*, & medicamentis admisto, vel caput suffumigant *cinnabari*. Cæterum arsenicum, & auripigmentum venenata sunt, & vitæ nostræ infensa,

ac cum locus affectus cerebro proximus sit, vix usurpanda sunt, ne venenum cerebro communicetur, è quo postea dolores implicabiles, corrosiones, inflammationes exitiales febris acuta & mali moris, vel ipsa mors sequatur. Mercurius quoque tam sub linimenti, quam fumi formâ intra caput ingreditur, & suâ qua maximè penetrandi energiâ poller, in minimas ejus qualque partes affatim se insinuat in ossa non solum usque sed etiam in cerebrum, & medullas, ac vartorum symptomatum v. hementiam excitat.

Nonnulli chymicalitri huic fædo malo curando *arsenicis oleum* adhibent; inquiunt enim hoc oleum esse omnium ulcerum corrosivorum mors, eorumque malignitatem, & corrosionem extinguere, sed an potius ulcerum corrosivorum, quàm ulceratorum mors sit, nescimus. Huic oleo tantum aquæ scabiosæ stillatitiæ addunt, utâ linguâ ejus sapor tolerari possit, quotineam quotidie bis inungunt, per aliquod tempus continuando. Alii *balsamo mercurii*, vel *oleo antimonii rubro* utuntur *permisto cum oleo vitellorum ovini*, vel *amygdalarum dulcium*, vel *oleo sulphuris* vel *ustrioli aquâ plantaginis diluta*, ac post abstersionem caput abluunt bis in die *balsamo tarsari* per quatuor aut quinque dies, & postremò *oleo ex ovorum vitellis* cicatrizant. Verùm hæc medicamenta acida sunt, & potius malum augere, quàm curare possunt.

Indicatio tinea curativa est, ut vitium in cutis profundo cortigatur, eodem ferè modo ac in scabie, attamen differt à tineâ scabies, quia hæc in cutis superficie, illa verò in cutis mednullio initium habet. ceterùm quia multoties vitium illud in capitis cure aded

Caroli Musiani Tom. II.

profundum non est, nam ut nobis cunctis tinea curare contingit, isdem remediis, quæ pro scabiei curatione tradidimus. Si itaque morbus alias non fixerit radices, ea medicamina per os proponamus, quæ pro scabiei curatione descriptimus, ac deindè *uleuscula aquâ sublimari* irroramus, vel sequenti unguento Nicotianæ inungimus ut

℞. ful. nicotiana lib. ij.

ping. porci recentis diligenter lota lib. i.

Hæc herba per noctem in vino rubro maceretur, manè igne leno cum pinguedine bulliat ad vim consumptionem, postea coletur, & exprimatur. Huic expresso addo succi nicotiana depurati lib. β. resina abietis ℥. 4. coquantur ad succi consumptionem, quibus circa finem adde.

radic. arist. ros. subit. pulv. ℥ij.

cere nova q. s.

f. ung.

Hoc inunge ter, quater, & ad plurimum sexies, & per viginti dies curam expecta, quam si obtinebis, gaude, sin minùs ad hæc quæ sequuntur, transeundum est, quæ tinea radicitus curant cum capillorum renascentiâ.

Capillos omnes à capite novaculâ abrade, deindè leni lixivio calido quicquid furfuraceum, vel purulentum, est, absterge, postea totum caput sequenti unguento inunge semel in die, usque dum tinea curata est, quod cursu viginti dierum evenire solet, ut

℞. Succo chelidonia, &

ol. veteris ana ℥. j. β.

simul bullians ad consumptionem tertiam partem addde

viridis eris ℥. β.

sulphuris ℥. ij.

co. a ℥. β.

Simul bullians parùm, optimè commif-

P cendo

condo omnia, auferatur vas ab igne & unguento addæ ol. juniperi, paulatim agitando illud, diem frigidum factum sis, & utere. Vel hoc alio uti poterimus, ut.

*℞. ol. ros. ℥
junip. ex ligno elicci ana 5vj.
sulphuris vivi,
stereoris columb. ni,
viscidis aris ana 3℔.
cera q. s.
f. ung.*

Si inveterata sit tinea, & altas fixerit radices, faciliter descripta medicamenta omnino illam eradicare non poterunt, quod ex morbi pertinaciâ cognoveris, nec capillorum ablatio quicquam proderit, cum eorum radicibus infectio hæreat, tunc ea convenient medicamentis, quæ partis nutrimentum in particulis acido salsas degeneratum ciculant, mitigant, & depurant, ne cutem amplius exedant, & malignitate inficiant. Deinde quæ ipsam glutinosum incidunt, & subtiliant, ut remes evanescat in auras, ac tandem abstergunt, & sic partem affectam in statum naturalem restituant, ejusque consolidationem promovent.

Hæc medicamenta duplicis sunt generis, alia interna, alia verò externa. Interna sunt purgantia, & ea propinare possumus, quæ in scabiei curâ descriptimus, attamen cum contagium in cutis meditullio profundius hæreat, ut plurimum externa sufficere posse existimamus. Inter interna abso bentia connumeramus, ut *sal volatile viperarum c. c. lumbri. orum, diaphoretica, ut sibi-um. sulphur auratum &c.*

Per externa curatio obinetur illi- niendo, vel alio modo medicamēta applicando, quæ quoscunque acotes, al-

petitates exoticas, & corruptiones detrahunt, ita est *oleum tartari p. d. & quæ sulphur continent; unde oleum tartari p. d. spongia crassius applicatum. nunquam nos fefellit, oleo Laurino cum sulphure multo, curavimus, & balsamum sulphuris omnibus palmam præteripit.*

Optima sunt hæc medicamenta, sed non lævè semper felicem consequuntur effectum, quia contagij fomes non in cute, vel panniculo carnoso, sed in pericranij meditullio stabulatur, ad quod medicamentorum energia non collimar: alia igitur vestiganda sunt, quæ necessariò suum sortiantur effectum, aliàs esset operam, & osium perdere.

Habemus nos infallibile, & expectum remedium, quod nunquam nos fefellit, & multos pueros otigine claros ab hoc spurco malo eripimus, quos non recensemus, ut eorum æstimationem tueamur. Hinc chavitas erga tinea- nosos nos suadet, ut hoc nostrum medicamen sine invidiâ communicemus, illinc vulgariū hebetudo, & temeritas, ne margaritas ante hos porcos projiciamus, nobis remoram imponit ut illud silentio involuamus, attamen prævaleat chavitas & illud ingenuè communicamus, ut chirurgastri confundantur, & pereant.

Primo itaque tinea- osos cathartici, quibus in scabie utimur, purgetur & hoc ut domesticorum patientis morem à vulgaribus insitum geramus, potest tamen omitti purgans, cum malum sit topicum, & topica exigat medicamenta. Deinde sensim evellantur capilli, nontamen vossellâ, nam potius rumpuntur, & eorum radices non eradicantur, sed id fiat instrumento ferreo à nobis excogitato post quorū exulsionē,

eodem instrumento crusta abradantur, & sequenti linimento penicillo illiniuntur, ut.

℞. ol. luffinum ℥. iij.

cera curina q. s.

fiat mass. unguenti mollis instar, super cal. dos cineres.

Olum Bufonum in nostrâ pyrotechniâ lib. 5. cap. 1. art. 3. descriptum, ut.

℞. Bufones. iij. vel. iv.

Purgentur in ollâ, cujus fundum multis foraminibus sit perforatum, & in ore suum imponatur operculum per quatuor, vel quinque dies. Inde olla non vitriata, quibus supersunde olei olivarum lib. v. vel. vj. Claude vas, ne quid expiret, bull. in aperto tone, leno carbonum igne per sex horas. Permitte vas sponte refrigerari, aperi. decanta & ad usum serva. Post modum his in hebdomadâ caput sequenti decocto abluatur, & pannis exsicceetur, ut.

℞. Aq. bord. q. s. in qua ebulliant

scabiosa,

adianthi,

oris marini,

maianum,

salvia,

Lavendula ana m. j.

flor. ros. rubr. incomplet. p. j.

Hoc decoctum quoties adhibendum est, recens fiat. Diebus à Lotione vacuis, super dicto linimento caput illiniatur, donec renati capilli ferreo instrumento iteratò evellantur post quorum avulsionem ad ablationes, & illinitiones alternatim recurrimus. Ter capillos evellimus radicibus corruptos, sanis remanentibus, & tinea quantumvis inveterata & rebellis his nostris præsidijs non reluctabitur. Verum enim verò, ut veritatem ingenuè fateamur, pro hujus spurci morbi curatione lussit ca-

pillorum evulsio, & quodcumque vulgare topicum ad hunc finem paratum. Verùm si tinea sicca sit, tunc humectantibus tractetur præsidijs, & non ægrè cedit.

C A P. XXVI.

De Aurium dolore.

A Capite ad auditus organum, tantquam partem ipsi proximiorē descendimus, & juxta nostram methodum tantum de aurium ulcere tractare decteveramus, sed quorundam amicorum suasionibus, quibus libenter auscultamus, cohortati sumus, ut de omnibus aurium morbis in Galenistarum gratiam ageremus, qui sutulastri, ut erat *Marcus Crassus*, veram non hauriunt sapientiam, & quod pejus, malè audiunt, & nisi resipiscant, muti evadent. Hinc.

Gravissimum, & periculosum malum est *otaleia*, hve aurium dolor, qui nisi itatim sedetur, graviora excitabit symptomata & ægrum extinguet. Aurium dolor est affectus oculorum dolore! gravior, quia oculorum dolor in oculis tantum persistit, aurium verò facillè cerebro impertitur, undè insomnia, deliria, convulsiones, syncope, apoplexia, & tandè mors.

Quinque sunt dolorum species, & partim ex partis affectæ naturâ, & partim à causis delinuntur: Gravis, tensivus, stimulan, punctorius, & pulsacilis. Omnes hæc species & qualescumque adhuc inveniri possent, ferè simul in atroci aurium dolore concurrere, ita ut simul & semel dolor atrociter gravas, pūgēs, lancinans, stimulan, & pulsas excutiet, & id tā excessivâ acerbitate, ut

sæpè æget in magno vitæ discrimine
velletur, ut H. p. in præfag. innuit: *Auris
dolor, cum febre non intermitten-
te, & mentem turbat, & hominem
rapit.*

Signa.

Ad aurium dolorem cognoscendum
non opus est signis, cum ex ægri rela-
tione paretur; causarum verò signa,
quæ varia esse solent, tantum recensere
oportet. Prius itaque diligenter in-
quirere debemus, an aliquid dolorem
efficit, de foetis auri immissum sit,
quod ex ægri relatione, auris inspec-
tione, & exploratione patet, an auri
vulnus inflatum sit, vel alia illi violentia
illata sit, & id quoque ex ægri rela-
tione manifestum esse potest. Si occa-
sionalis causa fuerit aer frigidior, vel
Boreæ flatus, tunc etiam ex ægri con-
fessione patet. Si oriatur à spiritu
flatulento, dolor est vehemens cum
tinnitu & strepitu manifesto apud
ægrotum, & dolor non est assiduus,
sed per intervalla recurrit. Verum fre-
quentissima doloris causa est inflam-
matio, cujus signa *Tomo 1. de Tumori-
bus cap. 42. De Aurium inflammatione,*
proposuimus. Si ex ulcere, sit reten-
tâ faule. Si ex nervi auditorii vicio, læ-
ditur auditus.

Causa.

Galenī sectatores dolotis aurium
causam continui solutioni refundunt,
ut sunt sanies, sordes, vermes, exter-
na illapsa, ut capilli, ossicula, item me-
dicamenta incongrua, sonitus, vel
strepitus vehemens, & horribilis, to-
nitrus, tormenti bellici explosio, & id

genus alia, quæ continui solutionem
inferunt, & tristem sensationem. Vel
calidam vel frigidam causant intempe-
riem, ut est magnus calor, si goris,
ventorum, pluviarum &c. appulsus,
qui naturalem aurium unitatem solve-
re possunt. Verum hæc causæ iamum
removere, & occasionales esse possunt,
non verò proximæ, & immediatæ, ut
fusus explosivus in nostrâ *Tumore* de
capitis dolore.

Vera aurium doloris causa oritur à
particulis sulphureis, acidis, salinis,
vel à quopiam alio id genus internas
aurium fibras nervosas, membranolas,
& musculosas distendendo, divellente,
contrahente, vellicante, vel à mate-
riâ peregrinâ, quæ fibrosas aurium par-
tes divellit, spasmodique dolorificos in
iisdem excitant; internæ namque au-
rium partes exquisito gaudent sensu.
Quandoque partes exteriorez dolori ten-
tantur, verum cum dolor hic non sit
magnus, de eo non agimus, sed de eo
qui internum meatum, membranas,
& nervum auditorium obsidet.

Prognosis.

Vehemens aurium dolor in juveni-
bus valde periculosus est; lepius
namque die, vel citius moriuntur, quia
facile cerebrum in consensum rapit, &
gravissima excitat symptomata, inter-
num scil. erysipelas, febrem acutam, in-
somnia, delirium, convulsionem, lipo-
thymiam, & mortem. Senes autem in
vehementibus aurium doloribus minus
periclitantur, quia frigidum habent
corpus, idèque vehementi inflammatione,
febris acuta, & delirium non
itâ facile corripuntur; sensus etiam
tactus in senibus est obtusior, idè diu-
tius illos ferunt dolores, unde apud
illos

illos facilius materia aurium dolorem efficiens, in suppurationem abit. Re-
cidiva tamen periculum subeunt senes,
cum materia dolorem excitans non be-
nè concoqui possit ob frigidam consti-
tutionem. Si vehementer sit aurium dolor,
& in penetralibus hæreat, mortem por-
tendit, significat enim auditorium net-
vum affectum. Aut si morbus curetur,
auditus gravitatem, vel surditatem re-
linquit.

Curatio.

Galenī procuratores aurium dolo-
rem curant, auferendo causas, à qui-
bus dolor ipse fovetur, quod si vitium
resolutio immineat propter doloris ve-
hementiam, & tempus non suppetit
pro sedantium exhibitione, extremitas
humorum colluvie corpus depleat,
proximis internis, deinde externis fri-
ctionibus, cucurbitulis, scarificationi-
bus, & enematum injectionibus. Pro
frigida intemperie in aures instillant
oleum amygdalar. amararum, aneth.
chamomel. croci. Vel *decolli caryophyl-*
lor. aromaticor. in vino rubro guttae duæ,
vel tres tripidè in aurem instillant, dein-
dè caryophyllo cocto aurem obturant.
Vel *cape excavata in medio indunt pa-*
rum euphorbij, & oleum commune, il-
lamque super prunis ponunt ad oleo ebul-
litionem, quod tepidè in aurem instil-
lant. Vel in uno, aut plurius ex præ-
dictis oleis coquere solent *sampsucum,*
stercad. rorem marinum. Lavendulam,
castoreum, crocum &c. & in aurem in-
stillant. Vel forum ex quatuor anody-
nis applicant.

In calidà intemperie affectæ porris
venam secant, solutâ priùs aluo clyste-
ribus, *lac tepidum* dolenti immittunt
auri, cui quandòque *ovi vitellum im-*

miscent. Vel *oleum amygdal. dulc. aut*
rosaceum guttatim instillant. Vel *deco-*
ctio malv. alib. vitol. hord. fenum grac.
Vel *cataplasmate de mica panis* locum
fovent.

Si autis dolor ex flatibus exciteretur,
illum discutientibus, & carminantibus
sedant, fomento scilicet *furfuris, milii,*
salis, arisi, vel sacco/lo flor. chamom. nüs.
mosch. caryophyll. masis repieto, & im-
posito, vel auri immittunt *Zibe-*
thum, moschum, crocum, castoreum
&c.

Si dolor ità perseveret, ut vires pro-
sternantur, ad narcotica confugiant
pro parvis sensus heberatione, ad quem
finem *Philon. Romanum, succum man-*
dragoræ cum castoreo, iberiacâ, Mistri-
datio, & opio ulsèpant.

Dolor si gravior, & diuturnior fue-
rit, vesicatorium in nocâ applicent, cui
si reluctetur, Setaceum inter secum lam,
& tertiam vertebrae excitant, vel tan-
dem fonticulos aperiunt, & demit-
tunt.

Aurium dolor tripliciter aufertur,
primò iis, quæ doloris causam tollunt.
Secundò anodynis, quæ doloris cau-
sam consopunt, æquabilem reddunt,
& leniter ratefaciunt; tertio Narcoti-
cis, quæ dolorem sedare, & pacare va-
lent, & id non per molestantis causæ
ablationem, sed quia doloris sensatio-
nem obstupesciunt, soporem inducen-
do, à quo ferè omnia mala sedantur.
Dolor vehementissimus narcoticum, &
mi lor anodynum indicat.

Undè si à rebus extraneis intra au-
rem immixtis pendere tollendæ sunt.
Itaque si sint vermes in aute geniti, vel
foris ingressi, ad hos enecandos, & ex-
trahendos magnoperè valet *oleum phi-*
losophorum guttatim instillatum, vel
unguentum ex capi axungia, & oleo co-

ryli cum paucis mercurio dulci misctum, gij, rosmarini, succini &c.
ne

℞. Ungu. cap. 3 ss.

ol. coryli gutt. xv.

merc. dulc. gr. xv. m.

& in aurium orificio cum gossipio ponatur. Vel *sulphuris fumus* per infundibulum exceptus, deinde enecti auriscalpio extrahendi sunt. Si pulices sunt, qui in aure vagantes, ingentē strepitū aures percipere faciūt eosteūt vulgares statim adhærescere naturaliter indito auribus fasciculo ex pilis caninis, & sic extrahi. Si aqua in aurem illapsa sit, inclinato capite, rursus effluere sinatur, vel per calamum ipsa exsugatur.

Si à spiritu flatulento dolor sit, cum flatus materiam præsupponat, à qua elevatur, ea primò expurganda est. postmodum discutiendâ quintâ essentia *nicotiana*, *myristica*, *anisorum*, *corticum aurantiorum*, *sampfuci*, *rosmarini*, *bac. innisperi* &c.

Si doloris causa sit inflammatio, quæ ratione curanda est, diximus *Tomo 1. de tumoribus p. n. cap. 42.*

Si ex membrana perfrigeratione, ab inspiratâ auri gelidâ, à ventorum afflatu oriatur dolor, instillantur olea calida, ut *oleum essentielle laurinum, de castoreo, destillatum, essentielle pule-*

Si dolor sit mitior, tollitur anodynus, quæ leniter rarefaciendo, & contracturam leniendo, doloris causam consopiant, & ita erunt *oleum amygdal. dulc. lilior. albor. cum lacte muliebri*, quæ cum specillo molli lanâ involuto tepidè in aurem immittantur. Utile est *ol. ros. cum rosmarini succo*, *ni & muscago sem. psyllij, fenugraci*. Item *foli. N. tiava viridis, vel etiam exsiccata*, sed iterum humectata, misce profunt. Magnopere dolorem pacant *quatuor anodyna in hydraleo*, si auri affecta calidè spongiâ foueatur, vel eorum vapor in aurem excipatur. Sequentem solum multoties profuisse experti sumus, ut.

℞. Radic. Lillor.

alib. cum toto;

fol. malu.

viol. ana m. j.

Sem. cydon.

malu. &

lin. ana 3. iiij.

flor. ros. rubr.

chamomill. &

anethi ana p. ij.

f. decoctio.

qua auri frequenter foueatur. Sed fequens vapor vehementissimum aurium dolorem semper pacavit, ut

℞. fol.

qua auris frequenter foveatur, vel vaporulentis in affectu recipiatur, aures.

Cave, ne intra autem liquorem instilles aliquem, qui opium exceperit, quia licet dolorem sedes, alia deteriora mala excitabis.

℞. sol. rovis marini,

Sampfuci.

betonica ana m. j.

flor. ros. rubr.

meliloti, ℥

chamomill. ana p. j.

Sem. Cini, ℥

fenugrec. ana p. ℥

fiat decoctio pro vapore excipiendo.

Oleum etiam è ligno coryli acerbissimos aurium dolores statim sedat.

Ubi tandem aurium dolor est acerbissimus, quia delirij, convulsionis, syncopes, & mortis imminet periculum, ad narcotica confugiendum est, quæ dolorem percipi non faciunt, vitam sopiendo, quæ est immediata causa doloris, talia erunt *Laudanum opiatum*, vel vulgaria, ut *Requies Nicolai*, *Philonium Romanum*, *Persicum*, *psul. de synoglossa* &c. Sequens decoctio narcotica in forma fortis, vel vaporis miraculi adinstat quoscunque aurium dolores extemplo sedat, ut

℞. sol. la Tuca,

nymphae.

solani,

hyoscyami, ℥

mandragora ana m. j.

capita papav. num. iij.

f. decoctio.

C A P. XXVII.

De Aurium Ulcere.

VT ulcera alijs corporis partibus, sic quoque auribus vel per abscessu, vel per alicujus liquoris acrimoniam evenire possunt, quorum curatio peculiaris est.

Signa.

Aurium ulcus ex sanie, vel sanguine egrediente cognoscitur, ut accidit in suppurata aurium inflammatione, in qua primo satis imaginata copia exit, deinde paulatim fluit, donec sponte cesset. Vlcetis aurium signa sunt, dolor, ardor, vehemens punctio, quæ tactu exacerbatur, saniei fluxus, & interdum sanguinis. Si ulcus sit in nervo auditorio, acerbissimus adest dolor, vel præcessit. Vlcus profundum copiosam sanie, sed lentè emittit; undum laudabilem; sordidum crassam; vinulentum citrinum & tenue, putridum foetentem; corrosivum sanguinem post sanie emictat; fistulosum ex saniei vinulentia, carnis callositate, & duritie, postea tandem

meatus cariosus cognoscitur ab acquirate, ut *scilicet 6. aph. 45. Vlcera qualiter annua, aut etiam diuturniora corruptionem efficiunt.*

Ulcus auris differentie sumuntur à loco, tempore, qualitate, & quantitate. A loco scilicet ab ipsa auris particulâ, quam obsidet, quæ vel externa est, & oculis conspicitur, vel interna, membrana scilicet vel auris tympanum, nervus ipse auditorius, interdum, & ossis ille meatus, in quo, sicut & in alijs, hæc continui solutio caries nominatur. A tempore, quæ ratione ulcus aliud est recens, aliud verò vetustum. A qualitate, quæ ratione aliud est mundum, saniosum, aut sordidum; aliud verò putridum, virulentum, & corrosivum. A quantitate tandem, quæ ratione aliud est in superficie residens, aliud vero in profundum ita penetrans, ut in fistulam abiecit.

Causa.

Galenus affectu aurium ulcerum causas humoribus acerbis & mordacibus, sive in auribus genitis, sive è cerebro ed effusus refundunt, qui acrimonia sua exulcerant.

Aurium ulcus iuxta nostram sententiam non solum à suppuratâ inflammatione gignitur, verum etiam pluribus modis contingere potest, nimirum ob continui solutionem, aut per acidum, vel salsum laticem interiores aurium partes exulcerantem, cum ab aurium sordibus ibidem diutius retentis, tum ob externam injuriam, ut casus, percussio, allisio, & vulneratio, ad quas sequitur ulcus. Ex quacumque igitur causa ulcus inducatur, semper hæc continui solu-

tio, quæ partes abinvicem distrahuntur, & separantur; unde propter vel viciatam fibrarum texturam, vel earum erosionem, ejus nutrimentum in saniem convertitur, & profluit.

Prognosis.

In aurium ulceribus semper pus, & sanies inspicienda est, quæ ulceris bonitatem, vel malitiam indicat; pus enim debet esse album, læve, & æquale, ita ut una pars non sit crassa, altera tenuis, una rubra, altera alba, & non foetens, unde ulceris non maligni, nec pravi sumitur judicium. Vlcera antiqua, & diuturna sunt pejora, quia libenter in fistulam degenerant. Quandòque ad os petrosum usque penetrant, in quo ossis caries deplorabilis inducitur. Si Sanies recens effluat ab auris ulcere, & prius capitis dolor, sensumque perturbatio præcesserit, & hæc jam desinant, bonum; significat enim ulceris curationem paulo post sperandam esse. Ulcus humidum, diuturnum, non corrodens, si non exsiccetur. Metus est, ne carnis excrescentia excrescat, quæ auditum obturet. Ulcera in meatu osseo, difficilius sanantur quàm in meatu cartilagineo, quia canalis osseus versus tympani membranam declivis est, & ubi ad plauum descendit, fossam efficit notabilem, è qua pus ægrè eximitur; contra verò meatus cartilagineus versus concham declivis est, & pus facile effluit. Aurium ulcera, quæ ad Cranij os perrungunt, seu & profundæ fistulæ nunquam sanantur, sæpe ejusmodi profunda, & putrida ulcera continuitate quadam ad cerebrum usque descendunt, quæ tertio die occidere solent.

Curatio.

Antequàm ad topica in aurium ulcere deveniant vulgares ex Gal. sententia 4. de compos. med. sec. loc. tolemnes instituunt evacuationes per phlebotomiam, & purgans medicamentum ægrotantis nature, & temperamentis appropriatum, quæ toties per curationis decursum reiterant, quoties opportunum videbitur. Deinde ad leniter abstergentia, & exsiccantia confugiant, & primò mitiora, postmodum validiora usurpant.

Abstergentia mitiora sunt, succus absinthij, apij, marrubij, betæ, agrimonie, centaurij minoris cum melle decoctum hordei, & lupinorum, Vel

℞. Mell. opt. ℥.

vini alb. antiqui ana ʒ. iij.

Bulliant ad despumationem, & destillentur in autem, post modum autem obtura gollypio eodem liquore imbuto. Vel.

℞. Succ. betæ ʒ. j.

marrubij ʒ. ʒ.

mell. opt. ʒ. vj.

coque par. deinde adde

Syr. de absinth. ʒ. ij. m.

& in autem instilla. Validius abstergit succus cyclaminis cum melle, vel aqua mellis, in qua prius ebullierit radix helilebori albi additis myrrha, sarcocolla, gentiana, & modico succo betæ, Vel.

℞. Succ. cyclaminis ʒ. j.

myrrha ʒ. j.

Cruci ʒ.

thuris ʒ. j.

viridis arii ʒ. ʒ.

vini antiqui ʒ. j. ʒ.

Bulliant ad vini consumptionem, & liquor latus, vel ter in die instilletur in aurium,

Absterge ulcere, ex siccatibus utuntur, ut

℞. Aristoloch. rotunda,

Cortic. granator.

gallarum ℥.

nuc. cupress. ana ʒ. ʒ.

Coquantur in partibus paribus

vini, &

aqua ferrate ad lib. ʒ.

Colatura adde

Succ. plantag.

polygoni ana ʒ. j.

uell. ros. ʒ. ii. m.

& in aurium instilla. Potentissimè exsiccandi vi potitur alumenustum cum vino mistum, si in aurium instilletur.

Absterge, & ex siccato ulcere, ad medicamenta, quæ cicatricem inducunt, accedunt, decoquendo in vino pompholygem, iutiam, cerussam. Vel suffitum parando ex mastice, thure, myrrha, ladanio, gummi junperi, sarcocolla, galbano, & similibus, ut

℞. Gummi junperi ʒ. ʒ.

thuris, &

myrrha ana ʒ. j.

Sarcocolla,

Ladani ana ʒ. j.

m. f. pulv.

vel cum tercibinina f. pastilli, & per infundibulum in aurium immittunt.

Si ulcus his non cesserit medicamentis, quia vetustum, & diuturnum, corpus repurgant, & dietam ex ligno guajaco & salis parilla præscribunt, non omittis ethinis, masticatorijs, aliisque remedijs, quibus fluxionem avertere credunt. Postmodum ulceris exsiccationi fortibus incumbunt remedijs & iterum præscripto utuntur remedio ex succo cyclaminis, myrrha viridi are Vel sequens commendant ex Hal, quo Usens de Tarenta gloriatur se Presbiterum ab octo annis aurium ulcere labo-

laborantem sanasse.

℞. Meli. 3. x.

aceti 3. viij.

roque ad ignem, & despumata, deinde adde.

viridis eris 3. j.

Hoc remedium manē & serō in autem infundatur, vel cum turundā auri imponatur. Vel.

℞. Aloes,

iburis,

myrrh. ana 3. ij.

misfos 3. j.

fiat massa cum aceto, qua soluta cum aceto, aut rosaceo utere.

Si ulcus fistulosum perpetuū fluat sanie, commendantur, ut per clysterem auricularem iniiciatur *fel tauri cum urina pueri, vel vinum, in quo decoctum sit zbu, aut helleborus albus, & mel.*

Si ulcus in auribus carnis excresecit habear, sequens, quo citra dolorem carnem reprimere, & cicatricem obducere existimant, medicamentum prescribunt, ut

℞. Alum. scissil. &

misfosusti ana 3. ij.

avuginis,

terra lemnia,

gummi Arabici ana 3. j.

Tritis his, cum aceto acerrimo f. pastilli, qui usūs tempore cum vino, vel aqua solvantur.

Aurium ulcera quandoque sponte sanantur post puris fluxum sedatum, sed ut plurimum medicæ manūs auxilium expetunt. Purgetur igitur corpus, & auris eluatur vino, in quo myrrua, & aloē infusa fuerint cum tantillo mellis rosati. Deinde in aureo instilletur *urina pueri destillata, vel balsamus proprietatis, vel balsamus artificialis*, quibus necessarii oīa aurium ulcera cedunt. Vel

*Balsami sulphuris cerebinthinati quatuor la una, vel altera ulceri aliquando instillata, paucodierum spatio ejus curationem felicissimè absoluit. Interim particule acide salinæ, & sulphure obtundendæ, & eliminandæ sunt decocto simplicium cephalicorum, aut *sampsoni, betonica, baderæ terrestris, rosæ marini, stœcadi &c.* Nec desint interdum mundificantia, quibus diaphoretica conjungimus, ut *sp. c. c. sibiū diaphoreticum, sal rois marini, sal volat. succinii in syr. de heronica, vel ros. incomplex.* Si sanatio in longum protrahitur, per os præbeantur poriones vulnerariæ cephalicæ, vel sudorificæ decocta ex *salsu parilla, ligno guaiaco, visqueri, sampsoni, c. c. &c.* parata in quodam sancti, vase clauso.*

C A P. XXVIII.

De Excrecentiis p. n. ab aurium cavitatibus.

M Ultra p. n. quandoque ex auribus excernuntur & primò, post aurium inflammationem, rupto abscessu, pus, aut sanies emanat. Secundo, idem accidit in aurium ulceribus. Tertiò, nullâ precedente suppuratâ inflammatione, ulcere, & extrinsecus injuria, accidit a quosum humorem, aut sanies aliquid simile ex aurium cavitatibus effluere, id vel continuo, vel per intervalla, cum odore fetido, non tam agrotico, quam aditantibus nauseabili. Quartò, sanguis interdum ex auribus effluit, & non tantum evenit in capitis vulneribus, percussione; casu ab alto, & similibus externis injurijs, in quibus aurium vix rumpi, vel lacerari possunt.

sed etiam crasis modo. Quinto, Ver-
n es aliquandò in sordidis aurium ulce-
ribus signi, atque inde prodire obser-
vavimus. Sexto tandem, excernitur per
aures auriscalpij ope viscidum quod-
dam naturale excrementum amaricans,
Cemmen dictum, quod indies vapore
tenus in minimâ portiuunculâ materia-
liter internis aurium parietibus ap-
ponitur.

Signa.

Horum affectuum signa ex excretis
manifestantur.

Cause.

Pro aquosi & saniosi fluxus causâ
Vulgares cerebrum nimium humidum,
impurum, & superfluum redundans hu-
moribus stabiliunt, sed quandò tantâ
effluit copiam etiam vicinas partes ejus-
modi sordidam illuviem subministra-
re, & ad aures derivare credunt, ut plu-
rimû pueris contingere solet, ita Hip.
sect 3. aph. 24. asserit: *Nuper nati in-
fantes habent aures humidâs.* Quorum
cerebrum superfluum, mucosum, & catar-
rhoicâ humiditate non solum per vias
ordinarias huic usui à naturâ destinatas,
nates scilicet & palatum, sed etiam per
aures, tanquam ductus minus idoneos,
oculos, & totam capitis superficiem ex-
purgatur, ut in capitis achoribus, &
ulceribus patet.

Falsum idprehendimus vulgarium
opinamentum de aquoso, & sanioso
aurium fluxu, cum nulla sit via è cere-
bro, nisi ossis petrosi foramen nervo au-
ditorio paratum, neque salvâ tympani
membranulâ, ex aure effluere possit, si
humor in interiorem auris cavitatem

primò effunderetur.

Aquosi, vel saniosi aurium fluxus cau-
sam nos dicimus, esse laticem, vel au-
rium nutrimentum degeneratum ob
aliquod continentium vitium. Hic
aquosus, vel saniosus fluxus citra audi-
tus læsionem ab aure procedit, quia in
interno ejus meati, & circumadacen-
tibus partibus generatur. Potest quan-
dòque hic fluxus, si in diuturnitatem
abeat, vel intra prædictam cavitatem
cohibeatur, tympani membranulam
petrodere.

Pronosis.

Aquosus, vel saniosus aurium fluxus
tam in abscessibus, & ulceribus, quam
quovismodo, minime cohibendus est;
nam importunè suppressus ob consen-
sum, epilepsiam, aut alium gravem ce-
rebrum affectum parit, sed fluat sinamus,
donec pars opprimè absterisa sit. Hujus
materiæ fluxus nonnullos à pluribus
præservat symptomatibus, cephalæa,
apoplexiâ, epilepsiâ &c. quibus levan-
tur sub fluxus hujus continuatione,
uti in infantibus subindè observamus,
qui per hujusmodi aurium fluxus plus
minus sordidos à pluribus malis, tam
externis, quam internis, levati sunt. Sa-
nies recens effluens albi coloris, quam
præcessit capitis dolor, & sensuum per-
turbatio, quæ etiam cum erumpente
sanie mox quiescunt, boni indicij est,
& brevis sanationis signum. Non diù
fluere sinatur, nam in consuetudinem,
& diuturnitatem abit, ac proindè mem-
branulam petrodit, auditum pessumdat,
atque in fistulam, vel carièm transit
nunquam sanabilem, præcipuè si ef-
fluens sanies mali sit coloris, & foetidi
odoris.

Curatio.

Sanguinem ex aure profluentem propter externam injuriam statim sistunt vulgares venæ sectione in contrariâ parte præmissâ, & encubitalis scapulis atrox cum scarificatione. Deinde adstringentia, & roborantia frigida in aurem instillant, qualia sunt *succus plantaginis*, *virga pastoris*, *polygor*. *Decoctum rubi, ros. rubr. malor. punic. acacia, hyppocistidis, fumach & similia in vino & aceto, vel aquâ ferratâ.*

Aquosum, vel purulentum fluxum curant superfluos in cerebro humores educendo blandis, & frequenter repetitis purgantibus cephalicis, tum etiam derivantibus per vesicatoria posteriori cervicis parti admodum, causticum occipiti inultum, fonticulos, cucurbitulas, quibus credunt humores in cerebro recondantes citari, ut personaliter compareant sub pœna &c. Postmodum dirâ sudorificâ superfluam absumunt humiditatem. Autium meatum hoc medicamento detergiunt, & exsiccant, ut

℞. Succus agrimonie, & absynth. ana ʒ. iv. vini albi, & mellis ros. ana ʒ. i.

Bulliant parum, & in aurem instillantur, sordibus prius absterfis, deinde aures gollypio obturentur eodem liquore imbuto. Vel.

℞. Vin. ab. succor. agrimonie, & centaure. min. ana ʒ. j.

Bulliant simul & in aurem instillantur.

Quomodo purulentus aurium fluxus

ex suppuratâ inflam. matione, & ulceribus curetur, & vernies ex auribus educantur, suprà dictum est. Si verò sanguis ex aurelluat ob externam injuriam, & modicus sit, ejus fluxus non statim cohibendus, quia intus terentus inflammationem efficeret. Si immodicus, aut diuturnus sit, sistendus est *succo urtica, aqua spermatis ranarum*, sed præstat *aqua arterialis* in aurem instillata.

Aquosus, vel saniosus aurium fluxus in pueris non supprimatur, quia intempestivè suppressus mortem inferre solet, sed malum ætati crescenti relinquendum est; solet namque ætatis progressu, & corpore jam siccior reddito, sponte cessare. Si verò ad pubertatis annos protrahatur, tunc fluxus sistendus, & prius necessaria sunt capitis purgationes vel medicamentis communibus, vel pilulis. Dantur præterea portiones sudorificæ ex *guaiaco, saussa parilla ligno visci quercinis, smalturâ &c. scabiosa, auricula muris, betonica &c.*

Interim autium meatus cum partibus circumiacentibus detergetur quotidie manè jejunio ventriculo *urinae puri destillatâ, uris aliquot*; relinquatur immixta urina aliquandiu, deinde, inclinato capite, emittatur. Ad exsiccationem verò maximè valet *balsamus artificialis, proprietatis, vel sulphuris rebebinthinatæ ad guttas aliquot.*

C A P. XXXIX.

De Aurium Senitu.

Est aurium Sonitus depravatæ auditionis symptoma. Auris nullum in se sonum habere debet, ut omnes sonos

nos extrinsecus advenientes percipere valeat: sicut oculus omnino coloris expertus esse debet, ut omnes objectorum colores optimè percipiat, quòd si aliquando aliquo præternaturali colore afficiatur; ut in scieto, tunc visio depravari necesse est. Aurium sonitus est sensus depravatus auditus intra ægri aures excitatus, cum foris omnia sileant, & ita percipitur sonus, ut is externus audiri credatur, estò nullus edatur, vel isti alius admittit puretur. Est ita molestus aurium auditus, ut externum, alijs audibilem sonum, vel planè non, vel admodum difficultè percipere faciat, cum ab illo spurio sono intra aures stridente percutiatur.

Hunc morbum varijs nominibus medentes appellavere, aliqui aurium tinnitum, alij sibilum, pauci strepitum, plerique verò sonitum dixerunt, & merito, nam onus nomen generale est & notissimum est sonum adæquatum esse auditus objectum, ideòque tinnitum, sibilum, strepitum sonus comprehendit.

Isti varij aurium sonitus, ortum habent à vaporum multitudine, vel paucitate, crassitie, vel tenuitate motu celeri, vel lento. Undè si vapor multus sit, & celeriter moveatur, sensorio exhibebit similitudinem aque rapido cursu cum fragore fluentis, vel tympani, vel id genus instrumentorum musicorum, vel venti teboantis, vel id genus similia. Quòd si vapor paucus sit, crassus & celeriter moveatur: arboris fractæ, vel domus cadentis, subitaque ruinæ speciem repræsentant. Si multus sit, tenuis & celeriter moveatur: sibilum refert solet & torrentis cujusdã lenioris imaginem. Si paucus sit, tenuis & celeriter moveatur: tinnitum excitat modo notatum, vel tintinnabulorum. Si multus

sit, crassus & lentè moveatur: murmur quoddam excitare solet. Si paucus sit, crassus & lentè moveatur: sultum repræsentat. Si multus sit, tenuis & lentè moveatur: sibilum remissionem refert. Et tandem cum gradus innumerari possunt crassitie & tenuitatis, multitudinis & paucitatis, motus celeris, vel tardi, pro eorum variatione, infiniti propemodum sonorum modi in auribus produci poterunt: prout magis, vel minus ad hanc, vel illam accedere videbuntur.

Signa.

Hujus affectus signa ex ægrotantis relatione percipiuntur, vetù hæc signa penes ægrotantis relationem sicca videntur vulgaribus juxta eorum causas assignandas, ideòque ex prægressis causis aliisque circumstantiis quoddam conjecturam desumunt. Si malum pedetentim caperit, & per quoddam intervalla recurret, tum etiam si cibi flatibus procreandis præcellerit & sonus clatior sit, à flatuoso spiritu malum fieri nemo ambigit. Affectus hic dupliciter continere potest, vel per essentiam, vel per consensum; per essentiam fit in ipsis auribus, & essentiale virium assiduus tellatur sonitus, siue ullà intermissione molestans: potest tamen per intervalla in ipsis auribus etiam contingere, si causa per intervalla coaceruetur, & deinde resoluatur, & sic vicissim. Per consensum fit ab alijs partibus, si aliqua pars peculiari labore affectu, & tunc subito invadens, per intervalla recurrit; potest nihilominus assiduè infestare, si assiduè effluviu auribus pars affecta subministrat. Quòd fit à cerebro adeo capitis dolor & gravitas, & ut plurimùm noxa alijs surcul communicatur sensibus. Ab alia-

arū partium, vel totius consensu, id sibi cognoscitur signis, & malū post inanitionem, vel repletionem, post motū, vel quietē post vehementē calorem, vel febris quiescit, rursūque concitatur. Si à crassis, lentisque humoribus fiat, non illico aggredimur, sed pedetentim crescit, & sonus magis obtusus, fluctuans, & gravitatis sensus percipitur. Si à vaporibus crassis, vel tenuibus, paucis, vel copiosis fiat, cognoscitur ex sonorum differentiis, quæ in auribus percipiuntur. Si ex aurium obstructione sonitus dependeat in febribus, aut haurum; aliorumque morborum crisi, proveniri à causis illos morbos excitantibus. Si ab imbecillitate, facile ex his, quæ imbecillitatem induxerunt, cognoscitur. Si ab abscessu, ex inflammationis signis facile percipitur.

Causæ.

Pro aurium sonitus causâ vulgares statuant vapores, aut spiritus flatulentos inter membranam foramini auditorio obversam, à nervo auditorio ortam, vel in ipsâ aure genitos, vel in aurem ab alijs partibus transmissos, ut à toto in febribus, in paroxysmorum principio, & instante crisi per hæmorrhagiam. A peculiari patre elevati flatus ad aures transmittuntur, ut à cerebro, ventriculo, ut in vomitu, & elancholiâ hypochondriacâ, ab hepate, liene, mesenterio, utero, ut in suffocatione hysterica, & ab alijs, partibus. Elevantur prædicti vapores, & flatus ex frigidis, & pituitosis humoribus, à debili calore excitati & in aures deferuntur per venas, arterias, & quintam nervorum conjugationem. Isti vapores & flatus ad aures elevati exitum

quærent, & præ loci angustia non invenientes ad ossa, tympani & membranam, expansumque nervum allisi, præternaturali commotione congenitum aërem exagitant, & sonitus causâ exiunt.

Non mirum, si aurium sonitus ad vapores, & flatus referunt vulgares, cum non sit morbus, qui à flatibus suum ferè non agnoscat genus, ita capitis dolores, vertigines, asthinata, pleuritides notæ, convulsiones, crampus, fatyialis, tympaniæ, epilepsia, syncope, cordis palpitationes, uteri exorbitationes &c. extra controversiam sua debent iniriæ flatibus, atque vaporibus cæterosque morbos ad fluxiones referunt, ut diximus in nostrâ *Tritina lib. 1. c. 7. de catarrho*. Sunt itaque flatus & fluxiones, tanquam duæ firmissimæ columnæ, quibus tota vulgarium medicinarum superstruitur, ad quos tanquam ad sacram ignorauci anchoram perpetuum confugium. O nium ferè morborum naturam, & causas flatibus, & vaporibus in se invicem sursum scandentibus, & superne deorsum decubentibus dicant. *Hippocrates* ille senex ita omnes ferè morbo flatibus consecravit, ut peculiarem de flatibus conscripserit libellum. Et *medicini Monarcha, Paracelsus* non fuit à ventorum turbine immunis, itaque rotunda quadrifariam partitur, juxta quatuor consuetos ventorum cardines; quorum septentrionem in lumbis, austrum in umbilico, orientem in dextris, occidentem in sinistris, tanquam fidelis *Æolus* collocavit: putavit *Paracelsus* nos omnium morbos, ac defectus sentire debere, quod singuli sumus totius universi extractum.

Galenus quoque externum ventum, sive aëris flatum porosum perforare per-

pellem, ut & carnosam membranam, simul & musculos subter eam, & per arterias ad cordis refrigerium, ejusque fulgines explodendas ferri falso putavit. Imò ejus sectatores credunt ventum contractum multas ægritudines progignere posse: ideoque sæpius meà eura veretur, si eos alloquentes audi-
vi: *Multum serò contraxit ventum, unde partes male se habent*, & hanc causam multis in morbis assignari his auribus hauri. Insuper ægrotis, & præcipue hypochondriacis imperant, ne in selecti officij vasis bibant, alias se flatibus infacilent, errant, quia externi venti non intrant regiones insolitas.

Nullibi flatus reperitur, & præterquam in stomacho, & intestinis, quia in præfatis locis suam agnoscit generis ab acido, quod alibi non reperitur. Omnis flatus suscitatus à cibis nondum digestis vel à spirituosâ ciborum substantiâ, vel à ciborum reliquijs, vel ab alimento intestinorum spermatico degenerante: Est igitur quadruplex flatus in nobis internus, & quintus externus, tympanias, qui extra intestini clauditur. Nullus itaque flatus est aer, aut ventus, cum ventus, sive aer non sit de concretorum compositione. Est flatus in nobis Gas sylvestre inter digestionem excitatum è cibis, potibus & excrementis. In stomacho dicitur ructus, stomachi impotentia excitatur, in intestinis peditus, qui sit è cibis in stercorem prope indolem degeneratis.

Hinc fabulosum judicamus cibos quos vulgares flatulentos appellant, cum nullatenus dentur cibi, qui in se flatum conservent, sed tantum ubique errore digestivæ, cibis vitatis in se, vel vituato fermento inter digerendum su-

scitantur, idèdque debilis digestio plures parit flatus quos fortior non admittit.

Falsum deprehendimus vapores, seu flatus per arterias, venas, nervos sursum deorsumque deserti, cum èi illimè aliàs per ructum è stomacho, per peditum, ab intestinis explodi possent. Nec stomachus solus est, ut invitis canalibus, sibi conceptos vapores noxios in arca vitæ deferre debeat. Imò pauce ventæ arteriæ, & nervi sunt in stomacho, nec peregrinum est, potest aliò transferre per dictos ductus. Quorū eūm allicerent, & reciperent, quod præter naturæ est institutum? Quomodò vapores, & flatus insufflaret suos stomachus in vasa angustissima cruore repleta, quæ non valent trahendo?

Non in utero internè suscitari flatus dicimus, quia uterus materia destruitur flatulen à, nec ejus digestio est, creando flatus, nec externè in uterum intrat aer, non enim vacuum patitur, suâ membranâ totus confectis madidâ, idèdque suâ sponte aëri aditus præcluditur spiranti, nisi vi per instrumentum à quod is injiciatur.

Non negamus ab inferis partibus capitis dolores, vertigines, suditates, epilepsias, cæteraque id genus mala ortum habere: non tamen per vapores ad caput delatos, etenim per œsophagum ascenderent & nil, nisi suspidam aquam stillatitiam dareni. Multum interest vapor à flatu & aëre.

Dantur duo flatus in nobis, unus plerè hereticus tam in intestinis, quam toto corporis habitu detentus, atque natus, cimen ex fermento venenoso, & stercore extincto, alter verò flatus oritur in ultimâ digestionem parium similium à sexta digestionem, itaque si
ulti,

ultima digestio intra partes aurium constitutivas vicietur à fermento inter digerendum flatus produciatur, qui sonitus juxta quantitatem, qualitatem, & motum excitat; non quod ab inferis superna petat, vel à superis in inferiora descendat. Hujus affectus occasionalis causa esse potest vehemens capitis percussio, sonus vehementior, aurium ulcera, debilitas &c.

Alij arbitrantur auditus debilitatem ob caloris naturalis inopiam aurium sonitum efficere posse, ut patet in lenibus, & convalescentibus. Verum horum opinio improbabilis est; auditus enim debilitas ob caloris naturalis inopiam non potest esse causa actionis depravata, sed tantum imminuta. Quod verò in senibus & convalescentibus interdum aures tinnunt, hoc non provenit ex debilitate auditus, sed ex viciata talium partium digestionem sextà intra aures hærente, cujus productum resolui nequit à debilitate, unde in convalescentibus postquam perfectè convalescerunt de infirmitatibus suis, non amplius ab aurium sonitu molestantur, quia partes ad perfectà redeunt munia.

Aliqui putant sensum auditus exquisitiorem aurium sonitum efficere posse, quia objecta licet moderata illum efficiunt; unde qui exquisitiori fruuntur sensu, ad minimum cujuslibet objecti motum expergiscuntur. Concedimus sensum exquisitiorem, illumque pendere putamus à sensorio perfectissimè disposito, imò quodammodò plusquam perfectò, & simul valdè tenero. Verum sensum exquisitiorem per se actionem depravatam producere posse negamus; imò quòd sensus est exquisitior, eò minus errare debet: debet igitur esse præ-

ter naturalis sensus, ut præter naturalem producat effectum. Quòd ad cujuslibet objecti motum excitantur, hoc provenit, quia sensorium est valdè tenerum, & faciliè molestia afficitur, cum recedat ab exactà mediocritate. Hinc talium hominum somnum experimur valdè levem, ac continuò ferè interruptum, quia iidem existit valdè molestus.

Prognosis.

Aurium sonitus recens faciliè curatur, inveteratus, & chronicus difficilè & eò magis si ab affectione hypochondriacà, vel lue venereà originem traxerit; In senibus verò medelam non recipit. Diuturnus aurium sonitus h. e. si biennium, vel longius duravit raro curationem recipit, sed plerumque in surditatem degenerare solet. A capitis ictu curationem respuit.

Curatio.

Variant aurium sonitus curationem vulgares, non tantum juxta causarum diversitatem, verum etiam si ex alicujus partis consensu oriatur, primò parti affectæ curationem dirigunt. Qui ab aure primariò affectà exoritur, peculiarem requirit curationem: præmissis igitur iteratò cephalicis purgationibus, magnoperè extremorum frictiones, sternutamenta, masticatoria, & frequentes capitis percussiones commendant, nec non capitis lotiones cum decocto absinthij, ietonica, lavendula, rosis marini, sampsiuci &c. Nec lenes omittunt clysteres, quasi intestinorum sordes aurium sonitum excitarent.

Si aurium sonitus a calida intemperie excitetur, refrigerantibus & humectantibus utuntur, ut decocto *violarum, lailuce, nymphae* pro foru, qui si paulum iuverit, ad validiora recurrunt, ut est *succus portulacae, mandragorae, papaveris albi*. Vel evaporationem ex *cicuta semine in aceto lacteo* excipere jubent. His nihil proficientibus, opio utuntur in exigua quantitate, ut

*℞ opii gr. ij.
ol. rosi ʒ. ʒ. ʒ.
diff. & uere.*

Putant vulgares opium frigidum, quod falsum est, & rationibus, ac experimentis demonstravimus cap. de morbis soporificis in nostra Trutinâ. Hoc remedium genus est peticulo plenum; solet enim ut plurimum ita sensum auditus obrundere, ut in gravem auditum, vel surditatem multos incidisse observavimus.

Si ex humore viscido malum oriaur, totum, & caput deplent, deinde attenuantia, & discutientia auribus adhibent, inter quae auribus instillant *ol. amygdal. amarar. ruta, castorei, aut in aliquo ex praedictis decoquunt anethum, nicellan, nardum, castoreum, rutam*, quibus ad maiorem attenuationem acetum admiscunt. Laudant *caparum, aut porri succum cum lacte muliebri, vel cum oleo rosae, coctum*. Vel

*℞ Pulv. colocynt. ʒ. ʒ.
Succi Ruta.
Sampfuci ana ʒ. ʒ.
cumini,
carvi ana ʒ. ij.*

coquantur in vino, & *ol. amygdal. amar.* ad vini consumptionem. De expresso, & colato aliquid in aurem instilletur, & auris gossypio moschato obinetur. Vel

*℞. semin. porri,
caryophyll. ana ʒ. j.
mosch. gr. v.
cum succo sampfuci, & ruta m. & auri instilla.*

Majori cum efficacia supradicta auri instilletur, si prout evaporatio in aure fiat mane, & vespere ex sequenti decocto, ut

*℞. fol. majoranae,
rovis marini,
betonicae,
calaminth. ana m. j.
bacc. junip. nuin. xx.
fol. iauri,
ab. yntb. ana m. ʒ.
lupinor. nuin. xv.
lumbrie. terrest. vin. lotor. &
in fundo ligatur. p. ʒ.*

coquantur in suff. quantitate aquae, & duplo vini albi ad tertiam partis consumptionem. Colatura pro evaporatione servetur, qua dum utitur aeger, fabas, aut pisa aliquot in ore detineat, & masticet, ut parente ita meatu auditorio, fumus magis penetret.

Post evaporationem, & liquoris instillationem, sacculum calefactum auri imponunt repletum foliis *salviae, betonicae, sampfuci, hyssopi, calaminth. ruta, pini, iauri, rovis marini, floribus chamaemeli, staeadis, sem. anis. carvi &c.*

In aurium sonitu, si viscidus sit humor, purgantia cephalica conveniunt, deinde quae incidendi vim habent, nec desint diaphoretica in aquis appropriatis, quae per aliquot dies continuetur, quibus aliquid benzoardici lunaris addatur, cum omnia ex lignis parata proficua sunt, & interdum sternutatoria adhiberi possunt. Verum purgantia, aliaque nimis actia, ut & sternutatoria, quae tantum spiritus magis exagitant, sic frigida, & actia nervosis paribus

iam aduersa, nocent, ut & acida. In-
struatur totius ex caput corroboranti-
bus, qualis est decoctum abiyanni, &
vei benæ in lacte, ut

*℞. Abiyann. crudi, ℥
verbera ana m. j.*

decoque in lacte vaccino, postea per tri-
torum, quod commodè ollæ orificium
istius decocti claudat, decocti vapor ad-
huc feruentis in aurem immittatur, ab-
stersâ aure, gestetur aliquandiu gossy-
pium molchatum, est enim molchus
capiti amicus, in primis viris, mulieri-
bus verd inimicus ratione cloacæ s.
uieri idèdque commodè applicari po-
terit gossypium oleo castorei stillaritis
madidum. Si huic remedio cedere no-
lit, immittatur auri olei amygdalarum
amat. guræ duz, vel tres, quæ postmo-
dum emirantur. Verùm præ omnibus
præstat *panis calens statim è clibano ex-
tractus spiritu vini superfundus* (si affe-
ctus sit lenior, line) si ad aurem appli-
cetur, ut ille vapor intrò recipi possit.
Tandem si malum sit pertinax, immitta-
tur in aurem turunda ex raphani radice
affabre sculpta, & per aliquot dies in vi-
ni spiritu, vel aquâ Reginæ macerata.
Quod si neque per hoc solvatur, eadem
turunda maceretur in oleo fœniculi
stillaritis, & inter sudandum usurpetur.
In aurem instilletur sæpè oleum carvi,
& illiniatur post aures, & masticatoria
usurpentur,

CAPUT XXX.

De Gravi auditu, & Surditate.

Auditus triplici laeditur modo, vel
deprauatè, ut in sonitu, de quo
diximus, vel diminutè, vel absolutè. Mi-

minutio vocatur gravis auditus, abo-
litio dicitur surditas. Hi duo affe-
ctus ab iisdem pendunt causis, quæ
secundum magis, & minus differunt,
ita ut remissiores auditum tantum di-
minuunt, & valde excedentes prius
subtrahunt; idèdque sub uno capite
utrumque comprehendimus affectum,
licet uterque vulgò surditas appelle-
tur. Qui gravi laborant auditu sur-
dastri, & subdidi dicuntur, quia
sonos, & verba summissa voce prolata
penitus non audiunt, vel saltem confu-
sè absque significativarum differentia-
rum perceptione, fortiores autem vo-
ces etiam difficulter distinguunt, nec
alloquentes intelligunt, nisi fortis vo-
ciferatio fiat ad aures; qui verd efficiuntur
aut situ, surdi nominantur, hæc ullis
clamoribus aliquid percipere possunt.
Hi etiam muti sunt, si surdi nascuntur,
quia voces nec animo percipere, nec
linguâ proficere queunt, quamvis orga-
na ad articulatam vocem necessaria à
natura data sint, nisi tamen sermo-
nem articulatam proficendi rationem
didicerint, nunquam articulate lo-
quentur. Nec obstat, quod muti,
& surdi à nativitate sint satis ingeniosi;
nam auditus non est simpliciter sensus
ad vitam rationalem necessarius, cum
intelligendi vis sit ab auditu distincta,
& in furdo vigere possit ex phantasma-
tibus, quæ phantasia è speciebus
visibilibus, & aliis sensibilibus dis-
sumpta suggerit, multa intellectus
colligere potest. Infans, qui neminem
audivit, nunquam loquatur,
cum peficiat, quid sermo articulatus sit:
*Nihil est in intellectu, quin prius fuerit
sub sensu*, quia nullum articulare lo-
quutè antea audivit. Nulla idèo natis spe-
cies hominibus conuascitur, sed omnes
quas

quas audivere voces, exprimere sciunt: Neque sicut vita, ita sermo à parentibus in liberos transfunditur, sed temporis progressu auditu, imitatione, & usu defertur, ad quam rem auditus est necessarius. Voces articulatz non significant naturaliter, sed sunt institutz ex liberà hominum voluntate, & beneplacito ad quidpiam significandum, ut filiùs in logicis, ac proinde ut homo sermone proferat, non est à naturâ, sed ab auditu, & imitatione discit. Cæteris animalibus vocem naturaliter significantem natura dedit, ut canibus lattratum, leonibus rugitum &c. hæc sunt voces naturaliter significantes, & inarticulatz, ut & hominum gemitus, suspiria &c. quæ sunt pathemata naturalia. Cæterùm multum interest inter vocem, & locutionem, quia vox à naturâ data est, locutionem tamen à naturâ, quæ homini propria est, homo habere non potest, sed ex imitatione saltem addiscere ut humanæ vitæ politia, & societas servetur, est enim homo animal politicum, & sociabile, qualia cætera animantia non sunt: nullum igitur idioma nativum est. Hinc falsâ est illa vulgatis opinio asseverans: Si nemo coram infans recens natis vocem ederet, in adultâ etate natura, quæ nunquam defecit in necessariis, tenetur sermonem eis tribuere, nec alio idiomate loquerentur, nisi illo, quod Adam habebat. Etat stolidum vulgus, nam primi parentis sermo non fuit à naturâ, sed ad placitum, quia ipse fuit primus instituens, ut habetur Genes. cap. 2. num. 19. & 20. formati igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terræ, & universis volatilibus coeli adduxit, ea ad Adam, in videret, quia vocaret ea: Omne enim

quod vocavit Adam anime vivæ, ipsum est nomen ejus. Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animalia, & universa volatilia Cæli, & terræ. Præterquam quod hanc quæstionem philosophi, & medici melius exagitate solent: An articulatz vocem præferendi sex loquendi potentia sit hominis naturalis, an vero saltem ab imitatione, dum quisque sermonem, quem alium loqui primò audivit, & ipse diligit, & loquitur. Non defuerunt aliqui in eâ sententiâ, qui infantem sibi relictum, tandem sponte locuturum affirmant. Verùm notissima est historia de Rege Maphuch, is triginta infantibus recens natis in locum solitatum inclusis, nutritibus eorum hoc negotij dederit, caverent, ne vocula ulla ad eorum aures perveniret, ut experiretur, quoniam idiomate aliquando essent usum, acque adeo ejus nationis religionem amplecteretur, cujus infantes linguam proferrent. Sed cognovit tandem Rex ipse vanissimum fuisse laborem, siquidem ipsorum nullus distinctè locutus fuit: firmum igitur restat, quod qui loquentem neminem audivit, nec ipse loqui potest, sed cum quisque sermonem loquitur, quem alios loquentes audivit & nulla idiomatis species homini commascitur.

Cum à natiuitate surdi etiam muti sunt, alij aliam adducunt rationem scilicet maximam sympathiam, & consentum auditus & loquelæ organorum; lingua enim cum præter alios nervos, quibus ad sensum indiguit, etiam à nervo illo quinti paris in aurem tendente, siue alium acceperit: Si hic nervus auribus & lingue communis vitiolum habeat constitutionem, accidit, ut non solum surdi tales fiant, sed etiam muti, & ipsam insufficienter, & quantum ad

voce articulatam opus est, movere non possunt, & si sensum & aliquem motum ob reliquos nervos integrum habent. Rationem adducunt, quia à nativitate surdi, si loquelæ organa non haberent vitiosa, aliquam vocem ex natura instinctu articulatam ederent, quemadmodum Cætera animantia etiam si à nativitate ab alijs ejusdem speciei separentur, communalem profertunt. At surdi à natura nullam vocem edunt articulatam, sed tantum confusum sonum, qui partium loquelæ inservientium manifestam arguunt læsionem.

Verum horum opinionem falsam his deprehendimus rationibus: Primò, si consensus iste nervi quintæ conjugationis hujus rei esset causa, necessario sequeretur etiam post ortum, & in adultæ ætate idem accidere posse, nimirum si post ortum nervus auditorius vel obstruatur, vel crassior fiat, ut inde auditus vel solum diminuat, vel profusus aboleatur, tum enim necesse erit, ut locutio eadem modo vel diminuat, vel aboleatur, quod tamen non accedit, ut experientia testatur auditum & loquelam varias læsiones seorsim, & privatim suscipere, & auditum ledi posse, saluâ Loquelâ, & contra. Secundò, multi difficultati à nativitate audientes inveniuntur, qui expedite loquuntur, & contra. Tertio non semper surditatis causa est in origine quinti paris nervorum, à quo oritur nervus auditorius, & qui mittitur ad laryngem sed quandoque surditas à nativitate oritur ab alijs causis; læso enim quolibet interno aurium instrumento, surditas oboritur, si nimirum à primâ generatione in malleolo, in cude, stapede, in utraq; aurtis vitium sit. Tamen auditus & conse-

quenter loquela lædi potest, nullo vitio in nervo quintæ conjugationis auri, & laryngi communi existente. Quod idem accidere potest, si meatus auditorius obstruatur, aut tympanum vitietur aut aer implantatus sese non recte habeat. Ex dictis patet surdos à nativitate non fieri mutos ob consensum nervi quintæ conjugationis, qui auri & laryngi est communis, restat igitur surditatis vitium à privatis læsionibus in aurium organis provenire.

Signa.

Gravis auditus & surditas per se patient, causarum verò signa sigillatim distinguere difficillimum est, conjecturâ tamen in hunc modum distinguî possunt. Si surditas à nervo auditorio, & ejus interno meatu contingat, præcesserunt affectus, vel adiunt in cerebro, ut capitis dolor, gravitas, apoplexia, epilepsia, lethargus &c. & alij etiam sensus læsi sunt. Si in solo nervo auditorio sit vitium, reliqui sensus erunt integri præcessit tamen necessariò aliquis cerebri affectus, qui nervum auditorium degenerare sine obstruatum esse restat. Si obstructio sit in interno auri meatu, oculis conspicitur, & instrumentis explorari potest. Si aliquod extinctus in aurem immittitur sit, egrorantis relatione patebit. Tympani laxitas ex humidantibus causis cognoscitur, exsiccario ex exsiccantibus. Si ex implantati aeris crassitie proveniat, ex incassantibus facillè deprehenditur, distinctio ex diuturnis, & erodentibus. Verum adeo exactè non semper cognosci potest, quænam auri pars in surditate laboret, eam facillè hæc conjectura, & alie quælibet medi-

um decipere possint.

Cause.

Surditatis causa nunc hæret in externâ auris cavitate, nunc internâ, nunc in tympani membranâ, nunc in aëre implantato, nunc in nervo, nunc in spiritu animali.

Causa hærens in externâ auris cavitate, tuberculo, abscessu, saniei, aliisque rebus tum intrinsecus, tum extrinsecus aures obturantibus debetur. Advertendum tamen est, meatus exterioris obturationem absolutam surditatem non posse induere, sed tantum gravem auditum, quia quandoquidem per os etiam ad aures soni deferri possunt; etenim meatus patens est ab auris cavitate ad palatum, per quem soni facile ingrediuntur, & ad aures sese insinuant, qui meatus etiam aurium expurgationi dicatus est. Et sonum per os patens excipi multa ostendunt experimenta, videmus enim multos surditos, ut melius loquentes audiant, aperto ore sermones eorum excipere. Et si utraq; aures diligenter obturata, musica instrumenta baculo contingas, quem dentibus apprehenderis, exquisitius audiuntur. Et vix noctu alicujus procul adventus strepitum capimus, at è longinquo magis audimus, si baculi alterum extremum terra affigamus, alterum verò dentibus apprehendamus. Verum id melius assequemur, si aurem terra admoveamus qui mos lupis insitit est à natura, lino utraq; auro fortiter & diligenter obturata, si per tubulum enique capitis parvi procul ab aure admotum verba pronuncientur, clarè, & distinctè audientur, quod experimentum magis pro-

bat, quam nos probare intendimus.

In internâ auris cavitate gravem auditum, vel surditatem efficiunt degeneres succi & secundum Hip. quandoque biliosi sunt, ut *sect. 4. aph. 28. Quibus biliosa sunt deiectiones, hæ superveniente surditate, cessant: & quibus surditas adeest supervenientibus biliosis deiectionibus, cessat.* Existimabat enim Hip. surditatem fieri excrementis biliosis retentis, & ad caput recurrentibus, talemque surditatem cessare, alio turbata, & bile per inferiora dejecta, dummodò hæctica non fuerit surditas, sed repente in febribus facta, quod tamen falsum est. Interdum sanguis surditatem efficit, cum funuram crilin per natum hæmorrhagiam significat, ut idem innuit *sect. 4. aph. 6. Quibus in febribus aures obscurantur: sanguis ex naribus stans, aut alius turbata solus morbi m.*

Tympani membranula graviolem auditum efficere potest, si ab externo aëre frigiditatem contrahat, quia *figendum nervis & membranis insensum est*; Vel si narcoticorum usu obtupefcat; vel crassior reddatur, quæ causa in senibus frequens esse solet, ut enim oculorum tunica in senibus screscit, & obscuriores redduntur: ita quoque procul dubio ætatis progressu hæc membranula aliquam suscipit mutationem, & hac de causâ habetur *sect. 3. aph. 31. Gravis auditus est senibus familiaris.* Eadem quoque nonnunquam rumpitur externâ violentiâ & surditatem efficit, ut ab auri calpio, aliove instrumento violenter intruso, apostemate rupto, casu, percussione &c. Hoc idem efficere

possunt immanes fragores repentini, quales majora tormenta bellica, tonitrua &c. facile aëris commotione illam lacerare possunt, continuèque solutionem inferre quemadmodum etiam displosa tormenta bellica propinquas concutiendo, fenestras dissilire faciunt, ab ejusmodi enim violentiâ inierdum sunt sanguinis grumi, nec non abscessus, sordesque relinquunt, aurium foramina obstruentes. Quandoque tympani membrana ab aëris humiditate relaxatur, & quam plurimî sordidissimi in austrinâ constitutione, graviores habent auditum, ut habetur *sect. 3. aph. 17. Auditus hebetatur ab austrinâ constitutione*. Vel nimis tenditur, exsiccaturque post morbos acutos, vigilias, aut jejunia. Ità etiam si ossicula illa tria, quæ huic adiacent membranz, loco dimoveantur ictu vehemente, sonitu, vel humoris alicujus affluxu, auditus gravitas, vel surditas subsequitur.

Aër implantatus, seu congenitus gravem efficit auditum, si crassus, humidus, vel impurus reddatur, qualis in austrina constitutione, vel in regionibus uliginosis, uti in Belgio solemne est, ac proinde gravis auditus olim vocabatur : *Auris Batava*. Quare propter sicut visus organum lucidum esse debet, ut objecto respondeat : ità auditus organum aëreum omnem impuritatem excludens. Flantibus austris, ventis, vel regionibus uliginosis existentibus, aër crassus, turbidus & caliginosus redditur, non modo in aëris regione veteri etiam in internâ auris cavitare, qui implantato aëri se se permiscet & debiles repercutit sonos, unde aurium tumitum excitat, qui auditus gravitatis, & surditatis præcipuus est. Id evenit non ali-

ter ac fumus in tali aëris constitutiōe ab igne focorum ascendens in caminatum fastigijs ab externo, spisso & humido aëre repetitur, ità ut talis fumus repercutio sit certum pluvie & tempestatis signum, indicetque aëris spatia vapore aquoso jam esse repleta & alios vapores, ut est fumus, in se recipere non possit. Item vapores crassi à malâ vivendi ratione, & diutè erroribus cerebro communicari, si interiorem auris cavitatem per foramen, quod nervus auditorius transit, se insinuant, hoc malum efficere valent.

Nervus auditorius surditatem efficere potest, si exsiccetur, aut obstruatur ejus medulla ab humore intra ipsius membranas contento, vel comprimat à quovis tumore vicino. Si male sit conformatus, vel recte aut non infatur & hoc modo surdi ab infantiâ fiunt.

A spiritibus auditus lesio oritur, tùm cum à morbis vel depopulatur, vel non transmittuntur, vel cum immobiles redduntur ad tempus, ut in apoplexia, catro, catalepsi &c.

Prognosis.

Surditas miserandum malum est, aures enim sunt veluti mentis porta per quam mentis ea immittuntur, quæ doctrinâ & institutione ad vitam politicam & sociabilem transigendam necessaria sunt : misterum itaque eum hominem esse necesse est, qui audiendi facultate destituatur, cum hoc adminiculo ad vitam incolumem tuendam careat. Ceterum miseres sunt, qui surdi & cæci sunt, actandè qui surdi, cæci & muti sunt.

Gravis auditus & surditatis prognostis ità se habet : auditus gravitas est malum non contemnendum, si brevi nō discutiatur, temporis cuniculo sensim in-

Increbescens plerumque tandem in omnimodam transit surditatem.

Surditas nativæ curationem non admittit, sic & quæ diuturno tempore contracta fuit, insanabilis omnino censetur, estò multa extant exempla quorundam curatorum, qui per multos annos tardi fuerint; id eam raro contingit, multoque plures sunt, quibus frustra adhibentur remedia. Surditas ex obstructione in meatu externo facilius curatur, difficilius in meatu interno, & auditorio. Tympani membrana rupta, vel erosa, vel cicatricem superstitem nacta, aut ossicula luxata immedicabilem reddunt surditatem. Surditas, quæ modò crescit, & modò decrescit, facilius curatur, sit enim ab humore renui, & exiguo, qui interdum minuitur, vel à flatulento spiritu. Surditas, quæ per aurium idiopathiam excipitur, facilius curatur, quam quæ per sympathiam. Surditas in febribus contingens, cum eà plerumque solui solet, ut *sect. 4. aph. 28. surditas in febribus solvitur biliosa dejectione*. Sed quandoque moris prænuncia est, significat enim audiendi vim per motui vehementiam extinctam esse, & pravi humoris copiam cerebrum, & aures occupare, ut eadem *sect. aph. 49. Auditus deficiens in febribus continuis signum lethiferum*, & *sect. 8. aph. 16. in acutis febribus non audiens est moris proximus*.

Curatio.

Curatio pro causarum diversitate varianda est, semper tamen præmittenda sunt universalis S. corpus purgantis, & caput mundificantia, quæ ubi necessarii sunt per intervalla repetenda sunt,

in surditate autem purgantia frequentiora, & fortiora sint, quam in gravi auditu, deinde topica auribus applicanda sunt.

Surditas originalis conformationis vitio, audiendi instrumenti defectu, aut aliquâ aliâ virosa figurâ incurabilis est, cum illud, quod natura semel ademit, à medico nullo pacto reparari possit, est ejus sanatio soli Deo reservata. Adventitia non raro curationem recipit.

Quæ aliquo cerebri, vel aliarum partium defectu originem trahit, non aliam requirit curationem, quam quæ dictis destinatur affectibus, & à propriis capitibus desumenda est. Quæ à tuberculo, sanie, aliisque cum intrinsecus, cum extrinsecus observantibus de ender; atamen si auditus gravitas, vel surditas sit ab auri ulcere, ejus curatio instituenda est, ut de ulcere aurium diximus; atque hic abstinendum est ab oleis, nam oleum est ulceribus inimicum, & præcipue ulceribus aurium.

Si degeneres succi in internâ auri cavitate gravem auditum, vel surditatem efficiant absque insigni aliquâ instrumenti auditus læsione, evacuatis per alvum, vel per nares effusis, vel insensibiliter discussis succis, malum sponte cessat.

Si tympani membrana ratione frigoris gravem pariat auditum, per applicata debellativa perficienda est curatio, & efficacissima erunt olea ex penichymico, qualia sunt *oris marini, sampsonis, lavendule, caryophyllorum* &c. quæ nunquam ob nimiam vehementiam sola non sunt usurpanda. Si à tympani membrana rupturâ, vel corrosione surditas pendear, curationem non recipit, ut & gravis auditus

R. 4. à præ.

à prædictæ membranulæ crassitie, ut senibus accidit. Si à membranæ siccitate oriatur affectus viciu humectante, somno longiori, & capitis humectatione vitandum est, & in aurem humectantia immittantur, ut *oleum amygdalarum dulcium*, & similia.

Si tympani membrana sit relaxata in nimia aëris humiditate, vel congenitus aër crassitiem, & humiditatem adeptus sit, & gravis auditus in causâ sit, vitetur austrius aër, viciu exsiccans instituat, & præ omnibus aliis medicamentis masticatoria conveniunt propter meatum, qui ab interna aures ad palatum defertur, & aurium excrementa deponit. Si morbus contumax sit, & in longitudinem abeat, dicta sudorifica hic maximè locum habet.

Hujus curationis summa erit, ut dicta medicamentis, & causarum varietati respondeat, vitando cibos, qui crassum generant alimentum, & vaporosum, in primis allium, sitapi capas &c. quæ auditui nocent. Aër sit purus, æger austrius vitet ventros, & ab iis muniat aures. Primum instituat universalis evacuatio, & si affectus pettinax sit, diaphoretica pluries recensita profunt, ut diximus. Vulgarium cauteria, & vesicatoria maximè nocent. Sternutatoria hic non utique aded tuta sunt cum incertum sit, quò humorum motus ex vehementi illa agitatione concitatus vergete possit. Vulgarium frictions inutiles sunt, & mortuum potius, quàm lutum excitarent. Peculiariter post corporis deplecionem multum valet de manè *Tritholi sudasorium in Puteolano* & de serò sulphuris sumus per infundibulum in aurem excipiens in fero Vulcani. In Insula Pithe-

ense valet sudatorium sancti Angeli, vel balneum Plimstelli, vel furnelli. Nostrates vulgares maximopere commendant *Sudasorium Aniani*, dictum balneum siccum ad hunc, & alios affectus, verum ejus exhalatio est ethereogenea, & propter Mephitis viciniam majora damna, quàm commoda in capite, & thorace recepta producit, & nos multos in animi deliquium & syncopen incidisse observavimus.

Interim topica applicentur, & in aurem instillentur, talia sunt *oleum amygdalarum amararum*, *anguilla pinguedo*, *axungia talpa*, *pinguedo serpentis*, *agua e ligno fraxini destillata*, *agua origani ex sicca planta cum vino destillata*. Efficacissima sunt olea attechymica destillata, *ruia*, *castorei*, *orris marini*, *sampjuci*, *salvie*, *baccarum lauri*, *caryophyllorum*, *cinnamomi*, *philosophorum*. Maximopere commendamus *balsamum sulphuris spiritui vini extractum*, *fel animalium*, ut leporis, capra, perdicis, vel corvi, si cum olei succini equali parte miscetur, & in aurem immitatur, sed præstat *essentia fellis per vini spiritum extracta*, quæ curatos esse multos aiunt, qui planè surdi fuerint, attamen mirabiliter operatur *essentia fellis humani spiritui vini extracta*.

Multum prodesse poterit succus ex capâ expressus, vini spiritu jmbutâ, & sub cineribus cocta. Item præ omnibus sequens experimentum, ut

℞. Capam magnam rubram in medio excavatam, cujus cavitatem reple olivæ, addendo puti. cyperi, bacc. lauri,

*hacc. lauri,
anisiforme,
camini ana 3. j.
castorei pulu. 3. B.*

*Brilliant omnia super prunas ardentes,
postea exprimantur, & servantur in phia-
la, de quo stillentur guttae aliquot in
aures manè, & vesperti, claudendo eas
gossypio moschato. Expertissimum quo-
que medicamen est liquor destillatus ex
melle, & formicis.*

*A nonnullis laudatur panis ordinarius
ex clauo extractus, & inferiori crusta
ablata, qui in spiritum vini immergatur,
& calidè quantum aeger ferre poterit, ad
aurem applicetur. Alij extollunt spiri-
tum vini, in quo eleborus albus fuerit in-
fusus, & in aurem instillatus.*

*Tandem sequens expertum medi-
camen turò in aurem instillari po-
test.*

*℞. Senecionem serpentis,
ovor. formicar. ana 3. j.
concunde opt. affunde
ol. sampuci lib. 3.*

*Inde aludeli, & per mensem chymicum
fens in ventre equino, & habebis oleum
penetrans, quod cum gossypio manè, &
vesperti in aurem instilla.*

C A P. XXXI.

De Narium Ulcere, & Ozæna.

PUrarunt tam veteres, quam recen-
tiores nates esse cerebri emuncto-
ria, & per eas veluti per canalem ex-
crementa fluere; nihilominus habent
nates sua peculiaria excrementa, quæ
pro cerebri excrementis venduntur in-
cidentes. Ab his excrementis non patien-

tur nates, dum ea foras exturbantur,
quia propria, & victa sunt, ceu non pa-
titur oculus à lacrymis, ab urina vesicæ,
à fecibus intestina, à saliva os &c. quia
horum excrementorum sunt propria
emunctoria. Possunt quandoque ab his
excrementis pati nates, siquid exoti-
cum, & præter naturam associetur, ex
quo oritur ulcus, ozæna, carcinomâ
&c.

Ulceratio incipit in naribus nul-
lum aliud speciale habet nomen, nisi
ulcus recens, & simplex, quod frequen-
ter occurrit; ac tamen si ejus curatio
negligatur, temporis progressu ex afflu-
entibus sordibus, & causæ malitiâ incre-
mentum sumit, & in ulcus sordidum,
putridum, vetustum, & graveolens de-
generat, quod ozæna vocatur.

Signa.

Ulcus recens, & simplex nullum, aut
exiguum excitat dolorem, & nates icho-
re madent, dum attinguntur, vel irri-
cantur; alioqui sicca & nigra obducitur
crustula, quæ nisi vi excutiat, aresce-
re solet, sponteque sanatur. Vetiùs si
violentius tangatur, vel detrahitur,
aliquid sanguinis excludit & emunctio-
nis impetu non raro exploditur, & no-
va crusta subnascitur spissior, quæ dum
diutius hæret, perpetuò sub eâ aliquid
exeditur, & majus efficitur ulcus, quod
si negligatur, tandem in dies deprava-
tur, donec in ozænam degeneret.

Ozæna dolorem ulcere majorem in-
fligit, illius crusta sordidior, humidior
est, & graveolentiam exhalans, retrem-
que reddit odorem, ut æger non tantum
sibi graveolens, sed etiam adstantibus
terri odoris expiratione molestus, &
abominabilis sit.

Causa.

Ulcerum recentium & simplicium causam internam putant vulgares esse humorum fluxionem in nares, vel à cerebro, vel à partibus inferioribus: huiusmodi humores sunt bilis, vel pituita salsa, id patet in catarrhosis fluxionibus, quod nonnunquam natium cutis eroditur, & ulcera excitantur.

Ozæna causam esse humores acres, putridos & malignos; causam verò antecedentem esse cerebri intemperie ejusmodi humores coaceruantē aut intemperie in aliquibus partibus inferioribus, vel in toto, quæ capiti communicatur; vel occultam viscerum malignitatem; ut in lue venerea.

Fluxio, catarrhus, viscerum intemperies, causa occulta, putredo, malignitas &c. quam vulgares in medicinam intulerunt, quemlibet agasione fecit medicum. Errant vulgares in ulcerum natium & ozæna assignandā causa: non à cerebro per descensum, neque à partibus pendent inferioribus per ascensum, quia cerebrum, inferioresque partes, per quas transeunt, primum exulcerarent, deinde natium partes.

Sunt nares emunctoria & sua peculiaria habent excrementa, in quibus quandòque particula acidolalina deli-tescunt, & alimenentum sequuntur succum ad partium nutritionem usque & levi data occasione patefcunt, cum excrementa in natium cavitare separantur, si desiccantur, simplicem exedendi energiam nanciscuntur, pruritum excitare, sensum excoriant, & simplex efficiuntulcus. Quod si hæ particula existerent, sensum in acutas, corrosivas & sceticas degenerant, ac potissimum ulcus sordidum crustosum, putredum, ve-

tustum, & graveolens generatur, quod ozæna vocatur. Fit quandoque ex tuberculo in naribus orro, & suppuratur, vel ex causis externis scilicet a vulnere, vel contusione in puris generationem transeunte.

Prognosis.

Quilibet natium ulcera plerumque curatu difficilia sunt, & cacoethe, cum ad deteriorationem proclivia sint, idèdque perpetuo pro suspectis habenda sunt ob prava symptomata, quæ excitare possunt, quia ut plurimum leditur respiratio, cum ulceris crusta nares obstruat, vel si in sarcoma, vel polypum degeneret: quandòque natium fœdâ depressione deformatur: interdum vox viciatur, quia malum palato communicatur, sub quo, tanquam sub testudine, vox reflectit: Quandòque natium hemorrhagia annectitur, natium venis ab ulcere erosio. Verum si simplicia, recentia, superficialia, munda & externa sint, facillimè curantur.

Venusta, putrida, crustosa, interna, profunda & fistulosa difficillimè sanantur. Si diutius durent, paulatim longius serpunt & effodiunt natium pin-nas, earumque interititium, vel tenella nasi ossa, præsertim cartilaginem exedunt; quandòque putrefactivâ exesione palatum perforant, & ad cerebrum usque serpunt, ossa primum, quia densitate suâ, magis resistunt, exedunt, deinde carnem, quia rara & foraminata.

Cyratio.

Vulgares in natium ulceribus eadem indicationes, quibus alia ulcera curantur.

tutant, observant; idedque victis rationem prescribunt, quæ humorum actionem temperat, & eorum generis inhibet. Mox si superflui redundent humores, corpus convenienti deplent phatmaco, phlebotomiâ & cucurbitulis cum scarificatione. Si fluxio in nares sit valde contumax, eam derivant vesicatorijs, cauterijs, posterioribus capitis partibus admotis. Caput ipsum, fluxionis fontem, exsiccant, roborantque. Deindè ulcus detergunt, exsiccant & consolidant.

Caput ad cutem usque deradunt, & frequenter fricant oleo myrsino, pulvere corall. santalor. & aceto ad maiorem penetrationem; mox sequens concinnant cataplasma abrafo capiti imponendum, ut

℞. Limacum num. viij. conundantur, & admisceantur pulv. ros. rubr. siccat. Santalorum, & balaustr. ana 3. j. myrrha, manna iburis, & mastiches ana 3. ij. gummi sandarach. 3. j.

Conquassentur cum album. ovorum num. ij & f. s. a. cataplasma linco obducendum, quod capiti applicetur, deferaturque per novem dies continuos, non aliter ac si caput tineâ laboret.

His præmissis, ad ropica deveniunt, ac primum si ulcus crustosum sit, crustam auferunt, eam emolliendo fotu, vel vapore aquæ tepida, butyro recenti, anseris, vel gallinæ adipis loto prius aliquoties aquâ rosarum, oleo amygdalarum dulcium, & similibus. Crusta emollita non est vi excutiendâ, ne ulcus irritetur & fluxio concitetur, sed ejus casus spontaneus est expectandus, nate

emungendo, vel eam digiti extremitate detrahendo, vel per sternutationem exterminando.

Crustâ semotâ, quæ ulcus adstringunt, & exsiccant, usurpant; eluunt ulcus aquâ saccharatâ ad demulcendos humores acres, aut viro albo, in quo mel incolatum, sit vel aquâ hordei cum melle rosaceo, deindè illiniunt unguento desutiâ, albo Rhasis &c.

Ozoena validiora expostulat remedia, quàm ulcus, idedque ad extrema confugiunt, ut

℞. Hord. integri p. j. agrimonia, absynth. Centaur. min. ana m. j. ros. rubr. & balaustr. p. ʒ. cortic. granat. & nucumcupress. ana ʒ. ʒ.

Coquantur in aquâ ferratâ, & in colaturâ dissolva

mellis ros. ʒ. ij.

& frequenter naribus, attrahatur. Post ulceris detersionem sequens decoctum usurpandum censent ad ulceris exsiccationem & consolidationem.

℞. Radic. bistorta, & aristol. rotund. ana ʒ. ʒ. myrrha, & aloes ana ʒ. ij ʒ. summit. sabina m. ʒ. alum. crud. ʒ. j.

Coque in aquâ commun. Deindè sequenti illiniunt unguento.

℞. Aloes, myrrha ana ʒ. ʒ. gallar. ʒ. j. Lithargyri, cerusse ana ʒ. j. ʒ. plumbi asti, & loti ʒ. ij. cum ol. ros. q. s.

f. Vnguentum.

Si hæc non sufficiant, ulcus aquâ plantaginis, in qua sublimatum dissolutum fuerit bis, ter, quaterve in die abluunt, vel unguento Aegyptiaco in aquâ hordei dissoluto.

Tandem ulcere deterfo, ad exsiccantiam deveniunt, pro quibus Rondoleius laudat candelas ex cerâ rubrâ paratas, si talis candela fuligo in cubiculo angusto, bene clausa, naribus excipiat, quia potenter ulcus exsiccatur: verum exsiccatur, & comburit, potius utilissimum erit id oleo ceræ illinare, quam suffumigare. Vel idem valde decantat elicacissimum suffumigium ex auripigmento, & cinnabari, quibus addita aliqua odorata ex quibus fuligo excitatur, ut est myrrha, thus mastiche, benoinum &c. & ulcus siccatur. Cæterum insalubre suffumigium est, imò lethale tantum ob auripigmenti admissionem; est enim auripigmentum arsenicum citrinum, seu flavum, & leprosum continet virus.

Si ulcus sit corrosivum, ne profundius serpat, usurpant acetum salitum vel vinum salitum credimus potius ad maiorem corrosionem, quam ne profundius depascatur. Vel decoctum ligni guaraci, in quo dissolutus parum unguenti Aegyptiaci: sed tale unguentum ob viride æs, & acerrimum acetum vehementer habet acrimoniam, ulceribus hostilem; præcipue ubi adest ossis exessio, illud nigredine inficit. Optimæ notæ chirurgi huius unguentulum veterinarijs relinquunt.

Receis & simplex narium ulcus facillime curatur, nullis præsidijs præmissis. Si crusta obducatur, oleo ex ovorum vitellis removeatur, deinde hoc uteretur hinc inde ab eo ex succis refrigerantibus.

℥. Succ. sambuc.

solani,
plantaginis
herbe alleluja,
& viol. ana lib. ℥.
cerussa lib. j.
ol. viol. lib. iij.
cera alba lib. i
Lithargyr. anr. lib. ℥.
f. ung. f. a.

Quod si lechore mader, & pigre in unio- nem abeat ex quodam succi alimentitij torpore, tunc ℥. Croci Martis, & ulcus bis in die eo aspergatur, & infra duos dies ulcus consolidatum erit. Vel hoc nostro utere unguento, quod brevi omnem absoluit curationem:

℥. ol. ros. lib. j. ℥.
cera virginea ℥. iij.
cerussa,
lithargyr. aurei,
plumbi ussi, & losti ana ℥. ij.
citra præp. ℥. ℥.
croci Martis ℥. iij.
Sach. Saturni, &
camphoræ ana ℥. j.
f. ung. f. a.

Vel

℥. Aloës in aq. plantag. lota ℥. iij.
myrrha ℥. ij.
Sarcocolla,
irios ana ℥. j.
cerussa,
antimonij crudi,
rutia,
miny ana ℥. j. ℥.
ol. hyperic. &
ros. ana ℥. ij.
mell ros. simpl. ℥. j.
succ. dragontæ,
& pilosella ana ℥. ij.

Bulliam succi in oleo ad ætherum consump-
tione æ, acitæ aduc meli ros. & diutina
cæ.

etiam in subtilissimum pulverem redacta, addendo.

bencini 3. j.

mosch. gr. v.

℞ f. ung. f. a.

Quàm efficax sit hoc unguentum in narium ulceribus, ex effectu cognoscet. Multum valet in ulceribus narium infusio lapidis medicamenti.

Ozœnâ difficillimâ est sanationis, idèoque efficacissima exposcit medicamina, unde præmissio purgante convenienti, succus nutritivus ab impuritatibus & particulis acido salinis exaltatis est mitigandus & ad naturalem crasim est redigendus medicamenti diaphoreticis, eâque hebetantibus. Omnia, quæ acrimoniâ, & acutiem à parte affectâ tollunt, & cortigunt, conveniunt, ut sunt absorbentia, præprimis cancrorum oculos sapius & per vices assumptos commendamus. Interdum potiones vulnerariâs adhibemus, quibus sibi diaphoreticum addimus.

Quò ad topica efficacissimum est hoc nostrum unguentum magistrale, ut.

℞. Lichargyr. aur. 3. viij.

cerussa 3. iij.

tuna præp. 3. β.

plumbi usti & loti 3. j.

merc. sublimati dulcis, &

antimonij crud. ana 3. β.

cinnabaris 3. ij

cera lib. β.

ol. ros. lib. j. β.

f. ung. f. a.

Credibile non est unguentum hoc quantum valeat non tantum in ozœnis, verum etiam in omnibus ulceribus etiam recentibus, & præsertim Venereis, putridis, malignis, vetustis, & exedentibus. Mundificat, carnem bonam

producit, consolidat, putrefieri, ac corrumpi non finit, nec malam carnem excrescere, & tandem sanat unâ hebdomadâ magis quàm aliud integro mense.

Præstans est aluminis aqua ex arenâ sine spiritibus destillata, & aqua plantaginis, in qua aliquid de mercurio dulci dissolutum fuerit: sed præstantior est aqua nostra Venerea, ut

℞. Viridis aris 3. j.

aqua font. lib. iij.

Stent simul in calore digestionis, donec aqua cyaneum sit nâta colorem, in decantata, & filtratâ aquâ dissolve mercurij meteorizati grana aliquot. Hac aquâ nos etiam familiariter utimur in persanandis pustulis, cariebus, ulceribus, & in gonorrhœa per siphunculum. Multum præstat sequens, medicamentum, ut

℞. Aqua sampsuci.

plantaginis ana 3. j. β.

mell. ros. 3. vj.

spiritus vini rectificati 3. iij.

quibus aliquandò addi possunt.

merc. meteorizati gr. ij.

Præstantissima est aqua viridis Johannis Hartmanni, quæ non tantum ozœnas, verum omnia fetida ulcera palati, faucium, columelle, gingivarum, lingue &c. cujus compositio est.

℞. Melli. ros. 3. ij.

sulph. vivi,

alam. crud.

argutinis aseris ana 3. j.

albi greci,

comar. sabine ana 3. β.

sambuci 3. j.

fol. hyperic.

oris marini,

rula,

plantaginis

salpæ,

pulegij ana m. β.

Hec coque in vini & aquæ lib. ij ad consumptionem digiti transversæ unius. Aerugo eris non simul coquatur, sed in finē addatur, & relinquatur, donec refrigeris, postea coletur, & servetur ad usum.

Nonnulli commendant fumum ex candela rubra, quam ceram hispanicam vocant, quia cera rubra in sua compositione cinnabarim admittit, præstat tamen sequens suffumigium.

℞. Thuris,

gummi anisi ana ʒ. ij.

cinnabaris ʒ. j.

m. f. pulvis.

℞. formetur sex sbedula pro suffumigio carbonibus iniiciendæ.

C A P. XXXII.

De Coryzæ.

PRæter ulceta & aliud malum patiuntur nares, humoris scilicet excrementitij fluxum, qui à græcis coryza vocatur, à Latinis gravedo, quia in anteriori capitis parte circa frontem quidam gravitatis sensus molestus percipitur. Est catarrhi species cuilibet nota; vix enim ullus, qui eam multoties non sit expertus, reperitur. Est obstructio ossis ethmoidis à narium excremento.

Signa.

Affectus iste per se patet, nam plurimum excrementum per nares cum strepitu excernitur, nunc liquidum, nunc spissum, & quandoque nihil Nares opplenitur, caput gravatur, respiratio ita difficilior redditur, ut æget non nisi

hiante ore respirare possit, undè odoratus abolitio succedit, vox fit rauca, & non sonora & clara, ut antea, quia larynx, & guttur eodem afficiuntur excremento, & hinc gustatus læsio.

Causæ.

Fluxionem à cerebro in nares deploentem pro coryzæ causâ assignant vulgares; fieri enim destillationem ab humoribus crudis in anterioribus cerebri debilitati ventriculis, contentis dijudicant. Hæc destillatio, seu fluxio fit vel à causa calida qui pituitam in cerebro collectam fundere, & liquare potest, vel à frigida, qui cerebrum refrigerat & spongiæ instar humorem in illo contentum comprimit, & ad nares obligat excernendum. Tum etiam cerebri refrigeratione fit novus pituitæ preventus & illum caloris penuria malè concoquit, undè plurima excrementorum supellex, quæ à facultate expultrice per patentem ductum excluditur. Non confutamus coryzæ causam à Galenicis allatam, quia *Trutina Medica lib. 1. cap. 7. de catarrho*, ad nauseam usque eorum nares explodimus.

Coryzæ occasionalis causa est aura frigida vespertina, borreæ status, repentina caloris in frigus mutatio &c. calor enim poros aperit, quos, si extemplo frigus insequatur (frigus namque ex particulis acutis, acidis, nitrolis acris in aëre volitantibus constat) contrahit, atque ita spongiosum os ethmoides, prægresso calore, maxime apertum est, insequente subitaneo frigore, obstruitur, undè læsæ partis functiones, & digestiones statim vitiantur, interim narium spiritus peregrinû sentiens

hostem, læssitur, in suis actionibus perturbatur, suumque relinquit munus ac partis alimentum, aliàs vividam, fit degener, & initio magnâ laticis quantitate, aquæ salso-acidæ instar ad sordeas elevandas provocat, & per nares ex stillat, quam ægrè ferentes, solent inde cum adiacentibus phlogosi tubere, & tumesceri. Quod sit latex in coryzæ principio, patet, nam mox à biduo alvus sicciior, & urina redditur parciior. Deindè topicum interturbat alimentum, & degener sub mucis formâ profundit, non aliter ac festuca in oculo continuas proxiat lacrymas, angina indelenscens, & mucidam salivam spumat; Dysenteria proprium intestini nutrimentum mucosum cum sanguine exturbat; vesica continuum deturpati alimenti plorat mutum, præsentè calculo, qui cessat, illo absente.

Coryza odoratum suspendit, & gustatum lædit, quia peregrinus hostis non solum circa odoratus organum, sive ossi spongioso insidet, verùm etiam in vicinùm cerebrum labes propagatur; unde nerui gustatus contagii fiunt participes. Quandòque sicca tussicula cum asperæ arteriæ pruriginè infestat. Interdum raucedinem facit, & non ratò tintillationem in larynge proxiat, quia labes in has partes propagatur. Laudatur spissior, tenacior, fluidiorque mucosus, quia excrementa crassescere, bonum; indicat enim custodem ad suum redire munus.

Prognosis.

Coryza est affectus levissimus, & tutissimus, & citò curatur, si recens fuerit, & a causâ concitatus externâ, sed solummodò, si latex fuerit nimio salso acido saturatus, exulcerare solet, & ul-

ceribus, ac orænis viam sternit. Est quandòque coryza contagiosa, & miasmata ex partibus affectis exhalantia, vel per aërem attracta, vel per lintea, aut pocula communicata fermenti instar similem labem aliis inferre solent. Per aliquot dies caput aggravat, si in consensum trahatur, odoratum suspendit, non nihil loquelz impedimento est, gustatum lædit, & intra paucos dies cessat, quod ex flavo, viscido & inspissato excremento iudicatur. Coryzam in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse, & succedere malum. *Orionitur gravesdines vere*, ut inquit *Hip. aph. 20. sect. 3. Item hyeme post æstatem siccam. Et aqulilonarem, autumni verò pluviosum sect. 3. aph. 13. In senibus coryza malum. Raucedines, & gravesdines in valde senibus collationes non admittunt sect. 2. aph. 40.*

Curatio.

In coryzæ curatione vulgares cerebrum respiciunt, ejulque intemperiem calidam, vel frigidam corrigentes, humores crudos evacuentes, ut in carharho, revulsiones, & derivationes adhibent, & præter hæc caput roborant, expultricem sedant facultatem, ne humores crudi ad nares transmittantur, & deindè materiam nares obstruentem educunt vapore *decocti samplici* nariibus excepto, vel ejusdem samplici aquâ. Vel *acetum in ferream laminam candentem infusum*, vapore tenuis exceptum ad id conferre credunt, & id efficaciùs si in *acetò rosæ rubræ priùs infundantur*. Ad id etiam valet *acetum*, in quo *infusum sit castoreum*, nariibus attrahere. Vel olfacienda præbeantur *calamintha, serpillum, semen nigellæ acetò maceratum, isiam castoreum*. Vel adhibent *er-*

rhina, quæ cerebrum, & nares purganti optimum tamen errhinum esset elleborus, quia reverà caput purgat. Verùm hæc vulgaria medicamenta patent lip-
pis, atque tonsillis, & potius nocent, quàm juvant; solvunt enim à cerebro, & naribus, undè malum adaugent, & foveant, quapropter si his remediis, quis coryzâ non laborans, uteretur, utique coryzâ contingeret.

Coryza est ita morbus levissimus, ut à quovis negligatur, cùm ferè semper per se abire solet, citòdè curesur, à causâ tamen externâ concitatus: verùm si à causâ internâ, ut ulcere, sarcomate, polypo, carcinomate &c. concitatur, his sublati, sponte cessat.

Si pertinax, & rebellis persistat coryza, tunc lymphæ exuberantiam resina jalap. per sedem eliminamus, vel nimias serositates absorbimus per cutis poros diaphoreticis, ut *stibio, cornu cervine igne, misturâ simplici, aquâ bardana, vel salibus volatilibus, ut cardui sancti, rois marini, scabiose &c.* vel eas per urinæ vias exturbamus. Quibus medicamentis internis externa copulamus suffumigia, ex quibus præcæ eris sequens nobis magis atridet quod citò tutè, & jucundè, aliquoties unico die usupatum, & sensim exceptum coryzam percurat. Talis est *succini pulvis*, qui prunis inspersus, ore patulo, & naribus excipitur, & ne quid sumi pereat, obtesto capite, ab ægro studiosè est excipiendus. Si magis composita desiderare volumus ad pontiani augendam, *succino addimus masticheu, ibus, benzoinum, & styracem* ex quibus fumus excitatur, & modo quo suprà excipitur. Expertum etiam habemus ejusdem *succini oleum* digiti auricularis interventu intra nares immisissim, illud *ingrovercentis*, aut *oleum essentielle samp-*

luci. Item *balsamus apoplecticus* narium illitus. Magnopere etiam valet *gummi anima* pro suffitu super carbonas, aut *esum oleum*. Similiter *tabacum aliquot olei anisi guttis conspersum*, communi more sumptum. Hæc impetionem tollunt, & efficaciter obstructionem solvunt, ac discutiunt. Opiata nonnulli commendant, verùm magnâ sedulitate adhibenda sunt, ne nimis increasando, scætores, vel aliud incommodum partant, ut sæpè à nobis compertum est. Præseutaneum est præ omnibus spiritus salis armoniaci cum calce elicitus.

CAPUT XXXIII.

De Narium Hamorrhagiâ.

Solet quandòque natura sanguinem sputiosum per nares effundere, & multòs curare languores, vetùm multoties lacessita optimum, Laudabilemque sanguinem impetuosè ita profundit, ut vitæ thesauro exhausto, patientem non obire, sed abire quotidiana nos doceat experientia.

Affectus hic hæmorrhagia dicitur græcè, ab *ama*, & *rheo*, quasi dicas sanguinis fluxum, præsertim liberalem, & copiosum, à quacumque parte fluat, cujus variz sunt species, qui ex sedis vasibus fluit, dicitur hæmorrhoidali fluxus; ex utero singulis mensibus provenit, mensium fluxus nominatur; qui post partum è mulieribus labitur, lochiorum fluxus appellatur. Sunt & aliæ etuenez ex quibuscumque partibus excretiones, de quibus suo loco agemus. Usus tamen obtinuit, ut nunc non addito partis nomine, pro hæmorrhagia sanguinis fluxum è naribus tantum erumpentem specialiter intelligamus.

Est itaque hæmorrhagia immodicus sanguinis per nares fluxus. Pars affecta in hæmorrhagiâ sunt nares vel per essentia, vel per consensum, et ut in hæmorrhagiâ regia efficiuntur vasa sanguinea, ex quibus autumamus arterias magis in culpâ esse, quàm venas, sinumque tertium crassæ meningis per longitudinem falcis ad os cribrosum excurrentis in hæmorrhagiis aperiri. Vel ut plurimum tamen propagines rami arterialis à carotide internâ aperiuntur, rumpuntur, vulnerantur, eroduntur.

Signa.

Narium hæmorrhagia signis non indiget, cum ad sensum, vel ex solâ relatione immodica sanguinis copia conspiciatur. Distinguedz autem sunt illius causæ hoc modo: Si per anastomosim fit, narium sanguis copiosè fluit, si per diæresim, sanguis adhuc majori copiâ, & impetu fluit, præcessitque contusio, aut alia violenta causa externa; si per diapedesim, sanguis fluit paucus, tenuis, atque serosus.

Sunt & alia signa observanda; si enim hæmorrhagia critica est, ægrum levat, quia cum ipsa prior morbus, ejusque symptomata evanescent; si enim symptomatica, æger eam difficulter sustinet, & cum pulsu languidiori vires sensim attenuantur.

Si sanguis immediatè è narium venis fluat, nullus percipitur capitis dolor, & facilè per adstringentia naribus applicata sistitur; si verò à cerebri venis fluat, in aliquâ determinatâ capitis parte percipitur dolor, & per adstringentia medicamenta naribus imposita non sedatur fluxus.

Solet quondòque ab aliis etiam par-

ribus sanguis fluere, ut hepate, utero, harum partium signa dolores, & tensiones indicabunt.

Tandem, si sanguis ab arteriâ fluat, egreditur calidus, floridus, subtilis, cum spumâ, & impetu; è venâ verò crassior, & nigrior cum paucò impetu egreditur.

Si hæmorrhagia à sanguinis copiâ oriatur, adest faciei rubor, venatum tensio, cum etiam vicius largior, & rubens apparet; Si cacochymia contingit, quasi corruptus, & pravâ conspurcatus qualitate apparet, faciei color depauperatus.

Diversas habet hæmorrhagia differentias, cum alia sit à naturæ motu, & dicitur critica, alia à causâ morbificâ, & dicitur symptomatica; critica natura moderatur, ea quæ sibi noxia, & molesta sunt, exturbans, ut in febribus acutis in quibus natura causam morificam per has vias expellere conatur. Hæc etiam fit sine febre, naturâ sese superfluo sanguine exonerante, ut multoties videmus multos in floridâ ætate periodicam pati hæmorrhagiam. Symptomatica etiam fit à naturâ, quæ turbata, confusa, & irritata procedit in suis operationibus, & perperam operatur, ut in morbis chronicis evenire solet.

Causæ.

Hæmorrhagiæ causa est continui solutio facta in narium venis, & hæc solutio ad scholasticorum mentem tribus modis fit, quibus generaliter vasa sanguifera solvi possunt, & sanguis effundi, quorum primus est anastomosis, sive apertio, secundus diapedesis, sive rarefactio; tertius rhisis, sive ruptio.

Anastomosis provenit à sanguinis

I calore

calore, & effervescentiâ venarum orificia aperiente, & illum promptiorem efficiente. Diapedesis fit à venarum tunica magis attenuata, & à sanguinis tenuitate, & subtilitate per poros transeuntis, veluti per sudorem, non aliter achydroargentum subtilissimas suas guttulas per corium spargere solet, sed de hoc modo valde dubitamus, quomodo scilicet sanguis sub sanguinis formâ è vase aliquo transsudare possit. Rhisis ab externâ violentiâ collusione scilicet ictu, vel contusione accidit venas etumpente, vel etiam à sanguinis superfluitate vasa distumpente.

Pro horum modorum causis putantur vulgares, & quidè in anastomosi pro internâ esse sanguinis copiam impetiosè ad venarum orificia ruentis, ejusdem caliditatem, & acrimoniam, facultatem expultricem irritentem, retentricis debilitatem, venarum mollietatem & tenuitatem; pro externa, quæ sanguinem multiplicare valent, victum pleniorum, crapulam, computationem vini meracioris, fortiumque porulentorum, intermissionem venæ sectionis, hæmorrhoidum suppressionem, à Venere abstinentioniam, medicamenta venarum oscula nimis referantia &c. In diapedesi internè vasorum raritatem, & relaxationem, & quæ sanguinem attenuare possunt acculant; externè exercitia nimia, iracundiam, ærum, venetis æstrum, longiorem sub sole moram, balnea &c. In dieresi internè culpant sanguinis acrimoniam & mordacitatem vasa cortodentem, eorundem distensionem à sanguine copiosiori, & ebulliente; externè acia quavis, motum vehementem, pondus grave, magnum clamorem, contusionem, incisionem puncturam, ruptu-

Hæmorrhagia oritur vel à sanguinis, vel vasorum, aut simul utriusque horum vitio. Sanguis quandiù intra sua conceptacula coëctetur, omnia in pace posita sunt, si verò ab aliqua causa conturbatur, & in varios se adigit motus, ut intra suos parietes coëcteri nequeat, sed eorundem ostiola distendendo aperit, vel rarefacit, vel rumpit, & quâ datâ portâ ruit, ac ut uno dicamus verbo, omnes modi à scholasticis assignati sunt meræ tunicarum, sive arteriarum, sive venarum solutiones. Sanguis hæmorrhagiam causat quantitatis, vel qualitatis peccato; quantitatis peccat, quando sanguis in corpore copiam nimis augent alimenta euchyma, vina genetosa, excretiones menstruorum, vel hæmorrhoidum suppressa, quæ ita sanguinem intra sua mœnia cumulant, ut coëcteri non possit & necessariò furas etumpere debeat. Qualitate delinquit sanguis, cum acrior, tenuior existit, vel salinis, acidis, lixiviosis, sulphureisque scatet corpusculis. Huc pertinet validus corporis motus, alimenta calidiora, ac animaribus condita, sicut quoque spiritus vini absusus & coeterea calidiora, & acriora quæ consimilem sanguini imprimant characterem. Item excandescencia, quæ citatiorem in sanguine motum excitat, undè visi sunt quidam, ita excanduisse, ut non tantum facie spirârent ignem sed & sanguinem ex oculis & naribus, emisserint.

Ad hæmorrhagiam etiam vasorum vitia conjuntant, vel enim ipsa vasa fibræ nimis debiles, laxas, vel teneras ita habent, ut faciliè sanguini transitum præbeant, estò impetuosè non fetatur; aut à causa distendente, & etumpente aperiantur, aut poris, ostiolisue

nimis dilatatis, aut apertis constat, quibus sanguis, nullo obstante impedimento, faciliè elabatur.

Hæmorrhagia est affectus junioris ætatis, ut habetur *sect. 3. aph. 27. Hæmorrhagia narium est affectus familiaris pubescentibus.* Hæc enim ætas sanguine spirituosissimo, & tumultuoso abundat, ac proinde facili de causâ ejus effervescentiam sapissimè expetit, non aliter ac novum vinum non adhuc perfectè defecatum, quod ob spirituositatem & turbiditatem seipsum ad fervorem concitat, ut suas deponat faeces, quas sursum, deorsumque tanto propellit conatu, ut magna optimi vini par cum fecibus sursum ad officij vas foramen unâ feratur, & effluat: idem probabile est in juveniculo sanguine fieri, ut ad amovendam à se feculentiam feruidè se commoveat, & præ fervore sursum bulliat, ejusque pars ad summum humani vasis officium, nimirum nares superfluat, ac dictam constituat hæmorrhagiam, in qua sanguis per nares exiliens vel à venis, & arterijs imâ, aut supremam cerebri sedem permeantibus effunditur, vel à vasis, à palato ad nares descendentibus, quæ sunt venarum hæmorrhoidalium instar in ano, & utero.

Prognosis.

Duplex est hæmorrhagia, una imminens, altera præsens, verum majori existimationi erit medico imminentem prælagire, quàm præsentem sistere; ideoque imminentis prælagia sedulo recensere oportet. Imminentis hæmorrhagiæ prægnosis, præsertim criticæ cugitur ab actionibus laxis, excrementis, & qualitatibus mutatis. Fururam hæ-

morrhagiam prælagiunt insomnia, & rerum rubrarum imagines; capitis & cervicis dolor subindè ortus; temporum gravitas, & magna pulsatio in illorum arterijs; aurium tinnitus, vel sonitus; oculorum hebetudo, vel splendores, Marmarigines oculis obversantes; faciei, & oculorum rubor, lucis aversio, lacrymæ involuntariæ; pruritus aurium, nasi rubor; sanguinis stilla die indice apparens v. g. quartâ, vel decimâ, offendit futuram hæmorrhagiam die judicatorio, nempe septimâ, vel decimâ quartâ, quia diebus judicatorijs natura humores ad eas partes transferte incipit, difficilis respiratio, & tandem hypochondriorum tensio sine dolore.

Præsentis hæmorrhagiæ prognositià se habet: Hæmorrhagia mediocris, & per rara adveniens intervalla salutaris est; natura enim rectè operans superfluo pondere se exonerat: at si crebra, largiores, & vehementes sanguinis profusiones fuerint, pessimæ, omne enim sanguinis profluvium immodicū est periculo plenum, viam præparans ad mortem, in primis si extrema frigeant, si facies appareat pallida, viridis, vel livida, vel animi deliquia, syncope, vel cachexiam & hydropsen omnino incurabilem excitat, ità ut exempla non sint curatorum ab hydropse, qui narium hæmorrhagiam sequutus sit, in quem etiam conjicit, si per plura spatia ejusmodi fluxio per nares diù fatigetur, ac si confectum & continuatum fiat.

Hæmorrhagia in motu principio, mala, quia symptomatrica est, sic enim à naturâ ante tempus ad excretionem irritatâ à materiæ morbiticæ malitiâ paucæ sanguinis stillæ in morbis per nares effluentes, infaustum prædicunt

eventum, & vel mortem, vel recidivam prænunciant, & præcipue in morbi principio, *Epaminonis & sileii* exemplo penes *Hip. Epidem. lib. 1.* qui interierunt, quòd pusillum quid è naribus stillaverit: significant enim naturæ imbecillitatem, vel malignitatem morbi, eo quòd omnis excretio in morbis acutis, quæ tantum incipit & non finitur, damnanda est. Quòd si stella die indice prodit coctionis signis utcumque apparentibus, futuram crisin per hæmorrhagiam die critico significat.

Hæmorrhagia in quartana pessimum signum est, ut habetur *secl. 8. aph. 3.* *Quibuscumque in quartana febris sanguis è naribus deflaverit, malum.* Quia sanguinis fluxus in melancholicis & phlegmaticis noxius est; hi enim sanguinis profusione magis refrigerantur, & debilitantur, quia vulgo quartana, ut & cachexia, & hydrops morbi frigidinominantur. Sic etiam si hæmorrhagia in senibus oboriatur, malum, Per hæmorrhagiam quandoque natura alias compensat evacuationes, ita notavit *Hip. secl. 5. aph. 33.* *Mulier menstruis præter naturam deficientibus sanguinem è naribus profluere bonum.* At si hæmorrhagia in tempestivè supprimatur, convulsionem, epilepsiam &c. parit, ut hæmorrhoides longo tempore fluentes, si inconsideratè cohibeantur secundum *Hip. rabis*, aut hydropis & secundum alios scirchi, canceri, & lepræ periculum impendunt.

Febres acutas criticè & quandoque symptomaticè ante humorum coctionem hæmorrhagia solvit, experimur enim quam plurimos à gravissimis morbis nati hæmorrhagià liberatos fuisse & præcipue febribus malignis, ut pote

illis, quæ vortiolas, & morbillos habent adiunctos, si hæmorrhagia superveniat febris vel solvitur, vel mitigatur, & vortiolæ, vel morbilli multo pauciores erumpunt, quàm si nulla supervenisset hæmorrhagia. Verùm huic doctrinæ adverstatur *fernelius* inquit: licet deliria, vigilias, capitis dolorem, & reliqua symptomata demulceat, vix tamen propriam morbi essentiam, & radicem evellit, quia sanguinis portio purior emittitur, impuriori remanente. Idque ex eo probat, quòd sanguis è nare profluens, colore, substantià laudabilis apparet; cùm sanguis eodem tempore è vena detractus impurus & corruptus videatur.

Plausibilis equidem est hæc *fernelij* doctrina, non tamen absolute recipienda. Verum est inquam plurimis morbis acutis, præcipue in febribus malignis, hæmorrhagiam sæpè morbum penitus non solvere, atque perpetuum non est, sed tunc cùm tales evacuationes sunt à naturâ ante coctionis tempus irritatà à causa morbificâ.

Ad id, quod *fernelius* dubium reddit, nimirum quòd sanguis, qui in nativum hæmorrhagiâ effluit, semper purus & floridus apparet, facile respondemus; nam non semper è solis venis effluit, sed sæpè ex venis & arterijs simul putà è tertio crassa inethingis sinu: sicut & è venis, & arterijs in cerebri basi, per varias anastomoses concurrentibus, ista hæmorrhagia fieri potest. Cùm ergo iste sanguis non solum è venis, & arterijs fluat, non mirum est, si rubicundior appareat, quàm ille, qui è venis in cubito sectis emanat.

Cura io.

Vulgares in hæmorrhagiæ curatione ita se gerunt: Cuiusdam non supprimunt

mittunt, sed ad debitam sanguinis quantitatem fluere permittunt; Solet enim quandòque licet citrica, modum excedere, siquidem sanguinis multitudine gravata natura ad illius expulsionem excitatur, & modum tenere non potest, & vehementem facit evacuationem, unde virium jacturam, & mortem timere oportet, tunc illam cohibent. Sed quis debitum modum in omnibus statuere potest?

§ Symptomaticâ hæmorrhagiâ cohiberi celerioribus præsidijs, in anastomosi vasculosa reclusa obturant, in diuersi uniunt, in diapedesi densant, sanguinem ad nares confluentem revellunt, ab ipsidem, & vicinis partibus repellunt; humiores acres, & tenuiores sanguini permixtos evacuant, & corrigunt, eorum genus prohibent, hepatis, & venarum recentericem roborant facultatem.

Primo sanguinis missionem, quæ inter revulsoria remedia principem possidet locum, maturè antequàm vires debiles evaserint, celebrant. Hic Barbatores suam exercent carnificinam, hic barbatorum sanguificina triumphat & ægrotus tanquàm ad Janicium ductus, satellitio constipatus, per fidos carnifices, nimirum tonsores, incisus venis sanguinariorum inexplabilem explet sinitum. Incidunt venam mediam, aut internam brachij, è directo partis, qua sanguis profluit, dextri scilicet si è nare dextra, vel sinistra, si è sinistra, utriusque dum è nare utraque sanguis emanarit. Sic apud magis sanguine abundare videnti cephalicam aperiunt. In magna plethora prius tali venam incidunt, præsertim ubi ex suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus acciderit. Attamen si uniçua phlebotomia hæmorrhagiâ non cohibita sit, illam reiterant ad

mali usque declinationem.

Verùm incompscibili iurgio controuertitur inter vulgares, an phlebotomia fieri debeat angusto, an amplo foramine, & sanguis exigua quantitate sæpius repetita detrahendus sit, aded ut in phalangas distincti invicem digladiantur. Aliqui censent foramen debere esse angustum, ut subtilis sanguinis pars effluat, maneatque crassior, minus ad fluendum idonea; & sanguis moderatè educendus ad 3. j. vel ij. arque iteratò post horæ spatium, ut major fiat revulsio, viresque simul non devastentur. Alij ampliori foramine, & exigua quantitate sæpius repetita sanguinem detrahendum, & revulsionem meliùs fieri censent nam ut contrarius motus sanguini concilieretur, vehementiori agitandus est motus, siquidem motus vehementior debiliorem rapit: idè quò ampliori foramine, & magis confectim sanguis effluit per sectam venam, eò promptius è naribus fluentem adducit sanguinem.

Non possumus non respondere ad hanc vulgariam controuersiam, licet utraque sententia à verà medendi methodo aberrat, tamen verisimilior videtur, quæ ampliori utitur foramine, ex allatis rationibus & tanquàm improbabilem reijcimus illam, quæ angustum statuit foramen: ex angusto enim foramine subtilis sanguis i. spirituosus effluit, remanente reliquo sanguine spiritibus effæcto, undè lipothymiz, syncopes, virium jactura emergunt ob magnam spirituum deperditionem.

Vindicandam censemus naturam à tantà vulgari sanguificinâ, licet prædicet multos infirmos è faucibus orci receptos, cum potius per accidens id eve-

nerit, quàm aliquà demonstratione; sunt enim probabiles conjecturæ, quæ pro illâ afferuntur. Non est hæc recta via ad salutem, neque optimæ notæ medicus hoc incerti præsidij genere uti debet, quia periculum facere per hominum mortes, esto quandoque juvisse observaverit, tamen multoties intermisse expertus est. Itaque recedat à medicorum aulâ hoc incertum remedium, quod cum ambiguitate, & pernicio tentatur; in ambiguis enim & præsertim perniciosis tutior sententia amplectenda est, unde præstat sanguinem, qui est vitæ thesaurus, conservare, quàm illura veluti aquam profunderè: *Clamas enim occisorum sanguis ante thronum Dei: Vindica Domine sanguinem nostrum, qui effusus est.*

Quod de revulsione & derivatione dicunt vulgares in hæmorrhagiâ phlebotomiâ sanguinem ad læsam partem accurrentem posse sisti, & retrahi, merum figmentum esse sanguinis circulatio ostendit ex quacumque enim parte sanguinem mittas, æquè totum corpus sanguine depletur. Putant creduli vulgares in humano corpore sanguinem intra venas, & arterias stagnare, ac posse aliquandò à læsis partibus in auxilium retrahi. Sanguinis igitur mîllo solam aufert plethoram, non cacochymiam: verùm vix adduci possumus, ut credamus naturam, quæ nunquàm deficit in necessariis, in superfluis abundare, ut tantam sanguinis copiam produci patiatur, quantam venæ capere non possint.

Post phlebotomias alia adhibent revulsoria præsidia, ut cucurbitulas cum scarificatione in scapulis, & ceruice, quibus fluentem è naribus sanguinem retrahere imaginantur. Atta-

men non est tutum remedium possunt enim sanguinem ab inferioribus partibus ad superiores attrahere, & novo affluxui occasione præbere. Hirudines post aures, extremorum frictiones, eorundem ligaturas dolorificas, lotiones quoque ex aquâ fervente. Cucurbitulam satis magnam sine scarificatione hypochondrio applicandam jubent, dextro, si è dexterâ nare sanguis fluat, sinistro, si è nare sinistra effluat, utrique, si ex utrâque sanguis effluat. Verùm cucurbitularum applicatio hypochondriorum regioni est medicamento genus maximo periculo adjunctum; sanguis enim tunc effervescebat ad hepar & lienem magnâ copîa attrahi potest & in his partibus inflammationem efficere, cujus inflammationis historiam narrat de quodam aulico *fabricius Hildanus obs. 47. cent. 2.*

Hujus occasione cujusdam medici vulgaris recordamur, qui in natium hæmorrhagiâ cucurbitulas supra utramque mammam cuidam juveni applicuit, sanguis quidè ex emplô substerit, sed ita maxima raucoedo subsequuta fuit, ut vix mîter audiri poterit, quem ad mortem usque comitata fuit.

Si natium hæmorrhagiæ sola plethora sit causa, sola sanguinis revulsio sufficit, nec purgatione opus est, ubi verò vitiosi alij tucci sanguini sunt admisti, purgans medicamentum, quod compressivum vocant, instituunt, quia non nihil adstringunt, & humorum revulsio ad inferiora sic: tale concinnant, si præcipuè bilis redundet, ex *tamarindis, myrobalanis citrinis, vel chebulis, syrupo ex multi-*

pliei rosarum infusione, & lythabarbaro torrefacto. Verùm vulgariū pace, purgans medicamentum nullum jus intra venas habet, cū illuc non pateat aditus.

His omnibus administratis, si sanguis adhuc fluat, ad alia deveniunt medicamenta, quæ tam intrò, quàm foris imponuntur; undè primò exhibent syrupos refrigerantes, ut de *succo acetoso, de Nymphæâ, cicorio, portulacâ &c. cum aquis plantaginis, lactuca, portulacæ &c.* Vel opiata, ut *Philonium Romanum, Persicum, requies Nicolai*, putant enim opiata esse frigida, & sanguinem incrassare; non exhibenda tamen sunt grò debili, quia periculum est, ne calor ab opiatīs extinguatur.

Foris topica applicant refrigerantia, capiti nempe, fronti, temporibus, collo, hepatis, testibus, manibus, brachijs, pedibus, & tandem toti corpori.

Caput aquâ frigidâ perfundunt; verùm sanguis per refrigerantia intro pulsus, venas, quæ alto sunt, replebit, & sanguinis fluxus augebitur, vel sanguis retentus convulsionem, apoplexiam, parotidem, dyspnœam, aut alium quempiam gravem affectum excitare poterit.

Fronti & temporibus totum ex aquâ valde frigidâ, vel ex succo plantaginis, *bursa pastoris, solani &c. addito aceto ad pœnerationem*, applicant cum linteis, quæ dùm calefcere incipiunt, frequenter mutant. Vel iteratò frontem spongiâ aceto frigida madidâ foveant.

Collo linteum ex aquâ frigidâ madidum circumdant; verùm in hoc metus est, ne apoplexia, vel syncope accer-

scatur, præclusis vijs inter cor, & cerebrum.

Faciem aquâ gelidâ conspurcant, quæ non solum sanguinem fluentem repellit, verùm etiam eundem ad interiora retrahit. Sed aqua frigida satis in magnâ copiâ in faciem conici debet ex improvviso, nempe ad duos, vel tres cyathos per brevial intervalla projectos. Verum tamen hoc remedium aquæ frigidæ syncopen excitare potest, vel saltem lipothymiam & ægrum de medio tollere. Neque optimum remedium est ad hæmorrhagiæ fluxum cohibendum syncopen excitare, cū non desint alia remediôrū genera efficaciora & ruciora.

Hepar *cerato santalino, vel unguento rosarum* inungunt, quia hepar calidum sanguinem suum mittit.

Testes circumligant aquâ frigidâ panno madido ex aquâ plantaginis, portulacæ, *bursa pastoris, pulvere rosarum, & trochiscis de camphorâ.* Verum nullus consensus est inter testes, & nares, si ex barbâ sanguis fluere, utique hoc remedijs genus concederemus, cū inter barbam & testes magnus intercedat consensus, ut videre est in cunuchis, quia testibus carent, carent quoque barbâ.

Manus, brachia & quoque pedes refrigerare valde utile esse diiudicant, ac proindè in aquam frigidam immergunt. Vel aquâ frigidâ volas, & plantas è carpi regione lavant, ubi arteriæ pulsant. Vel lilices, ferrum, aut alia frigida manibus tractanda imperant, aut pedibus lamas plumbeas, vel lapideas substernunt.

Tandem, si omnibus his refrigerantibus sanguinis fluxus non compescatur, quia maximo in fervore versatur, quidem vulgares totum corpus

in balneum frigidum demittunt. Verum hæc remedia sunt ex aquâ frigidâ.

Nihil proficientibus refrigerantibus, ad adstringentia recurrunt, uti sunt *myrtus*, *pisifella*, *consolidamajor*, *bolus armenus*, terrâ *sigillatâ corallia*, *acacia*, *hypocistis*, *coriscæ granatorum*, *sanguis draconis*, *lapis bamasites* &c. ex quibus pulveres concinnant intra nares infundendos, vel aceto, & ovi albumine subagitant, fronti, & temporibus admovent, vel supra linteamen extendunt, & collo, ubi venæ jugulares descendunt, circumdant.

Vel utuntur *sympis cyconiorum*, *myrtino*, *de ribibus*, *rosificis*, *de agrestâ trochiscis de verrâ sigillatâ*, *de spodio*, *de carabe*, *myva cydoniorum*, & ex suprâ dictis pulveribus varia electuaria & opiata parant.

Instillant in aurem acetum, quæ nati fluenti proxima est; sic enim venam, per quam sanguis fluit, adstringi potest.

Fabam, aut numisma argenteum radici narium inter cilia admotum, & fasciâ arctè alligatum, ut fortiter partem comprimat, eundem fluxum cohibere credunt.

Non desunt vulgaribus medicamentis specificis, quæ à proprietate occultâ sanguinem fluentem cohibent. Ità est *myrica succus*, quem semel, arque iterum ad 3. iv. propinant, tum per nares attractus, tum fronti & temporibus admovent totam urticam confusam, *Stercus porcinum* inter præstantissima specifica recensent, si calens fronti, & temporibus admoveatur, vel olfaciendum detur, vel siccus in nares immittatur. Maximopere etiam

ad sydera extollunt *stercus asinina* eodem modo usurpatum, ut de porcino dictum est; imò conficiunt *Syrapium de stercore asinino*. Narrat *Rodericus à Castro lib. 1. de morbis mulierum cap. 5.* Medicum quendam septuagenarium hæmorrhagiæ maximè ob noxivum, stercus asininum modicè exsiccatum in capsula semper gestare solitum, cui medicamento nullum aliud simile se reperisse referebat, præsertim si succo iurticæ commistum, si siccum, aut recens per se naibus exhiberetur.

Multi vulgares hæmorrhagiæ occurrunt verbis aliquibus superstitiosis, quæ recensere non licet; sed hæc æriæ & inutilia sunt expectata, ut potè in aëre verborum fundata.

Si narium hæmorrhagia sit critica, aut consueta, & modum setvet, non impedienda, nisi copia vires prosteruat. Nunquam autem statim in principio sistatur, & multò tardius in iis, qui in ætate sunt juvenili, & constitutione corporis sanguineâ, & quibus hæmorrhoides, aut menses substituerunt; multi enim ex intempestivâ suppressione in graves, aut chthonicos morbos inciderunt. Morbosæ, seu symptomaticæ mox in principio succurtendum, & quo longiori tempore fluxus duravit, eò citius occurrendum est, ne vires prosteruantur.

Succurrimus narium hæmorrhagijs tum internis tum externis medicamentis. Interna sunt, quæ sanguinis acrimoniam, ejusque particulas salinas, & sulphureas absorbent, ac præcipitant

quæ sanguinis impetum, & turgescen-
tiam mitigant, pacantque, quæ patri-
culas acriores dissolutas liebetant, &
compingunt, & tandem quæ vasa an-
gustant,

Sanguinis acrimoniam obtundunt in
primis *crocus Martis* cum succo *cydonio-
rum*. aquâ *bursa pastoris*, vel ejus succo;
sed præstat extractum *croci Martis* se-
quens, si ejus grana quatuor cum aqua
plantaginis exhibeantur :

℞ *limatura Martis* 3. j.
affundantur lente, & successivè
aqua fontis 3. iv. ad viij.

Digerantur per noctem in cineribus, vel
arena ad totalem usque solutionem. Hinc
per alembicum aqua fortis abstrahitur
ad siccitatem, pulveri restanti affunda-
tur vini spiritus vulgaris ad duorum di-
gitorum eminentiam, & appositio alem-
bico cæco, digere in arena, donec rubeat,
tunc vini spiritum abstrabe, & alium
affunde, & secundum artem ita procede,
donec corrosiva salia aqua fortis totaliter
abstracta sint. Tunc novum vini spiri-
tum affunde, digere, & tinctum decanta,
idque repete donec nil amplius de tincturâ
extrahatur omnes effusiones, seu decanta-
tiones commisce, & per Balneum, vel ci-
neres adolestatem usque destilla.

Utilis est *sympus*, sal *magisterium*, &
tinctura *coralliorum*, essentia *rosarum*
rubrarum, tinctura *lapis bematitis*,
magisterium margaritarum, oculi can-
corum, abur sine igne præparatum, &
quædam *auris scorbutica*, quæ san-
guinis acrimoniam corrigunt, demul-
cent, & adjuvant.

Sanguinis motum, & impetum re-
tinent *lauda-um opiatum*, ejusque sen-
tella, *spurniola compositum*, præcipuè
efficacissimum est ad quamvis hæmor-
rhogiam sistendam si in aqua *bursa pa-
storis* ad grana tria, vel quatuor exhibe-

beat, præsentaneum verò sit medica-
mentum, si aliquid *laudani opiat*
datur. & cum *sympo papaveris rheados*,
vel *artica succo* exhibeatur.

Externa ea medicamenta conveni-
unt, quæ austeritate sua vasa sanguifera
coartant, & angustiant, ut *vitriolum*,
vel ejus sal, vel pulvis *sympaticus*, quo
linthea sanguine madefacta inspergi de-
bent. Magnoperè juvat *colchoiar*, vel
terra exanimata ut *riso*, vel ipsum *vi-
triolum rubificatum* intra nares immis-
sum, vel gellatum. Vel sequens pul-
vis pluries à nobis expectus, ut

℞ *Cortic. granator.*
aluminis, &
vitrioli ana 3. ss.

f. omnium pulvis subtilissimus.

& tabaci instar naribus indatur Vel
alumen, quod laccâ pictorum pro incar-
nato colore larvetur. Item *fuligo camini*
succini instar splendidi, pulverisatâ
Lepus in naribus capitis effricatus. & in
pulverem redactus, ac in nasum immis-
sus.

Sed advertendum est, quod fluxus
sedato per escarotica medicamenta, vel
glutinantia &c. eschara non est remo-
venda, neque sanguis coagulatus. Si
adsit, ob novæ hæmorrhagiæ pericu-
lum.

Sanguinem coagulant aqua *spermatis*
canarum, si in eâ addatur pauca *cam-
phoræ quantitas*, & *sacchari Saurici*, &
lintheamina madefiant, ac collo, ubi
venæ jugulares descendunt, circumden-
tur. Imò aquâ *spermatis canarum* la-
vare faciem, & nares commodum est.
Laminam, vel *numisma argenteum* ali-
quo opiato innitum, ac sequenti un-
guento fronti applicari jubemus

℞ *Croc. Martis subtiliter pul-
verisati*, optimèque reverberati,
& *Croc. Pæneris ana* 3. ij.

cum ol. uespei pomor. f. linimentum.
Laudanum, vel *opium* intra nares im-
 missum mirifice hæmorrhagiam si-
 stir.

Si sanguis ex arterijs fluat, quia spi-
 ritibus turget, difficulter reprimitur;
 generosa, & plura remedia ars medica
 excogitavit, & sicut hominem servare
 didicit, ita & sanguinem, inter alia nul-
 lum aliud præstantissimum remedium
 in totâ republicâ medica inveniri po-
 test, quàm *aqua arterialis*, ad quamli-
 ber hæmorrhagiam deploratam sisten-
 dam, descripta in nostrâ *Pyrotechniâ*
phsica lib. 4. cap. 1. art. 1. & Tomo 1.
de Tumoribus cap. 14.

Causæ hæmorrhagiæ deindè, si ade-
 rit, respiciendum est, qua propter si
 sanguis aquosus nimium fuerit, emen-
 dandus, remedijs appropriatis, scilicet
pilulis de cynoglossâ. Si mordax, mor-
 dacitas compescenda, & causâ prin-
 cipalis removenda. Examinandum
 quoque diligenter erit, quæ mor-
 dacitas, salinâ, an vitriolata
 sit.

A naribus rectè ad os descendimus
 ut more nostro ejus languores exami-
 nemus, & eorum unicuique medicam
 opem præstemus.

CAPUT XXXIV.

De Aphthis, & oris Ulceribus.

Aphthæ sunt oris ulcera levia, su-
 perfacialia, & serpentina, quæ
 puerulis lac sugentibus sunt familia-
 ria, ac proindè lactucimen ab aliqui-
 bus appellantur. Sunt exulcerationes
 quæ hinc indè in summa oris superfi-
 cie serpunt, & in qualibet ejus parte,

ut in palato, gingivis, linguæ latitudine,
 & ejus profunditate, seu radice. Sunt
 quondòque puerulis adeò periculosa,
 ut penitus eorum renellam excedant
 carnem, præcipuè si malignitatem sap-
 piant.

Præter aphthas sunt alia oris ulcera,
 quæ per adultorum ora non tantum su-
 perficie tenus in palatum, gingivas, lin-
 guæ latera, & ejus radicem serpunt, ve-
 rum etiam aliquo temporis intervallo
 profundius sese demittunt, & harum
 partium carnes exedunt, & hæc simpli-
 citer oris ulcera appellantur, qualia
 sunt ea, quæ in lue venerea, & quando-
 que in malignis febribus contingere so-
 lent.

Signa.

Aphthæ per se visui patent, in pue-
 rorum enim ore ulcuscula quædam
 conspiciuntur levia, & superficialia;
 in adultorum verò ulcera profunda, &
 adesa, nunc albo, nunc cineritio, nunc
 nigro colore prædita.

Causæ.

Galenus in com. aph. 24. sect. 3. in ata-
tibus autem talia contingunt parvis &
nuper natis puerulis, oris ulcera, (quæ
 aphthæ vocantur) *vomitibus &c.* aph-
 tharum causam in puerulis lactentri-
 bus docet esse lac nimis serosum, acri
 suâ absterfione summas, atque molles
 admodum partes exulcerans. Vel esse
 lac haustum in puerulorum ventricu-
 lis corruptum, unde acres, putridi-
 que vapores sursum ad os attolluntur,
 ita asserit *9. de compos. med. sec. loc. cap.*
ult.

Verùm magistri Galeni pater, & disci-
 pulo:

pulorum nos scimus lac tribus constare substantijs, caseosa, quæ optimè corpus nutrit, & vitiosorum humorum acrimoniam temperat; serosa, quæ ulcera abstergit, & mundificat; & butyrosa, quæ dolores lenit: dùm res ita se habet, quoties in sero adest acedo, quæ molles exulcerat patres, à caseosa temperari debet, & sic pars inimica castigari. Præterea in lacte serosa acedo exulcerans esset de aquarum solvendum indole, licet in gradu remisso, essetque virus corrosivum, quod in puerulorum stomachis ob resultantem fermentationis aciditatem exaltaretur, stomachumque exulceraret.

Falsum est etiam, quod inquit *Gal.* ex corrupto lacte putridos, acresque vapores ad os attrōlli à stomacho, exulcerationemque producere; nam si verum hoc esset continuè eorum sapor, & primariò œsophagus, deinde os exulceraretur: Sed superius ventriculi orificium exactè clauditur à cibo, & tantum ad cibi, vel potus importunitatem panditur. Sed demus, quòd quandoque corruptum lac acidum eructet, sequeretur, quòd melancholici, qui acidum eructant, continuè exulcerato ore laborarent, quod falsum deprehendimus. In super vapores acidi ascendere non possunt; calor enim ad acidum vaporem elevandū debet esse intensus, scilicet quarti gradus, qui in animalibus nō reperitur, alias nō viverent. Deberent itaque ad totius, vel alicujus partis consensum recurrere, ut par esset fiendi modus in puerulis, ac adultis.

Ulcera causam in adultis statuunt cum antesignano Galeno vulgares esse primariò pravos humores in ore col-

lectos, quos natura fors exturbat. Vel secundariò per totius consensum, ut in febribus acutis, & præsertim malignis, ubi pravi, corruptique humores ad os elevarunt, & ulcera sæva generantur, quæ cum faucibus asperam arteriam, & gulam occupant. Vel ob alicujus partis consensum, ut à capite, cum capitis pravi humores in os per fluxionis viam depluunt, ceu sunt biliosi, & pituitosi. Vel à ventriculo, ut in puerulorū aphthis à corrupto lacte. Vel à pulmone, vel hepate calidiore intemperie laborante, à quo non tantum oris provenire creant vulgares, verum etiam omnes corporis exulcerationes. Vel à liene ab utero &c. cum hujusmodi partes, corruptorum humorum colluvie scateant, unde halitus sursum mittuntur quibus primariò pustulæ excitantur, & ob assiduum affluxum illuc transmissum in ulcera desinunt, foventurque ac proinde in dies maligniora redduntur.

Assignant vulgares pro ulcerum causâ pravos humores in ore collectos, sed quinam sint isti, & cujus conditionis pravi humores, nesciunt. Præterea isti humores vel antequam ad os colligantur sunt pravi, vel in ore sunt tales; si primum, pravitatem partibus, per quas transeunt, communicare deberent; si secundum, quomodò in ore pravitatem nasciscantur assignare tenentur: Verum ut plurimum, & sæpe semper per aliarum partium consensum hæc ulcera fiunt, vel à capite per fluxionem, & forsàn per destillationem per descensum, ut chimici loquuntur, sed de his sabellis fusiùs cap. de ca-

tantho diximus in *Trinita*. Vel ab aliis partibus inferioribus, ut à ventriculo, pulmone, hepate, liene, utero &c. per ascensum, putant enim à pravis humoribus in his partibus scatentibus halitus sursum ascendere, (mitamur equidem has partes non exulcerari,) & impolluto calle ad os transmitti à providâ naturâ, tanquàm ad emunctorium. Verùm ab ore diffarent, vel in ructus evanescerent. Præterea ductus assignare debent, non verò cecos, alias in ignorantia foveam cadunt, per quos isti alitus ad os defertuntur. Demus sub halitibus, seu vaporis larvâ ab inferioribus partibus ad os evehi, non possunt in guttas concrefcere, cum os capitellum non referat quod si concrefcerent repêrcti, in insipidum, crystallinumque liquorem facessetent, qui unâ cum salivâ exturbaretur. Nec isti halitus falsedinem, acrimoniamvè sapiunt, nam ad falsum, acidumque elevandum halitum calor debet esse intensus, non tantum nostro major, verum quatti gradûs ignem sibi vendicat. Prudentius egissent vulgares, si non tantum oris ulcera, verum aphthasuni hepati, tanquàm ignorantia asylo tribuissent, quia per ipsos apud stolidam plæbeculam rumor increbuit non esse malum in humano corpore, quod non faciat hepar.

Venæ aphtharum causæ sunt, partim nutriticis, vel matris lac nimis acidum, falsumvè redditum ab eorum aciditate, vel falsedine, quæ comeduntur, aut bibuntur, aut alio modo assumuntur, partim molliissima internarum parti visceris constitutio, quæ ob suctionem non egre excojiatur, & excojiatio semel facta, diffi-

cultè agglutinatur, cum assidua suctione cam denuò abradat.

Notandum est hic obiter, quod plurimam suum mala, quæ cum lacte infantulis ingruunt. Primò, dum in grumos transit, frequentes excitat vomitiones, singultus, tormina, vermes, febres, diarrhas, epilepsias, quandoque convulsiones, multasque necis inopinas continet occasiones. Sunt hæc incommoda inevitabilia, & lactis peccata materialia, quæ infantulus à primo natiuitatis die piare incipit: quasi mater, vel nutrix, seu sava noverca insidias, necisque comminationes struat suo filio, pocula inficiendo. Secundò, sunt alia lactis crimina. S. Venerea lues, lepra, pestes, febresque contagiosæ, quæ cum lacte non apertè, sed furtivè quodam modo se insinuant, inficiuntque. Itèm cum lacte character morbosus epilepsia, mania, stupiditatis, phthisis, podagra &c. deplorabilis in vitam inuitur, non aliter ac hereditario parentum vitio obringeret qui sub dierum matritate prodit. Dum miscelli infantuli lac pro sustentandâ vitâ mendicant, eum lacte morbos, morborumque occasiones consequuntur, quos in se ipsos transplantant, & indelibiliter in vitam duraturos incorporant. Tertiò, defectus non solum morales cum lacte introassugant, qui ad ultimum vitæ terminum perfectæ erant, verum etiam ira, audacia, timor, pudor, læticia, tristitia, invidia, odium, & cætera animi pathemata à matribus, vel nutriticibus mendicantur, & per lac propagantur. Quartò, lac in horas varias subit impressiones examini perturbationibus, diversasque induit deformitates,

formitates, quas infans infantulus ab ubere fugit, & expiaretenetur. Et tandem, ut uno absolvamus verbo, morborum occasiones, defectus morales, ingenium, mores, animi actiones, temperaturam, & maleficas impressiones unà cum lacte infantuli furtim in se ipsos transplantant. Sed ad aphthas noster redeat sermo.

Est & alia aphtharum causa scilicet saluginosum, aciditatumque lac propter assumptum à lactantibus, sed à sero dilutum, degeneratnive ex varijs nimii perturbationibus, intra infantulorum corpuscula pro nutrimento receptum, & in partes distributum, cujus in corpusculorum sustentatione provida natura salugines, aciditates, aliasque imputitates unà cum lacte exturbat per salivales ductus & ad os transmittit nimio lacte exutas, que molles oris partes superficialiter exulcerant; partim per urinaria vasa urinæ commiscuntur, quæ naturales exulcerant partes; partim sub axillis ab indefinenci cordis calore detruduntur, ubi ut plurimum exulcerationes conspiciuntur; cetero autem in earum commissuris &c.

Adultorum ulcera sunt à particulis salinis, acidis, vel alkalicis in lacte, vel succo alimentitio stagnantibus, quæ per ductus salivales, tanquam ad suam emunctoria, evomuntur, exaltantur, & internas oris, faucium, linguæ palati &c. partes corrodunt, & exulcerant. Huic affectui ansam præbent alimenta, quæ salinis, & mordacibus abundant particulis, ita sunt carnes salitæ, & pisces omnes sale conditi, sinapi, porri, allia, capæ, acida omnia, & cetera, quæ laticem, & succos alimentitios simili charactere imbuunt, & per salivales ductus ad os transmittuntur,

ac externi alicujus agentis calore exaltantur, & solvendi vim nanciscuntur.

Prognosis.

Aphthæ facillimè curationem admittunt, quia ulcuscula superficialia sunt & à minori oriuntur materia: autem diuina, & profundè exulceratæ perniciosissimæ censentur; tùm ob carnis mollitiem, quam facillimè depascuntur; tùm quia hæc validiora expostulant medicamenta, quæ ob eandem carnis mollitiem, & ætatis imbecillitatem ferri nequeunt; tùm quia medicamenta itè applicari non possunt; tùm quia infantuli nimia oris humiditate abundant, & facillè saliva eluuntur; tùm quia partes valde sensiles sunt & facillè ab acerbis medicamentis, quibus quandòque uti necesse est, irritantur; tùm tandem quia metus est, ne quid de medicamentis acrioribus, in applicatione cum periculo in fauces delabantur, & majus oriatum vitæ deserimen. Undè necesse ob has causas malum invalescere ob loci naturam calidam, & humidam, ac proinde infantulos consumere, & hinc fit, ut interdum infantuli ex hac affectione a cerbo succumbant funeri, præcipuè si putredinem, & malignitatem habuerint comitem.

S. aphthæ, debitis adhibitis medicamentis, non profligantur, sed putrescunt, & à gingivis sependo per palatum, totumque os occupant, & ad columellam, faucesque descendant, malignæ censentur, & fortioribus indigent medicamentis, quibus nisi cedant, lethales sunt, & præsertim si prava alia complicea, ut symptomatica,

& infantulus sit debilis, mortem portendunt inevitabilem. Si livorem, nigredinem, & veluti crustam contraxerint, pessimæ sunt, & reparabilis mors, præ foribus cubat.

Adultorum oris ulcera, si sint simplicia, mitia, & ex lue Veneræ, sanationi non valdè reluctantur; attamen fauces exulcerata cum febre dissolutæ sunt 3. prog. & alibi: *Ubi febricitantis fauces exulcerantur, si alius de quoquo ex gravioribus signis aliquid offuerit, periculum denunciandum est.* Excidentia, & maligna periculosa sunt, unde ulcera nigra lethalia sunt, & præcipuè in lingua, faucibus &c. per febres acutas, & pestilentes mortem brevi secuturam significant.

Curatio.

Curant vulgares infantulorum aphthas, idoneam victus rationem præscribendo, quæ refrigerat, & siccat; verum refrigeratio ulceribus est moidax, & quia ulcus exsiccatione indiget per ipsos, nunquam sanaretur ob assiduum, superfluumque oris humiditatem. Causam tollunt antecedentem, si malum lactis vitio contractum fuerit, vel ejusdem nutritis lac corrigunt laudabili cibo, & potu.

Deinde infantium humiores ad patrem depuentes phlebotomiâ revelant, quæ eorum acrimoniam temperat, & totum refrigerat corpus. Phlebotomiæ succedunt cucurbitulæ scarificatæ, hirudines pone aures, & quandoque ano, vel sub mento affixæ, tan-

demque vesicatorium posteriori ad motum cervici. Verum *Gal. 11. meth. cap. 13. & lib. de curand. rat. per vena sect.* autè decimumquartum annum venam secare vetat, quia infantes corporis habent molle, tenerum, & parens, quod sua sponte digeritur, & diffluit, ac proinde infantes irâ debiles sunt, ut vix venæ sectionem ferre possint. Sed hoc crudele hominum genus innocentes dilaniat infantes, cum matres in liberibus contorquere deberet. Sanguinem innocentium effundunt, & sanguine cunas perfundunt: Verum *sub altare Dei auditis voces occisorum dicentium: Quare non defendis sanguinem nostrum? Et acceperunt divinum responsum: adhuc sustinete modicum tempus, donec impleatur numerus fratrum vestrorum.*

Post sanguinis effusionem, & infantium carnificinam, peccanti humori, & acuti congruam purgans præscribunt medicamentum, sed in purgante vires validas, aut saltem mediocres esse necesse est, quales in infantibus non reperiuntur.

Interea nutriti edulia præscribunt refrigerantia, qualia sunt cydonia, pyra, melpila, sorba cocta, lactuca portulaca &c. quæ si infans mandere non possit, ut menta, vel seminansa à nutrice infanti exlibeantur, imponunt, & per os circumvoluta ulcuscula contingant. Sed hæc potius nutritis & infantis alvum adstringunt, quam aliquod juvaminis aphthæ reportant.

Si hæc non prosint ad oris medicamenta, græcæ stomatica dicta recurrunt, quæ ab initio mitiora administrant, ut sunt *aqua plantaginis, ros. viol. cum syr. de ros. sic. granat.*

de moris pro oris illinitu. Vel ad decocta confugiunt ex folijs rubi, centinodia, santali. rubr. cum syr. de agristia, portulaca, diamor. vel diantho. pro oris collutione.

Si inflammatio cum aphthis fuerit, utuntur decocto, vel succo solani, portulacae & fedi majoris cum praedictis syrupis. Si livida, aut fusca fuerint, fortiora adhibent medicamenta pro illinitu, ut sunt anisum tritum cum melle, aut pulvis ex floribus chamamelis, meliloti, sanugreci cum melle rosatis, aut haec eadem cum vino coquunt, adjectis syr. myrtilli, aut diamor. Vel

℞. Aq. plantag. ℥. 6.
mell. ros. ℥. ij.
diamori ℥. iij.
alum. gr. vj

Adultorum ulcera curant vulgares iidem remedia, quibus aphthas, sed paulo fortioribus pro corporum natura, & priusquam ad localia deveniant, venam in cubito cephalicam secant, vel sanguinem mittunt e venis sub mento, vel labiorum extremitatibus, vel pro materiae proximae depletione in oris parvissimam venam aperiant raninam, & si pravi in toto redundant humores, hos appropriato exturbant pharimaco, non omittis tamen cucurbitulis scarificatis in collo, vel capulis, vel vesicatorio posteriori cervicis adinoto.

His peractis, ad topica, & stomatica deveniunt medicamenta, quae in principio ex moderatis ad stringentibus & exsiccantibus conficiunt, ut ex ros. folijs, myrti, rubi, cortici granatorum, quibus in aqua adstringente, vel vino austero decoctis pro oris collutione utuntur, addito syr. de moris, ros. sic.

vel diamor, succ. granat. fortiora parant ex succis, vel aquis lactuce, plantag. solani portulacae &c. cum pauco aceto pro oris collutione. Temporis progressu fortiora adstringentia disconveniens miscent, ut sunt rux expressi, folia olive, mespilorum sicca, myrrha &c.

Sordida ulcera cum aqua saccharata, aut syr. acetoso ablouunt, vel decocto hoc dei cum melle rosato; Vel lacte caprino, in quo ignita calx extincta sit, os colluunt. Alij Aegyptiaco utuntur unguento in aqua plantaginis cum pauco aceto, & melle dissoluto; Verum haec medicamenta erodentia adjunctum habent periculum, de in fauces illabuntur, & sic majus malum, quam oris ulcera parere possunt.

In ulceribus ex lue Venerea putridam carnem totam praescindendam, & ea parte precipitans pulverem admoveendum cum gossypio in aqua plantaginis prius infuso jubent, attamen in productum laeviant.

Aphthas nos ita curamus: Primum nutriticis habenda est ratio, si sint ex viroso nutriticis lacte, vel alia substituantur, vel idem si salsum, acidumve deprehendatur, ijs quae ejus salcedinem, aciditatemve tollunt, corrigatur. Cibus sit melioris nutritionis, vitentur acida & salsa, omittis aromatibus. Si infans male digerit lac, parcius lactetur, & bona in ipso digesto promoveatur.

Interim os saepe decocto in vino fallo colluatur, sed praestantissimum remedium est Veronica decoctum, praesertim si quid mellis rosae admisceatur. Si sint inflammatae, os collui potest decocto sanugreci, meliloti & chamamel. in aqua fedi majoris, cui additur quid anodynus mineralis; Vel aqua spermatis ranarum, in qua consuevit cancri

stercinales ; Vel gargarismate ex lacte mitigetur inflammatio, ast quia infanti ut plurimum sunt lactentes, nec gargarizare possunt, gargarismatum ulus est superfluus, si scire poterit pro adultis : itaque demulceatur *emulsionibus cum aquâ solani paratis, quibus admisceatur mucilago seminum cydoniorum.*

Si dolor superveniat, & pettinor perseveret, qui ex infantium ploratu, ejulatu, & continuis vigilijs cognoscitur, succurrendum est ei, ne corporis consumptio, vel summum vitæ periculum sequatur : extremum optimumque remedium erit, ad *narcotica*, quæ dolorem sedant, confugere, eorum tamen dosim commensurari debemus juxta infantium ætatem, & viros.

Si supra dictis remedijs apthæ non cedant, abluantur decocto *hordei, & melle rosaceo, vel decocto satureie sive veronica, cui addatur aliquod spiritus vitrioli, vel olei sulphuris per campanam, vel spiritus vitrioli Philosophici, & leviter tangantur, & sic non resistent.*

Si ex lue venereâ ortum duxerint, aquâ viridi dilutâ cum aquâ persicaria tangantur : Verum vel recidivare, vel in aliam venercam efflorescentiam transire solent, nisi lues radicatus tollatur.

Adultorum ulcera, si recentia, & simplicia sint, facillimè cedunt medicamentis, quæ proposuimus in aphtharum curatione, vel ea leniter tangendo *spiritu, vel oleo vitrioli cum, melle diluto, ne gustus spiritus, vel olei vitrioli acidiior adhuc percipiantur, & brevi tempore sanescunt.* Vel mellis rosati singulâ, vel lapidis salinis aquâ, vel aquâ

aluminis tangantur. In spiritus, vel olei vitrioli defectu, *spiritus sulphuris per campanam, vel spiritus vitrioli philosophicus* substitui potest.

Si contaminacia, rebellia, & inveterato sint, aliter tractati debent : curatio itaque instituatur, corpus idoneis deplendo medicamentis, si cacoehymia fatiget, & per aliquod tempus vulnerata propinentur medicamenta, instituta prius optimâ victus ratione, vitatis acidis, salis, & aromatibus, propinatis his, quæ acida obundant, & salia diluunt. Interim supra descriptis medicamentis fortioribus redditus tangantur, & non resistent, quod si his reluctentur, quia putrida, callosa, & maligna, expertum remedium erit, ea pluries aquâ saphirâ, vel melle rosato sals armoniaco immisso tangere. Cave, ne aquâ stygiâ ea tanges, (ut aliquorum vulgare mos est) quæ vires in metallis cluserit, nam non per hoc veneni corrosivi indolem deposuit. Si serpentina sint lixivij ex facibus reguli attractu sistuntur.

Omnia ulcera ex lue venereâ leniter tracta aquâ metallorum, vel mercuriali brevi sanescunt : verum gargarisma ex decocto persicaria, & cum mercurio dulci ex pet. um est apud nos remedium. Interdum tam maligna evadunt, ut quodcumque optimum spernant medicamentum, præsertim si profunda sint, tunc aquâ viridi cum gossypio, vel penicello madefaciendo, & cavitates tangendo, funditus exulcerationem mundificat, & mirificè sanat, quod si hæc parum profecerit, ad suffumigium topicum, tanquam ad sacram anchoram, confugere necesse est, ut de lue venereâ diximus.

CAPUT XXXV.

*De Gingivarum exulceratione,
& erosione.*

TRutinatis in genere oris ulceribus præcedenti capite, nunc in specie ejus ulcera & primò gingivarum perspicimus oportet. Sicut in epulide, & parulide gingivæ luxuriât, & intumescunt, ut dentes obtegan, ceu *primò Tome de Tumoribus cap. 36.* diximus; ita quondòque diminuitur, & absumuntur, quia exulcerantur, putrescunt, & exeduntur, ut dentium radices conspiciantur nudæ, laxentur, atque vacillant.

Signa.

Hujus affectûs signa ita manifesta, & notissima sunt, ut oculus sit observator; gingivæ enim laxæ, & flaccidæ inspiciuntur, sicut etiam lividæ & ad quemlibet attactum sanguinem & tenuem & atrum, vel fœtidum pus eruant, temporis vel progressu exeduntur, earumque caro ita absumitur, ut dentium radices denudatæ remaneant.

Causæ.

Pro hujus affectûs causâ vulgares cerebrum, ventriculum, hepar, lienem, intestina, aliasque inferiores culpant partes, quæ intemperie laborantes, vapores in cerebrum imbecillitate affectum mittunt, & cerebrum in subiectas, & debiles se exometar gingivas: idèòque gingivarum exulcerationes & exesiones ad ca-

D. Caroli Musitani Tom. II.

tarribales referunt fluxiones.

Sunt istæ vulgarij putatitiæ fluxiones veluti Sisyphi saxum, de quo fabulantur poëtæ, ut saxum ingens in montis verticem pervoluere cogatur, quod cum ad culmen benè extulerit, repente deorsum relabitur.

Nostri sententia est gingivas erodi, exulcerari, & putresceri à particulis acido-salinis, vel cum proprio gingivarum nutrimento, vel cum sanguinis massâ, vel latice edelatis, & exaltatis. Sic exulcerantur, eroduntur, & putrescunt sæpè gingivæ à salibus acidis exaltatis in sanguineâ massâ &c. præexistentibus, in scorbuticis, vel intempestivo mercurij usu in salivatione, dum salia illa venerea corrosiva mercurius secum rapit. Hæc gingivarum erosio, exulceratio, & putrefactio in plagis matrimis septentrionalibus est familiaris, & imprimis maris Baltici accolis, quia acè est refectus halicibus saluginosis.

Prognosis.

Si hujus affectûs curatio negligatur, vel non acceleretur, interdum in verum totius corporis scorbutum transit, rarius autem hisce in nostris regionibus, sed plurimis in ore manet, & nihil ampliùs mali infert, præter crebram gingivarum sanguinolentiam, saniem, corruptelam, foetentissimum oris anhelitum, & tandem dentium lapsum. Quapropter plurimùm nocet inter bibendum (ut plurimorum mos est) totam combibonum societatem in uno, eodemque cyathò bibere, cum hujusmodi gingivas exulceratis & erosis, quia talis gingivarum sanguinolentia, corruptio, & sanies in comperatione à potu eluitur, à qua cessando, aliquid putridi circa cya-

X

thi

thi margines remanet, & quid in ejus fundum refluit, quod postmodum in sanos transplantatur.

Curatio.

Curationem dirigunt vulgares ad causam antecedentem, humores vitiosos per venæ sectionem, & purgans medicamentum evacuando, calidos per apozemata, julepos, juscula medicata, & hujus farinae alia, tempore. Eorum fluxionem per cucurbitulas, & cauteria admota partibus averrendo. Verum idiotismo peccant vulgares, si credunt hujusmodi medicamentis gingivas exulceratas, & erosas curari posse. Quis vulgare unquam scabiem curavit sanguine deplendo venas, fictitios exhaustiendo humores ad totius corporis consumptionem, & coeteras exercendo carnificinas, nisi scabiosi pellem appropriato obliniverint unguento? Quomodo ergo gingivarum exulcerationes, & corrosiones his vanidis curabunt medicamentis?

Quaderè non solum his utuntur medelæ, verum, postmodum ad topica deveniunt, quæ pro affectûs magnitudine variant; unde exulcerationi, & erosioni ea admoveant medicamenta, quæ adstringendi, & exsiccandi facultate prædita sunt, *ne galla immatura, glandium salices, balanst. ros. rubr. cupressi nucis, summitates rubi idæi, pulvis corall. rubr. crud. sal. ustum, myrtice, sang. drac. myrrha, alunnen &c.* ex quibus pro collutione secundum diversos formulas diversa cum ferrariorum aqua, vel vino parantur decocta, vel opiata cum melle.

Si ulcus, & erosio, profundum, aut sordidum fuerit, pro illinitione

ouiballamum parant ita:

℞. Myrrh. elat. &

sacch. candidiana p. s.

Pulversatis ovalbumen ad duritiem coctum, & per medium scellum impleatur, postea filo probe alligetur & in cella vularia suspendatur, vas vitreum supponendo, infillabit balsamus, quo tepius illiniatur gingivæ. Si prædictis remedijs ex parte administratis affectus obstinatus persistat, vel cauterium ex ferro candente adhibent, muniris partibus circumiacentibus, quod tamdiu in parte exulceratâ, & putridâ detinent, donec humiditas sit consumpta, & locus evictus, quibus peractis, prioribus eundem colluunt, aut melle illinunt ad crustarum usque decissionem, vel ad dentium avulsionem, ut ulcus citò curetur, deveniunt, alioquin insanabile apud ipsos habetur.

Vana Galeni doctrina de ulcerum sanatione videtur, quam adstringentibus, & exsiccantibus totam collocat, ac in producti ablatione reponit, & adhuc illibata hæzæniæ, tanquam axiomata per chirurgorum vulgare, imò veterinariorum ora circumferuntur: *Ulcus, si ulcus exsiccatione indiget!* Si exsiccantia cunctis satisfacerent ulceribus, facilis esset quorumcumque sanatio, & creta, combusta ossa, & sicca filamenta indicationem complerent. In cassum laborat, qui juxta Galeni præscriptum ulcus emungit.

Ulcus, & erosionum gingivarum vera indicatio est particulas acidofalinas absorbere, & obtundere, ne ulterius corrumpant, & eas à nutrimento, sanguine, vel lacte eliminare, & hinc gingivas consolidare. Si cacochymia corpus redundarit, purgans ex-

hubea-

habeatur medicamentum; deinde, quæ salia diluunt & acida absorbent, propinentur, postmodum vulneraria portiones, quæ specifica simplicia ad scorbutum receperint, si scorbuti suspicio adsit, ut sunt cochlearia, nasturtium aquaticum, armoracia, becabungia, aquilegia, virga aurea, scordinum, trifolium scorzonera &c & ad plures propinentur dies.

Interim gingivæ pluries tangantur in die aqua lapidis medicamento si. vel aloë ex vino, & melle illisa, vel succin-
ra mellis rosati, quæ ita paratur.

℞. Aq. plantag. lib. 8.
mell. ros. simp. 3. ij. 8.
sp. sulph. aut vitrioli
ad gratum acorem m.

Vel decocto salvia, addito momento vi-
trioli de Cypro, vel decocto ster. rosar.
aquilegia, bistorta, & malva.

Hic malo peculiariter aquilegia
mederi videtur, & efficax est sequens
linimentum hoc modo paratum,

℞. Pulv. fol. aquileg.
salvia,
mentha crispa,
nuc. mosch. &
myrrha ana 3. 8.
alum nsti 3. j.
mell. puriss. q. s.

Mel leni carbonum igne incalascet, &
despumetur. Despumato, & calenti pul-
veres inspergantur, ut s. linimentum,
quo gingivæ quotidie illiniuntur. Non
credibile est quantum in hoc affectu
curando hoc linimentum valeat.

Si gingivæ putridæ sint, & foeten-
tissimam ipient animam, fortiora ex-
postulant, tunc sequenti nostro medi-
camento pluries à nobis experto tangi
possunt.

℞. Aceti ros. 3. iv.

mell. opt. 3. j.
virid. aris 3. j.
salis armoniaci 3. 8.
sang. drac. 3. ij.
alum. 3. j.
pulu. sabina 3. 8.

Stent in loco calido per XII. horas, deinde
bulliant parum & post refrigerationem
decanta, & utere tangendo. Efficacissi-
mam quoque expetti sumus aquam
viridem, quam cap. 30. de Oxen's des-
criptissimus. Vel elegans remedium est
mel rosaceum cum spiritu salis ad gra-
tum acorem impregnatum.
Interim os colluatur sequenti collu-
tione.

℞. Radic. tormentill.
flor. hyperic.
fol. salvia.
roris marini,
& summitrubi Idai ana m. j.

Coque incisa in vini lib. ij. 8. vase opti-
me clauso, nequid expires, post refrigera-
tionem fiat colatura pro os collutio-
ne. In scorbuto autem os colluatur
insuso nasturtij aquatici, & cochlearia
in vino.

Post gingivarum mundificationem,
pro cicatrizatione opiata sequens cum
petijs lincis super, gingivas applice-
tur.

℞. Sang. drac. &
myrrh. ana 3. ij.
sarcocoll. 3. j.
bol. armen. 3. j. 8.
aiceis 3. ij.
radic. aristolecb. rotund. &
flor. hyperic. ana 3. 8.
pulverisa, m. cum melle
despumato, & s. opiata.

Pro hoc, & alijs gingivarum affe-
ctibus, imò pro dentibus, & gingivis
præservandis à varijs affectibus præ-

stabilissimā est sequens *Eitmanleri* mixtura, ut

℞. Aqua plantag.

sedi minor, ana ʒ. ij.

salis armoniaci,

salis tart. ʒ. ʒ.

vel ad ana ʒ. j. m. filtra.

C A P. XXXVI.

De Dentium dolore.

Sunt gingivæ, de quarum exulceratione, & erosione supra egimus, illæ portiones duriusculæ carnæ, quæ dentes, valli instar, cingunt, eosque in suis alucolis stabiliunt; eapropter cum res ita sit, hæ gingivæ hoc in secundo nostro Tomo chirurgico de dentium morbis agere nos invitant & primò de dentium dolore.

Dentium dolor primâ facie levis videtur, attamen non rarò cum alijs gravioribus symptomatibus, quæ corpus affligunt, comparandus est; est namque immane tormentum, & miserabile supplicij genus, ad eò vulgarissimum, ut pauci reperiantur, qui eum non experiantur: aliqui enim aliquantulum mitius eo vexantur, alij longè acerbius, & tandem quosdam tam immanis occupat dolor, ut præ immanitate & impatientiâ ejulantes sibi ipsis violas inferant manus.

Quisnam in dentium dolore sit locus affectus, ex ipsâ nomenclaturâ ariolatus fuit *magister Gal. s. de comp. med. sec. loc.* ubi dentes in propriâ substantiâ sentire asserit: Verùm parcite Galeni manes, nam qui oppositus est denti evulso attritionis penuriâ suam superat leticiæ, & linâ atteritur

absque doloris sensu, quia planè sensu sunt destituti, ut alia ossa, nec membranis nec nervis præditi sunt, ac insensibiles omninò sunt, idèdque non doleant, neque ab igne, neque à ferro.

Dolor falso dentibus adscribitur, sed tribuendus est membranis tenuissimis exquisitè sentientibus præsepia eorum investientibus, & nervulis molibus ex quinto pari, qui per dictas membranas radicibus alligantur, vel cavitatem ingrediuntur, ubi disperguntur, & parvulis propaginibus cum substantiâ quadam mucosâ in dente medio repositâ, miscentur.

Signa.

Ad dentium dolorem cognoscendum non opus est signis, cum ab ægrò medicus certior fiat, tantùm cognoscere debemus, an dolor sit in gingivâ, pro quo gingiva inspicienda est, utrum inflammatio, tumor corrosio, seu putrefactio in eâ appareat. Si nihil horum adsit, doloris causâ vel in membranis, vel in nervulo, vel in dentis cavitate erit. In membranis quidè dolor non est ita profundus, sed secundum latitudinem extenditur, & quædam doloris mutatio animadvertitur. In nervulo si dolor sit, profundior & vehementior est. In cavitate verò si in mucosâ substantiâ in dente medio repositâ, obtusus erit, sed diurnus.

Si dens est cariosus, & à verme intus obsessus, dolor est interpolatus ad ipsius vermis morum, exiguis delinens, & rediens intervallis, & ipsius vermis motus in parte quadam percipitur.

A spiritu flatuoso cognoscitur ex illius atrocitate & divulsionis, seu, qui in parte

partē percipitur vel quī exiguo cessat spacio, ac faciliē discutientibus curatur remediis.

Vulgares, quorum medicina est ex calore, & frigore aggregatum, doloris signa ex calore, & frigore assignant: Si à calore dolor oritur, præcesserunt caloris causæ, multo est intensior, caloris sensus in parte percipitur, à frigidis curatur remediis, & à validis intenditur: Si verò à frigore oritur dolor, signa prædictis contraria apparere solent. Verum in hoc allucinantur vulgares, & videntur ex caudā vulpem, & ex ungue leonem cognoscere. Non benè inferunt dentium dolorem à calidis intendi, & à frigidis fitti: igitur à calore. A frigidis exacerbari, & à calidis curari: igitur à frigore. Non inquam, irā dicant; possunt enim calor, & frigus per accidens excitare dolorem, spiritus S. salinos, vel acidus impetuosè movendo, & illos faciēdo penetrare, ideòque ratione motus, quem acquirunt, intensissimos excitant dolores, & tunc à calore esse putantur, cum frigida, vel gelida dolores sistant, motum illis auferendo, partes densando, & penetrationem intercludendo. Cum calida dolores sistant, à frigore creduntur, quia aliquandò calor, præsertim cum multis est, poros aperit, & exhalare facit, & tunc dolorem vel sedat, vel aufert, quod facit etiam aliquandò validus calor.

Cause.

Gregarii medici dentium dolorem vel à quadam simplici intemperie, vel à catarrho in capite defluo fieri imaginantur, & quandòque à partibus promanare inferioribus, qui in maxil-

larum, & alveorum dentium membranas, vel in nervulum dentis radici insertum, vel in ipsam dentis substantiam confluit.

Verum decipiuntur vulgares à fluxione ad dolentem dentem depluente, quam ægri sentiunt, & eò magis ab assiduā salivatione, quæ in dentium dolore sæpe perpetuò esse solet. Insuper falsum est in propriā substantiā dentes humorum affluxum, ac distentionem recipere posse, cum sint corpora solidissima, & durissima, ac lapidibus vix cedant, & secundum *Helmonstii* sententiam dentis materia non est merè ossæ, sed inter os, & petiam media, seu neutra.

Alii vulgares cum caloris, & frigoris doctrina doloris proximam causam in continui solutione statuunt, quam calor, & frigus patit, ita frequenter accidere solet, cum iuscula nimium servida, & alia cibaria calida quotidie ingerantur; mox his potum superaddendo frigidissimum, his contrariis faciunt. Non secus ac silex, aliutve durus lapis, sive vulgaris, vel gemma, vel vitrum, vel crystallus candens, in frigidam projectus aquam, hisce contrariis non potest non dehiscere, & in minimas non dissilire particulas. Sed de caloris, & frigoris nominis subditi de capitis dolore egimus. Præterquam quòd inter huiusmodi contraria non est per comparatio, longè enim distat à candore fervor, nec dens à fervido iussu, imò difficile igne actuali calcinari potest, ut lapis per aliquot horas in candore detentus.

Vera dentium doloris causa sunt particule salinæ, & acidæ crispatae, & angulares velligantes, divellentes, contrahentes, distendentes, vel pungentes membranas tenuissimas dentium al-

veolum succingentes, vel nervulos ex-
quisito sensu donatos, radicibus fortiter
alligatos, vel cavitates ingredientes.
Hæ particule vel cum succo nutritio,
vel sanguine, vel lymphâ ex proprijs
conceptaculis in interiorem dentium
cavitatem, aut membranis, aut ner-
villos inferuntur. Huiusmodi particu-
læ acuræ, vel cum cibo, potu, vel aëre
communicantur, & præsertim denti-
bus jam erosis & cavitare ad medul-
lam interiorem, vel ipsos vervulos in-
feruntur. Excitatur magnopere den-
tium dolor à vitiosis particulis per sta-
gnationem ob obstructionem fa-
ctam, humores hypochondriaci,
cacochymici, visceridi, falsi, acres,
dentium membranulas cumulati,
vel evasati, & circa fibrillis nerveas,
& radices, vel cavitates odontalgiz
sunt causa.

Cibus immodicè sumptus non so-
lùm multum facit ad hoc malum pro-
ducendum, sed etiam pravâ qualitate
imbutus, sic nimis salica, infumata, al-
lia, czpæ, aurantia, limones, acetum
&c. aliaque succi pravi edulia nocent,
que actimoniâ sero, seu lymphæ im-
primunt, in primis dulcia dentibus in-
fensa sunt ob aciditatem, quam in gluti-
nosis dulcedinis particulis latentem
viscidam, & vinctam habent, quæ
deinde caloris ope extricatur.

Idem de potu dicendum putamus,
dùm copia sua, & intempestivè cige-
stionem interturbat, isque intensè frigi-
dus, & potissimùm in gluvem redditus
vitandus. & præprimis si varia solum
genera intra se continet; quippè no-
tum est frigida coagulare, & dentibus
esse hostilia, & eo magis, si iusculis
calidioribus assumptis de super frigidus
hauriatur potus. Nocet potus intensè

calidus dentibus, hinc & ipse cocolas-
tis, vel theæ, vel cassæ potus ferulans
dicitur dentibus insensibilissimus.

Aër quoque multum odontalgiz
favet, hinc accolæ maris Balthici, &
septentrionales alios populos dentium
doloribus affici notum est; volitant
namque in aëre varia salium genera,
inspiratione furtivè quodam modo in-
trahuntur. Contrà in Ægypto
ubi insignis est aëris clementia dentes
nec dolere, nec cariori feruntur. Autum-
nus maxime odontalgiz ferax est, tunc
enim magis aër varijs salium particulis
conspurcatur, ut suliùs diximus in no-
strâ *Trutinâ lib. 1. cap. 8. de Anginâ,*
& *anginâ epidemicâ*, cujus occasione de
febris ex aëris mutatione egimus. Sic
& hyems, flante Boreâ, tunc tubuli
obstruuntur à frigido aëre, unde hu-
morum stagnatio facilior redditur ab
aëre acido nitroso.

Fit quandoque dentium dolor, cùm
gingiva est detecta, vel malè digesta est
ulceri alimenti sui materia, & circa
dentis radicem putrescens.

Vermes in cariosis dentibus geniti
esse possunt doloris dentium causa:
fiunt vermes indentium carie ex ovu-
lis, dùm mediante cibo à muscis, alijs-
uè insectis oculis suis conspurcato,
dentium cavitati inferuntur, hæ ovu-
la, mediante calore à reliquis cibis sus-
citato, ibidem in vermes excluduntur,
vel aliunde ibidem congeruntur. Hi
vermes doloris sensum inferunt, re-
pentes, jectigantes, vel mordentes, &
vellicant nerves fibrillas.

Prognosis,

Dolor, qui per intervalla recurrit, si à
substantiâ admodum volatili, quæ quoties
gene-

generatur, dolor recurrit, & quoties resoluitur, sedatur; quod si in aliquo dente sedem fixerit, tunc à substantiâ vix dissilabili oritur, & ibi scire non desinit, & hinc crebra odontalgia, donec caries, cavitas, pueredo &c. quas etiam gingiva ita pluitis rectamenti ferax sollicitat, donec aëti detur accessus; tunc in isto dente dolor cessare solet, sed temporis tractu in alium transit dentem in quo novum dolorem, cariem &c. excitat. & hac de causâ multi redduntur edentuli.

Quandòque dentem non attingit, sed gingivas, in tumorem attollit, (& dentis evulsione dolor non remittitur) qui transpiratione resoluitur, & interdum gingivas inflammât, earumque tumor suppuracionem, exulceracionem, & quandòque (quod pejus est) maxillæ cariem inducere solet.

Situmor in malis oboritur, doloris dentium resolutionem portendit: rationem assignant vulgares, quia naturæ robore, vel medicamenti virtute transfertur fluxio ad partes exteriores, & non amplius ad iuterquam dentis cavitatem decumbit. Verum etrante, dum, à cerebro, vel à diffisis partibus defluxionis decubitus mendicant: Sentiant ægri humoris defluxi decubitus, quia latex per nervos, arterias, venas & ipsum corporis habitum ad læssitam defertur partem, ut exoticum cicuriet hostem, & indolentem excitat tumorem, si non sit qualitate molestus.

Dentium itaque dolor simpliciter morbus lethalis non est, non tamen est parvi facendus, ne mors inde sequatur, multi enim ob doloris vehementiam mori maluerunt, quam diutius tor-

queri, & nostrates mulieres parere malunt, quam dentium dolore corripitur, imò sæpè ægros ad insaniam adduxit. Si membranulæ, seu magis nervuli circa radices, ubi inseruntur, à vermibus, vel à salinis, acidisve particulis stagnantibus torquantur, facillè spiritus animales, & totum corpus in consensum trahi possunt, & ob doloris immanitatem, vigilias, inquietudinem, aliæque accidentia, vires insigniter deficere possunt, imò non ægrè convulsiones oboriri. Ubi odontalgia cum stridore, & febre ardente, seu maligna maritat, mortem porrendit.

Curatio.

Curant vulgares dentium dolorem ita: si ab humoribus calidis ortum ducant, cephalicam secant è brachio ejusdem lateris, revulsione gratiâ, si materia è capite defluat; vel basilicam, aut saphenam, si ab inferioribus ascendat partibus, tundunt; aut cucurbitulas in scapulis scarificant. Venas sub linguâ derivationis causâ incidunt. Nonnulli venam pone aurem aperiunt. Quidam aures scarificant. Si dolor à frigidis excitetur humoribus, venæ sectionem minus convenire fereantur, fluxionis tamen ratione etiam usurpare quia inter revellentia remedia locum tenere existimant: Verum tunc minorî copiâ sanguinem detrahunt, nisi plethoriæ signa appareant, ratione cujus etiam si materia sit pituitosa, liberalè venæ sectionem instituunt juxta Galeni præceptum qui in magnis morbis & vehementissimis doloribus promptissimum remedium esse largam sanguinis missionem asserit.

Cœterum errat Galenus, nam magnus

gnus dolor remediū magnitudinem indicat, non autem venæ sectionem; ac proinde magnum remedium illud existimatur, quod magnum curat morbum; non quod sit unum ex universilibus prædiis putativiis, ut est purgans medicamentum, & venæ sectio apud vulgares. Sit cuiuscumque conditionis remedium, sufficit, ut magnum curet morbum, ut est potius aqua frigida in febre ardente. Nec revulsionis, aut derivationis gratiā desunt frictions, extremorum ligaturæ, crurum lotiones, vesicatoria brachijs, cervici, vel post aures applicata. Imo in capite, ejus manus, quæ est & conspectat, & latere doloris, flammulam, vel rancunculum imponunt.

Sialii à sanguine peccant humores, purgans exhibent medicamentum humoti peccanti accomdatum, in forma potionis, si peccans humor fuerit calidus; si verò frigidus in formā pilularum secundum doloris, vel peccantis naturæ exigentiam.

His peractis, si materia adhuc fluat, adstringentibus inhibenda est, si à capite fluat, fronti, & temporibus *emplastrum ex gummi elemi, de massicho, myrrhi, vel contra rupturam* applicant; si à partibus inferioribus sursum scandat, quæ ventriculi os adstringunt, & roborant, adhibent. Verum hæc adstringentia, & repellentia (posito, quod verum sit, quod vulgaris sententia asseverat) non sine ægri periculo adhibentur, præcipuè si fluxio copiosior esset, posset enim interdum ad fances irruere, & ægrum suffocare. Cessante fluxione, discutientibus quibus adstringentia admiscunt, utuntur.

Medicamenta topica in duas dividuntur classes, vel pro fluxione calidâ,

vel frigidâ. In calidâ pro oris collutione varia adhibent decocta *ful. n. yrid. ros rubr. radie. exylapath. filicis, tormentille, urtica &c.* Vel *fedi, plantag. lactuc. sem. papav. alb. hyoscyami &c.* *Billiant in sufficiens aceti quantitate ad tertiam partem consumptam.* Cæterum acetum per ebullitionem ob phlegmaticâ evaporationem fit acerrimum, & nihil differt ab aceto destillaro. Putant vulgares acetum frigidum, & vinum calidum, & tamen acetum est vini soboles per secundam fermentationem: Id falsum deprehendimus, solvit enim corallia, & uniones, quod si frigidum esset, urique non eveniret. Vitandum itaque est acetum, tanquam hostilis glacijs in dentium dolore à causâ acida, & præcipuè si gingivæ sint simul affectæ, quia per se dentibus nocet, dolorem adauget, eosque, si corrosi sunt, magis corrodit. Vel prædicta decocta in vino parant ad tertiam partem consumptionem, sed perperam, nam volatilis vini spiritus abieci in auras, & insipidum phlegma nullius energię compos remanet. Multum prodelle existimant aquæ frigidæ in ore retentionem.

In dolore dentium ex frigida fluxione diversas oris calidas collutiones parant *ex origano, menthastræ, hyssopo, ligno guajale, rore marino, salvia, betonica, saundersia, radice pyrethri, sem. nigellæ, &c.* *per succum Arab. &c.* ex quibus variatum decoctionum formulas concinnant. Vel *ex cayophyll. annuam. pipere, pyrethro, zingibero, nucis mosch. &c.* decocta parant in vino guarnero pro calidâ otis collutione. Vel allium lub *cineribus colum* denti dolenti imponunt.

Si dolor ita immanis sit, ut his præ-

dijs adhibitis non cesset, ad narcotica deveniunt post universalia præsidia quæ dolorē sedant, & fluxionē cohibent, ut est *theriaca recens, aut Mithridatum Philonum Romanum, requies Nicolaj &c.*

His omnibus incassum adhibitis, dentem evelli suadet, & primò gingivam à dente scalpello separant, deindè tenaculâ, vel rostro corvino, vel pellicano dentem erunt, & tandè, expresso à gingivâ sanguine, vino rubro, vel poscâ sanguinis fluxum sistunt. Verùm quia nonnulli hanc chirurgiam exhorrent, tunc corruptentibus, & dentes mobiles reddentibus utuntur, ut dentes manu extrahi possint. Hujus finis est *pyrethrum in aceto maceratum per 40. dies aut rishymali succus*, verùm dentes sani, ac gingivæ cerâ obductâ præmuniuntur, & tantùm dens malè affectus illiniatur, & infra horæ spatium digitis eximi poterit. Eodem ferè modo applicari potest *gummi hedera, vel olea*, & dens brevi spatio in partes dissilit.

Dentium curatio pro causarum diversitate institui debet, undè si dolor ab acido ortum ducit, quæ acidum obtundunt; si à salso, quæ salsum diluunt, administrari debent; si à vermibus, quæ vermes enecant; & si à spiritu flatulento, discutientibus remedijs faciliè curatur.

Purgatio, & phlebotomia in dentitû doloribus administrari non debet, quia nihil prosunt, imò maximè obsunt. Coeteri, quos exercent cruciatus vulgares, quibus miseri torquentur ægroti, sunt peccatorum pœnæ; *Deus enim, delinquentes in conspectu suo tradit in medicorum manus.*

Convenientia odontalgica erunt li-

quores, quibus dolentes tanguntur dentes, vel in ore detenti, qui dolorem demulcendi, humoremque dolorificum ad se arripiendi energiam habent. Verùm quia quandoque magis laticis affluxus ad laceratam decumbit partem, ut exoticum cicuriet hostem, adhibenda sunt, quæ laticem per assiduam extirbant salivationem, & hoc modo multoties eum laticis exturbatione doloris causam eliminavimus: hujusmodi est *nicotiana sumus ore exceptus, vel angelica radix in ore detenta vel pyrethri*, quam vulgus *radicem sancta Apollonia* appellat. Quòd si hæc medicamina respuantur, ob caliditatem ingratumque saporem, & præcipuè nicotianæ fumus ejusvè masticatio ob prava symptomata, quia non omnibus est usus optimum succedaneum erit *massichen in ore versari*, vel eam dentibus premere.

Multum conferre possunt decocta, quibus dentium collutiones sunt, ut

*℞. Vini alb. generosi 3. v.
radic. hyoscyam. alb. 3. ij. ℞.*

Bulliant clauso vase, & colaturâ calidè os ablatur. Vel fiat oris collutio ex decocto radicis hyoscyami, & ejusdem seminis, ac sem. lactuca, & papaveris albi ex vino cum opij ʒ. ℞. Aut decoque hyoscyami radicem cum herbâ persicariâ in aceto, & calidè collue, & efficacissimè dentium dolores sistuntur; in hyoscyamo enim, receptaculum, seu siliquæ seminis dentis maxillaris figuram habeat: idèque radix, ejus oleum, semen seu liquor expressus infigne est odontalgicum. Decoctum comarum sabina calidum per aliquod temporis spatium in ore detentum dentium dolorem demulcet causam extrahit, & si fortè in dentis cavo vermiculi cœlentur, illi simul extrahuntur, & exterminantur

Si hoc quandoque non juverit, ad *lapidem prunella in rosulas fufum* confurgendum est, quantum una in ore ad dolentem dentem retenta multam extrahit ex ore salivam, cum qua doloris causa plerumque eliminatur.

A quacunque causa oriatur dentium dolor, sequentibus odontalgicis non tantum demulcetur, verum etiam tollitur; ita est *radix lapathi acuti in saleolas secta, & exsiccata*, & denti dolenti imposita: Verum vere ante germinationem colligi debet. Magnus efficaciarum est retortâ, quam per descensum, sed phlegmâ facimus *oleum ligni Heraclini, sive ligni corylini*. Idem præstat *oleum camphoræ, & cinnamomi*, in quo gossypii frustulum intinctum denti admoveatur, verum si dens cariosus fuerit, illius cavo inferitur.

Si dentium dolor sit vehementissimus, narcotica expostulat, ita est *camphoræ spiritus*, in quo applicando, cavendum est, ne gingivæ à menstruo erodantur; unde aliqui utuntur *camphorâ ipsâ in mortario solutâ cum vino, vel vino spiritui*, sed vinum quandoque suspectum est ob aciditatem, quæ semper in eo expetitur; ideoque in odontalgicis medicamentis majoris suspensionis erit acetum, quando dolor ab acido ortum ducit. Interdum recurrendum est ad vulgaria opiata, quæ, ut citius penetrant, dissolvi poterunt cum *aquâ salviæ, rosis marini &c.* cum quibus etiam solvitur quandoque *opium cum crocovo sturn* Solvunt interdum dentium dolorem suffumigia ex opiatâ, ut *ex seminibus hyoscyami*. Profunt etiam suffumigia *ex succino, vel ejus oleo*, vel applicatur specificum *gummi anime* cum gossypio. Aliquando admoveatur

oleum caryophyllorum; jâniperi; rosis marini, nuci moschata, guaiaci, spica &c. quæ miscentur etiam cum *camphorâ, & opio*, sicut

*℞. ol. caryophyll. gut. ij.
camphoræ parum.*

misce in mortario, & cum gossypio denti impone. Vel

*℞. camphoræ ʒ. ʒ.
opii gr. iv.
Spiritus vini ʒ. ij.
aqua salvia ʒ. vj.*

misce, & calidè detineatur in ore. Efficacissima erit tinctura landani opiatâ. Vel indatur denti, si cariosus, vel perforatus fuerit, pilula de landano opiato, vel de cynoglossâ.

Respicendum est etiam quàm maxime ad causas, nam aciditas dentem inficiens, tollitur *oleo caryophyllorum, portulacæ &c.* & sic in aliis procedendum appropriatis remediis. Interdum ex dolore inflammatio vicinarum partium procedit, & tunc medici vulgares putant doloris causam esse calidam, & cavendum est in hoc casu à medicamentis, quæ nimium calorem excitare valent.

Si dens dolens sit cariosus, ejus dolorem demulcet sequens electuarium, ut

*℞. Radic. bistortæ, &
pyrethri ana q. n.
alun. ustiparium*

contunde invicem, & cum suff. mellis quantitate fiat electuarium, cujus quantitate pisi, cavo denti immitte. Sedat dolorem, laticem extrahit, & vermículas enecat.

Pro certissimo experimento habemus contra dentium dolorem *Rana terrestribus tibias optime à carnibus mundatas*, quibus si dolens tangatur dens, om-

his abigitur dolor. Itē *dens ex maxillā mori* evulsus, & cum radice suā detē dolētē rāgēs, dolorē tollit, & dentē glacie frigidiorē reddit, qui temporis tractu vel frustulatim cadit, vel ad pristinam abit temperiem.

Si à vermibus dolor excitetur, hos euecat *sabina*, *absinth.*, *sanaceti*, vel *prun.*, *syvest.* cum radice angelice, & semine zedoaria decoctum pro gargarismate. Alii commendant *sumum haliacacabi*. Quidam *fimum seminis hyoscyami* per infundibulū ad detē dolētē exceptum unice prādicant. Itē omnia amara, ut sunt *myrrha*, *aloe*, *colocynthis*, *cassia minor* &c. Ad vermiculos fallendos, & eliciendos quandōque *dulcia* prosunt, sic mel denti carioso impositum vermes allicit.

Dentium dolor primis mensibus gravidis quandōque molestus esse solet. Oritur iste dolor à spiritu falso, vel acido ex sanguinis redundantia, non verò ob menstruorum retentionem, cum gravidæ menstruis non tententur, irrucite in nervulos, vel membranas, à quo contrahuntur, & ex contractione dolor. Dentium dolor in nonnullis est certissimum graviditatis signum. Cessant hi dolores ut plurimum temporis progressu, ut cessare solent alia gestationis symptomata, quæ in conceptionis principio molestia esse consueverunt. Sedatur dentium dolor in gestantibus remediis suprà notatis; Si verò gravior sit eodem modo succurrendum est, ut suprà notavimus.

Si omnibus hisce remediis dentium dolor non cedit, vel post aliquod temporis intervallum recurrere consuevit, quia dens valdè exesus, vel cariosus fuerit, optimum, & infallibile remedium erit, cum ferro extrahere, quo

extracto, statim omnis vulgarium fluxio evanescit, & dolor non amplius reversurus remittitur.

C A P. XXXVII.

De Dentium Stupore.

Dentium stupor, græcis hæmodia, est molestia, qua dentes tactus sensu vitiantur, & irā stupentes evadunt, ut non nisi magnā cum molestiā cibum commasticare queant.

Signa.

Malum hoc sita dentes occupat, ut non solum mandentes ex eo intolerabiliter doleant, verum etiam nec cibum mollem mandere possunt, imò nec digitis suis æger attingere præ dolore vix sustineat. Quapropter perperam dentium stupor appellatur, qui est sensus abolitio, sed potius ad dolorem pertinere videtur. Vndè rectè *Capivalcus* hæmodiam dolorem dentibus propriam esse asserit.

Causa.

Galenici in dentium stupore intemperiem frigidam nervos antedictos instigare autumant, quam frigida etiam externa occurrentia adaugere credunt. Horum nonnulli velint nolint, etiam illa crepent, ad saporem acidum confugiant, verum dentium temperiem immutantem, ad quem etiam austera refecit.

Stuporis dentium causam ab acidis, & austere provenire asseveramus; hæc namque non modo ex particulis acutis,

sed etiam hamatis constant, quæ ita fibras, & nervulos nimium, constri-
gunt, & rigidos reddunt, ut spiritus
simul ligentur, nec ob fibrarum, &
nervulorum rigiditatem libere move-
ntur. Unde fibræ, & nervuli nimis tensi
ad quemcumque leviorum contactum
molestè moventur, ut vi quadam fle-
ctantur, quam molestiam spiritus ad-
vertentes, communi sensorio offeunt
cum quadam ineptitudinis ad motum
ideâ, & stuporis perceptionem exci-
tant. Hujusmodi particulis abundant
fructus valde acidi, acerbî, & austeri,
ut pruna sylvestria, omphacium, cor-
num, amarenæ, mala limonia, citria,
aurantia, cotonea, ribes, & alia poma
immutata, & acerba. Item potus vini
acidiusculi, aceti, spiritus vitrioli, sul-
phuris &c. ad quorum comestione, aut
haustum facillè subsequitur hæmo-
dia. Similiter saccharata hunc peregri-
num acorem producere solent, quia
occultum in se habent acorem. Id
etiam evenit ab humoribus acidis vo-
mitu rejectis, quod multis affectione
hypochondriacâ, vel scorbuticâ labo-
rantibus accidisse observavimus, qui
tam acida vomitu rejecerunt, ut dentes
stupidi iis ita indè evaserint, ut per in-
teregium diem vix aliquid comedere po-
tuerint. Sic & affectus iste, quod mi-
nimum, ab imaginatione sæpè oboritur,
quando alium res acidas, & acerbis
masticantem videmus, aut tetricum, &
asperum sonum audimus; nam imagi-
natio furtivo modo movet in corpore
humores. & eos præcipuè, qui cum re,
quam imaginamur, aliquam habent
analogiam. Hieronymus Fracastorius
tamen de syphil. & antipath. cap. 14.
ad auditus organum affectum causam
refert, inquit: *Similis est fræguis.*

*valde sit sonus, & stridulus, applicatio
vim patitur, quasi in angulo facta, tùm
membrana auditus quasi illa offenditur,
undè contrahitur repente, ac cum eâ
simul & nervuli quidam usque ad ra-
dices dentium, in quem locum subito in-
cidens novus aer horrorem quandam cir-
ca dentes facio.*

Prognosis.

Dentium stupor est molestus sit,
non semper difficulter curatur; sæpè
namque nullis adhibitis remediis
absque ullo dentium damno cessat.

Curatio.

Curant vulgares dentium stuporem
quibusdam remediis specificis per ex-
perientiam observatis, ut portulacâ
viridi masticatâ, cujus succus lentore
suo dentibus adhærens, aciditatem è
dentibus extrahit. Rhasis amygdalas
amaras, & ceram masticatam com-
mendat, quia nigritudine suâ illam
congelationem remittere credit. Alii
radices glycyrrhizæ, aut pineas, avel-
lanas, juglandes extollunt, quibus aci-
ditatem obrundere imaginantur. Non-
nulli casum recentem, aut vestigiorem,
vel calidum ovi vitellum laudant.
Plerisque panem è furno calidè extra-
ctum masticandum exhibent, vel oris
collutionem cum viro calido præci-
piunt. Verùm si dentium stupore la-
borans masticaverit panem è furno
calidè extractum, calidum ovi vitel-
lum, casum recentem, vel vestigio-
rem, poterit utique hos deglutire, &
optimum vini cyathum superbibere,
& ire dormitum, & sic manè à den-
tium stupore immunis erit. Ioannes
Hara

Hartmannus in dentium stupore jubet, ut stupidi dentes *fale fricentur*, vel *masticetur pannus Laneus*, vel *pilosus pileus*. Verum errant vulgares, nam stupidi dentes non tantum cibum mollem mandere non possunt, verum etiam nec tangi, unde si supra enarrata masticare possent, utique nullam molestiam cetera alimenta contererent. Præterea his nulla victus inest acidum dissolvendi, infringendi vel corrigendi.

Hæmodiam curant remedia, quæ particulas acutas, & hamatas non solum hebetant, sed quæ emolliunt, & fluxiores reddunt fibras nervosas, & eas blandè commovendo reficiunt, ne ulterius rigescant. Hæc curatio non modò producti eliminationem respicit, verum etiam causæ, quæ si interna sit, auferatur remedijs millies à nobis decantatis. Producti curationem perficit *decotum salviae, sampuci, baccarum lauri, vel essentia salusæ, roris marini, junctura juniperi, vel balsamus Peruvianus* cum gossypio denti affecto applicatus. Omnium optimum est *urina hominis calidè dentibus adhibita*, vel *sal armoniacum in aqua portulacæ solutum*, & applicatum. Vel omnium remediorum optimum est, si stupidi dentes *alkalibus fricentur*, in quorum defectu os *lixivio colluatur*, vel *vinispiritu*, vel *oleo sartari per deliquium*, si tangantur.

CAPUT XXXVIII.

De fædo dentium colore, & Sorditis.

Dentes candidos, & nitidos natura efformavit, quid enim pulchrius esse potest os albis dentibus præsitum

spectare? Profecto videtur natura tractum, in quo prodentibus tot margaritarum spectantur, & tamen quos natura dealbavit, incuria nigricavit! Quid abominabilius est dentes nigros, vel lividos, vel fuscos, vel foetentem mucilaginem, tartareumque tophum habentes aspicere? Equidem dentes ita sordidi hominem dedecorant, & adstantibus nauseam patiunt. Quisque dentes candidos & eburneos habere potest, cum ex incuria tantum hic proveniat affectus, si debiro mundentur modo, & in suo conserventur renore.

Signa.

Signa ad simplicem oris hiatus sunt, ita manifesta, ut ea describere non oporteat.

Causæ.

Vulgates dentium sordiditatem, & foeditatem humoribus vitiosis, in illorum superficie hærentibus refundunt, quod si verum hoc esset, tantum cachexia laborantes hoc afficerentur malo; & vaporibus sursum exhalantibus, quod etiam à veritate alienum cognoscimus, nam vapores sursum exhalantes in simplicem se condensant aquam; crebra dulcium eduliorum usus, & hoc malum solum nobilibus, & magnatibus esset familiare: Verum id credimus anile esse inventum ad arcendos pueros à dulcium eduliorum usu; fructuum nigrorum, ut cerasorum, myrtillorum, mororum &c. masticationi, quasi potus & saliva talem nigredinem superficiem diluere non valerent. Præterea, qui tales nigros nunquam degustarunt fructus, cur tali laborant effecta?

Crapula nonnulli refundunt, quod maxime canibus, & fribus, cum voracissima, & omnivora sint animalia, hoc contingeret malum. Multi frequentia laeticiuorum usus & præcipue, caseo putrido, alij cibis nimium calidis & alij succentis anilibus fabulamentis. Qui incuria, & mundificationis dentium neglectui tribuunt, de medicamento agunt præservativo, non verò delujus morbi causa.

Non negaverimus tamen ab argenti vivi suffumigio, & inunctione, in lue Venerea, dentium scorditatem provenire, sicut etiam à mercurio cosmetico, vel sublimato in aqua cisternæ soluto, cum limonum succo, ovi albumine cucurbitæ seminibus, & camphorâ, quibus Neapolitanæ mulierculæ pro dealbandâ facie utuntur, plerumque dentes sædo imbut colore, quia poris se insinuat, & temporis tractu dentes inficit, quomodo id accidat, ex infra dicendis eruitur.

Post quàm tartarus, ductore *Paracelsi*, in medicinam fuit ingressus, non defuere medentes, qui morborum myriades tartaro adscripserunt, & tartaro quoque scordum dentium colorem, & sordes tribuere; ac proinde voluit *Paracelsus* ciborum tartarum tanquam propinquiorem in dentalem lapidem transire, potius verò tartarum in renum & vesicæ calculos: putabat enim nil cibalis tartari ad renes, & vesicam pertinere, & reverà tartareum lapidem dentibus obnasci cernimus, tartaro correspondentem, nihilominus in cibo reperiri negamus, &

Primo, febricitans, qui triduo, vel quadriduo, nihil edit, aut masticat, in dentibus lapidescentem contrahit mucilaginem, imò copiosiore, quam si

benevalens comederet; constat itaque mucilaginem lar descendentem circa dentium radices, quæ extra gingivam se offert, non esse ciborum tartarum.

Secundo, qui nihil edit, & bibit, nisi per Infundibulum ob oris, palati, linguæ, faucium &c. defectum, nihil masticat, neque alimentum dentes attingit, & tamen quotidie dentes incrustantur, non aliâ quàm comedens, & bibens.

Tertio, si quis in singulis comestionibus os, & dentes exquisitè abluat, fricet, abstergatque manè tamen novum lapidescentem, olidumque lentorem circa dentes reperiet, qui ex cibo remansisse nequit.

Quarto, si tartarus ciborum esset soboles toties esset diversus, quoties cibi diversi.

Quinto, qui simplici pane, & aqua jejunant, non aliter ac qui panem, carnes, caseum &c. comedunt, æquè in eodem olido conveniunt lentore. Constat igitur vanum esse *Paracelsi* de tartaro circa dentes commentum, cum alimenta tartari sint insontia, ut fusiùs probet *Van-Helmont*.

Pro nostrâ sententiâ cum supra citato dicimus, quod lingua tunica amicitur tenui & porosa, ut sapes penetrerent, ejusque substantia est mollis laxa, rara, & spongiosa ad imbibendos sapes aliquo madore vestos. Hæ potulitates inter madendum madore replentur, non tamen tartaro, sed solidâ ciborum substantiâ. Imò si abradatur ista sordes à linguâ, non acquirit dentalis lapidis duritiem, licet arescat; sætet tamen, sed non pro dentalis lapidis odore cadaveroso. Si mox post partum lingua abradatur, vel duriori fricetur linteo, manè minus mucilaginis iterum abrad-

des,

des, sed non minus olidæ. Hæc linguz saburra non minùs ex solidis cibis, quàm ex salivâ & totius corporis recremento oritur, quod dentibus per successivam incrustationem obducitur. Hinc si dentis cavo detineatur cibus per noctem, hoc recremento imbibitus utrique foetidiorem anhelitum exspirabit, ac abrafa mucilago. Sic quoque inter gingivas, & maxillam ut ut à cœnâ os ablueris singulo mane alba quædam mucilago coacervatur, quæ deindè linteo absterfa, & exsiccata, proprio olet fœtore. Hæc mucilago dentibus in primo ortu alba adhæret, quæ pederentim flavescit, & deindè in duriciem accrescit in dētibus, à quorum gingivis lutea incipit, & in dente non rarò nigris manifesta maculis, imò nigrum, & cariosum efficiet dentem.

Verùm aliqui contra nostram sententiam ità instare possent: Iste tartarus omnium dentibus æqualiter, absque ullâ exceptione adnasci deberet, eo quod in omnibus omnia supra enarrata æqualiter concurrant; nihilominus plures ab isto lapide immunes habent dentes, & præ omnibus Æthiopes.

Respondemus, quodd Æthiopes, quorum gingivæ in acutam desinunt cuspidem non facillè lapidem efficiunt; contrà verò quibus gingivæ tument cruentæ, in obtusum desinunt, & malè dentibus affociantur, ijs frequens coacervatur ejusmodi lapis.

Prognosis.

Sicut albi dentes non tantùm venustati, verùm etiam propriæ conferunt valetudini, ita nigri, & sordidi olidam eructant animam, & sæpè in corruptionem, cariem, casum, & in gravia de-

generant vitia, quia perpetuò inter mādendum detritu fætudum quid, & abominabile emittit, quod cum cibo & salivâ in stomachum descendit, & nihil boni ibi moliri potest. Præterea in febricitantibus vehementem significat febrem in dentibus lentor, ut habetur aph. 55. sect. 4. quibus per febres circa dentes lentor quidam obnascitur, ijs vehementiores sunt febres.

Curatio.

Nostri vulgares hujus affectûs curationem aggrediuntur à causâ antecedenti, quaderè si pravi humores in ventriculo redundantes huic malo ansam dederint, eos purgantibus auferunt si intemperies, eam corrigendam existimant, & interim optimam victûs rationem præscribunt. Sed sicut in causâ inveniendâ cœcutiunt, ità quoque in applicandis remedijs allucinantur. Est malum topicum, & non à toto, vel ab intemperie impertitum.

Quò ad topica, pro dentium vitioso colore emendando, & sorditiæ tollendâ usitatissima habent dentificicia, quæ in diversas concinnant formulas ex sequentibus, ut ossibus sepiæ, rasurâ ebarris, à labastro, pumice ignito, c. c. usfo. corall. margarit. præp. ocul. caner. Lapide spongia, testis ovorum, cochl. nitis, filicibus combustis, arenâ albâ, sale tosto, tartaro calcinato, alumine usfo, & his similibus, ex quibus pollinem efformant, & ne pulveris dentificij ingredientia cognoscantur, addunt cinnam. flor. ros. mosch. &c. etiam in pulverem redacta ad suavem conciliandum anhelitum.

Nonnulli ad dentes dealbandos, & abstergendos tanquàm arcanum, com-

mendant *carbones*; & *cineres stipitum rovis marini*, quibus alij pro certissimo experimento præferunt *nicotiana cinerem*.

Optima quidē nobis videntur hæc vulgarium dentificicia ad dentes dealbandos, sordisque tollendas, quia omnia ex albis, vel uſtis toſtis, calcinatis, & igne exaltatis conſiſtunt, ſed non reſpondent dicta promiſſis; imò magis obſunt, quàm profunt, quia malum hoc ſemper tumentes, cruentæ, malè dentibus ſociantur, eroſæ, & exulcerantur gingivæ ſuguntur, quæ in dentificijs non poſſunt non excoriari, cruentari, & magis à dentibus diſſociari, undè poſtea ob alimenti degenerationem uberior ſœtentis mucilaginis, nigredinis, tartareique tophi cenſus emanat. Innumera ſerè proponuntur à vulgaribus medicamenta ad dentes dealbandos & ſordities abigendas, ſed nullius, vel parvæ efficaciz, quia rancidæ medicinæ ſunt ſoboles, & tantùm conſoribus digna ut quiſque experiri poteſt.

Nos paucioribus erimus contenti è chymico depromptis penus, quæ in ſtanti ſœdos dentium colores auferunt, illos ab omni liberant ſordities, & carie præſervant. Talia ſunt *vitrioli oleum*, vel *ſpiritus*, *volæolum ſulphuris per campanam*, attamen aquâ fontanâ diluuntur, in quibus bacillus, in cujus culpi-de obvolutum ſit goſſypium, immergendus eſt, & dentes, fricandi, ac deindè linteo detergendi. In magnâ dentium ſorditie purus ſpiritus, purumque oleum uſurpari poterit, ſi verò ſtuporem contraxerint, ſupra enarratis cap. de dentium ſtupore auferes. Solent quandòque adèd magno dentalis lapidis proventu obduſi dentes in quibuſdam, ut nulla eorum

diſtinctio ampliùs appareat, ſed unus tantùm oſſis ſpeciem præſeferant, tunc his minimè cedunt, idèdque prius ſcalpris, vel alijs instrumentis ſectis, aut potiùs argento paratis dentalis removendus, & abradendus eſt, deindè facilè dealbatur. Si ſœdus color, & ſordities ſuperficialis ſit præſtans erit limonum, vel citri ſuccus; omnibus tamen palmam præripit *ſalis ſpiritus aquæ communi temperatus*, quia præter dentium dealbationem, quam in momento efficit, eos à carie, & gingivas à putrefactione præſervat ob ballamicam energiam.

Nonnulli *aquam fortem communi aquæ temperatam* commendant cum penicillo denti appoſitam, ſed nullatenus eſt uſurpanda, quia eſt cortioſa cum venenatâ indole & gingivas corrodir, & causticat; maximè tamen efficaciz eſt *aqua aluminis*.

Sunt nonnulli, qui pro præſervatione ſingulis diebus unâ, vel alterâ olei vitrioli guttulâ gingivas, & dentes leviter fricari commendant: ſed perperam quia certum eſt conſervari dentes, & ſubſtitiari ſimiliter, ac tandè effringi, ut multoties obſervavimus. Itaque nos pro præſervatione dentes ſemel dealbatos, & à ſordibus mundatos non iterùm attingi imperamus, ſed nè in poſterùm ſœdum contrahant colorem, à cibis, & ſordibus mundandi ſunt, non autem cultri acumine, ne lædantur, ſed denticalpſis flexibilibus, & poſt cibum os aquâ ablatur, & dentes indice fricentur, deindè mappulâ abſtergantur. Verùm hæc cura eſt nimis moroſa, ſufficit in faciei ablutione, quolibet manè os colluere, dentes indice fricari & linteo abſtergere.

CAP. XXXIX.

De Dentium mobilitate, & Casu.

Vacillant dentes, cum suis non firmiter adhærent alveolis, sed huc, illucque moventur, & digitis ab uno in alium locum moveri, ac contorqueri possuntur faciliè eos eximere possis, quod malum non infrequenter incisorijs accidit, quia unà nituntur radice. Quandòque excidunt, sed rariùs; interdum per aliquot dies solummodò vacillant, & postmodum pristinam suam recuperant firmitatem, nec ampliùs moventur, sed firmiter suis adhærent alveolis, quemadmodum clavi in ligno,

Signa.

Signa; ex his, quæ diximus, faciliè eruuntur, nam non firmiter adhærent dentes, sed ità moventur, ut non tantum digitis eximi, verum etiam linguà è gingivis eliminari posse videantur.

Causa.

In assignandâ mobilitatis dentium causâ non discrepant vulgares à recentioribus, recensent namque gingivarum laxitatem, aut erosionem ab humoribus quantitate peccantibus inductam, ut ità dentes non satis arctè & firmiter à gingivis amplectantur.

Duplex est causa, quæ dentes reddit mobiles, una interna, altera verò externa; interna est nimia prava humiditas, sive liquor lymphaticus, & salivâlis in gin-

givas, dentium radices & nervos effusus, undè postmodum mollescunt, relaxantur, hæcescunt, corroduuntur, & excidunt. Ità videte est in cinnabaris fumo, hydrargiri inunctione, qui pthialismum semper excitant, & dentes quandoque ità supra modum relaxant, & corroduunt in quibusdam, ut omnino excidant, & in malè preparatis medicamentis, mercurialibus introassumptis, quæ quandòque salivationem inducunt, dentesque mobiles reddunt, at nunquam cum dentium detrimento, quiaeductis per pthialismum pravis humoribus, dentes refirmantur. In scorbuto contingit dentium mobilitas à gingivis laxis, tumidis, & corruptis. In lue venerea vacillant, quia gingivæ ab exaltato salis nutrimento diminuuntur absumuntur, & dentes gingivâ denudantur. In fumis mineralium venenatis frequentissimè aurifabris, argentarijs, & metallorum fuforibus dentium mobilitas accidit. Vacillant in copiosiori alimento, cum gingivæ magis expandantur, ut in pueritiâ, & juvenute contingit, in quibus dentes minores non respondent dilatatis alveolis. Vacillant quoque in alimenti defectu, in quo dentium alveoli ampliores redduntur, & præsertim si prava coarctetur humiditas, ut in senibus, & convalescentibus videre est. Primores dentes omnibus pueris ante septennium vacillant, sed non omnes simul, verum unus post alium & omnes præter maxillares istam patiuntur mobilitatem, tandemque sponte excidunt, quia sucrescente alio, è foveâ alimento privantur, & propulsantur. Hic nos non agimus de hac naturali mobilitate, sed de morbosa à causis supra enarratis proveniente. Externa denique causa

est violenta dentium contusio, vel al-
lissio.

Prognosis.

Dentes vacillantes, per aliquod tem-
pus refirmantur, at si diu vacillent, so-
leant tandem penitus excidere, idèdque
non parafaciendi, demerant namque
magnam gingivarum putrefactionem,
cui si opportuno tempore non consulat-
ur, eorum casus expectandus est, nec
alii in elapsorum locum succrescunt,
præterquam in pueritiâ. Hinc nò modò
pulchritudinem imminuit, sed loquelæ
& masticationi obest.

Curatio.

In dentium mobilitate curant vul-
gares, ut dentes in suis alueolis firmen-
tur, ac proindè humores peccantes
evacuant vel cathartici, vel salivantib-
us, & postmodum gingivas nimis laxas
corroborant, & adstringunt gargarif-
mate ex decocto *fol. mespilor. plantag.
myrsb. sorb. salvia, prunella* facto in vi-
no rubro. Vel eas adstringunt decocto
*cupular. gland. flor. balanstor. ros. fol.
quercus* in vino rubro stillico facto, ad-
ditâ aluminis portione. Vel linimento
ex *sang. drac. acaciâ, corall. prunis syl-
vestribus immaturis, radice tormensill.* &
alumine usto, melle rosaceo exceptis.
His & alijs ejusdem conditionis medi-
camentis gingivas adstringere, den-
tes arctius firmari & retineri cre-
dunt.

Dentium mobilitatis curatio pro
causarum diversitate diversa instituitur;
quapropter si à scorbutum ortum du-
xerit, curatio ad scorbutum dirigenda
est: vitiosi humores expurgandi sunt

admixtis semper herbis anti-scorbuticis,
quales sunt *Nasturtij aquatici, cochlea-
ria, bocabunga folia, armoracia radices*
Etc. & adhibentur, quæ de gingiva-
rum exulceratione, & erosione suo ca-
pite proposuimus, sed præ cæteris se-
quens prodest, ut

℞. *Tinctura gum. lacca* ʒ. ʒ.

flor. aquileg. ʒ. j.

spiritus cochlearia ʒ. ij. m.

hoc os, gingivas & dentes colluto.

Si in luc Veneræ à sumis, inunctio-
nibus, & alijs medicamentis mercuria-
libus vacillent dentes, tunc os col-
luendum est *aqua Anti-Veneræ n. d.
vel decocto ligni sancti, salsa parilla pa-
rato cum vino, mastiche,* & quidem alio
fortiter adstringente à nobis infra pro-
ponendo.

Si ab alimenti defectu, ut in senibus,
nullum adhebeti potest remedium, in-
convalescentibus verò facilis est repa-
ratio.

Si dentium mobilitas à nimia humi-
ditate oriatur, curatio perficienda est
exsiccantibus, & adstringentibus; at-
tamen vitanda sunt, quæ dentes deni-
grant, ut sunt *granatorum cortices, ba-
laustia, galle, ustriolum* Etc. Ad humidi-
tatem verò educendam maximopere
valent salivantia ex *mastiche, radice
pyrethri, angelica, Zinziberis, fumo ni-
cotiana* Etc. Vel quæ lymphâ superflui
tatem exturbant, vel medicamenta
diaphoretica satis cognita, postmo-
dum salinæ particulæ gingivis, & den-
tibus hostiles corrigantur, vel diluan-
tur. Adstringant, exsiccantque sequen-
tia decocta pluries experta, si sæpius
quotidie eluantur dentes, quia rursum
figuntur.

℞. *Glandium* ʒ. j.

gallarum ʒ. ss.

alim.

alum. usi.

succ. acacia ana 3. B.

sol. ros. rubr. m. B.

Coque in vini rubei lib. ij. clauso opt. vase & cola.

Sequens nostra aqua est expertissimo ad dentes mobiles, & carne nudatos, ut immobiles reddat in suis alueolis, & carne vestiatur & nunquam egros tali affectu laborantes felici defraudavit eventum, & potest fieri tam per decoctionem, sed in minori dosi, quam per destillationem, ut

℞. Fol. salvia,

oris marini,

forb.

olee,

myrtill.

pilosell.

flor. ros. rubr. incompletar. ℞

balaust. ana m. j.

radic. biflora. 3. B.

lymphys. mai. 3. j.

nuc. cupress. num. xvj.

santal. rubr. &

coriic. citri ana 3. B.

macis, &

myrrhe ana 3. j. B.

sang. drac.

gummi Arabie,

maslich. &

tragacanth. ana 3. ij. B.

sarcocoll. 3. j.

alum. usi 3. ij. B.

pyrethri 3. ij.

contundenda contundantur, & incidenda incidantur, quibus superfunde vini nigri lib. x. stent in calore digestionis, & per cucurbitam vitream, cui recipiens adaptetur, destillentur s. a.

Vel sequens decoctum miræ efficacie à nobis expertum pro dentium collutione

adhiberi potest, quos firmissimos reddit;

℞. Aristoloch. rotunde,

trissaginis,

stellaria ana m. B.

lentisci.

hypocistidis ana 3. ij.

cupular. gland. 3. B.

acacia, &

sang. drac. ana 3. j. B.

radic. angelica 3. ij.

nuc. cupress. num. iv.

maslich. 3. j.

alum. usi 3. ij.

Infundantur in vini nigri austeri lib. v. stent in loco calido per biduum, deinde bulliant leni igne, clauso vase, quo refrigerato, cola. & utere vel destilla s. a. & utere. Johannes Baptista de la Porta sequentem aquam pro dentium mobilitate excolliit:

℞. Herbar. salvia,

urtica,

oris marini,

cormontilla,

nuc. jugland. bene lotar.

& contusar. ana m. liij.

flor. salvia,

oris marini,

ros. rubr.

sol. prunell.

plantag.

summit. rubi,

marrubij ana m. ij.

sem. myrtill. lib. j.

hypocistidis 3. iij.

coriand. prap.

coriic. citri ana 3. ij.

cinnam. 3. iij.

nuc. cupress. num. x.

bol. armen. &

maslich. ana 3. ij.

Incisa, & confusa infundantur in suff. quantitate vini nigri austeri per triduum

℞ 2 decus

deindè fortiter exprimantur. Expressum indatur cucurbita vitrea, destilletur lento igne. In destillato ebulliant, clauso vase, a'um. ʒij. cola, & ad usum serva.

Qui mobiles habent dentes, non multum gartiant, nec digitos, vel linguam ad dentes impellant, nec frigidum admittant aërem, nec res masticent duras, sed pulciculam, vippam, iuscula, ova sorbilia, vel alios hujusmodi sumant cibos, in quibus non forti opus est masticatione.

Si ità vacillent, ut firmari nequeant, ne fiant edentuli, ad firmam ementendam structuram per aureum filum fiat allegatio; attamen cautè instituenda est, ne inflammatio sequatur.

Dentium casus restituitur ex semine in alveolo latente, alveoli implentur; & ità defectus reparatur; quamdiù semina intra gingivas latent, novi post priorum casum facillè renascuntur; & hac de causà in occidua ætate renasci lent, sed hoc rarissimè contingit. Ad dentium itaque casum reparandum edentuli insititios dentes ex ebote, vel dente hippopotami fabricatos in illorū locū substituant non tantum in venustatis gratiam, sed & in articulata locutionis, quia edentuli quasdam literas pronunciare nequeunt v.g. T. & R. ubi lingua ampliata prioribus dentibus in-
piti debet.

C A P. XL.

De Difficili Infantium dentitione.

Dentium germina in utero generantur post maxillarum generationem, in quibus imperfectè latent,

(rarum est enim infantem nasci dentatum) ne fugens papillam lædat; undè in abortu, vel in infantulo recens nato dentes exigui erui possunt. Erumpunt extra gingivas circa mensem septimum, vel scitius, & quidè primo incisori, quos aliquo temporis curriculo sequuntur canini, & tandè maxillares. Eorum eruptio est naturæ opus, quæ illos propellit, & eo tempore, quo erumpunt in infantibus, ex illà gingivarum continui solutione plures affectiones præternaturales tenellos affligunt, infantes; hi enim primò magnum in gingivis sentiunt pruritum, deindè quasi aculei gingivæ, dùm ab aculeatis illis perforantur ossibus, punguntur, undè vehementissimus dolor, tormina, diarrhææ exvuidi flavescentes, terrores, insomnia, vigiliæ, gingivarum inflammationes, febres excitantur, & ex divulsione, & contractione convulsionones, quas imperiti vulgares pro epilepsiâ accipiunt ob oris spumam, & indefinentem salivationem. Id maxime accidit, cum canini erumpunt dentes, qui vulgè ocularii nominantur, undè vulgato dici solet proverbio: *Parentes de liberis gaudere non posse, donec dentes ab omnibus edissent.*

Circa septimum annum alia fit dentitio, quia alveoli crescunt, & ampliantur, ac lactis dentes tùm temporis molliores vacillant, & excidunt, ac alii grandiores, firmiores, & duriores prodeunt in utraq; maxillâ decem, quatuor incisori, duo canini, & quatuor molares, sed cum tùm gingivæ antè perforatæ sint, id sine dolore accidit.

Signa.

Infantuli non dùm sermone dolorem indicare possunt, quia dentibus carent, qui ad vocis modulationem necessarii sunt: attamen cognoscitur dentitio, Primò, ex tempore, quo dentes erumpere solent, quod est circa septimi mensis initium, vel serius. Secundo infantuli assidue digitos in os inferunt, undè magna salivæ supellex fluit. Tertio, matres, vel nutrices papillas fortius stringi, morderi, & calefieri, quàm antea percipiunt. Quarto, ubi dentes erumpunt, gingiva tumet, & albicat. Quinto tandem, plures affectiones præternaturales accidunt, dolor, vigilie, tormina, alvi profluvium, & convulsiones.

Causa.

Difficilis dentitio à gingivarum densitate, & elasticitate provenit, at in dentitione symptomata ab alijs causis orta habent, undè.

Pruritus oritur, quia primà invasione fibrillæ nervæ à dentibus gingivas perforantibus vellicantur. Dolor pendet à continui gingivarum solutione, qua membranae nervæ non tantum distenduntur, sed lacerantur, & continui solutio fit, & quò spina est acutior, eò acutiorem causat dolorem; sic quò dentes sunt acutiores, eò dolores immaniores oboriuntur: quapropter canini dentes, ut acutiores, omnium symptomatum præ reliquis atrociorum sunt auctores. Affligenti dolori atrociorum additur dolorum salina humorum spicula, dùm circa radices tenerioribus, & sensibilibus fibrillis

præditas infiguntur, & ob inæqualitatem ipsis molestum inferunt sensum. Inflammatio oritur à gingivarum perruptione, haud raro enim sanguifera conceptacula ibidem satis copiosa simul dilacerantur, sanguis effluit extra sua vasa, exitum non inveniens, in earum spaciolis remoram contrahit, vitium capit, grunescit, & tuberat. Vel quia membranulæ & fibrillæ distenduntur, undè spasmus in nervis productus, nervi contracti arterias socias comprimunt, convellunt, crispant, & sanguinis motus feriat, & inflammationem excitat, particulis deinde roscidis & balsamicis evolutibus, suppuratur, undè abscessus, & alia oriuntur mala. Salivatio pendet à dolore spirituum motione, acrimoniâ & fluxilitate lymphæ, quia ex dolore glandularum vasa, & præcipuè salivalium, & membranae illas cingentes vellicari, & crispati solent, & simul uberior salivæ proventus in os effunditur, spirituum commotio faciliè efficere potest, ut uberior feri copia ad glandulas emandetur; lymphæ denique acrimonia, & fluxilitas uberiorem salivæ supellectilem movent, ut videre est in scorbuticis, & hypochondriacis, quorum latex salinis abundat particulis, hi molestissimo creberrime vexantur prurissimo. Saliva fauces aluit, & ad ventriculum tendit, non enim infantes sputandi usum habere possunt: si hæc blandior, & in statu naturali sit, sine noxâ defluit, at si uberius spicula salina habeat, tunc faucium irritationes, rosiones, & sicca tussis excitatur. Si ad ventriculum deferatur, tunc illum spasmodicè afficit, vomitus frequentes, tum lactis corrupti, tum aliorum humorum, quos in sinu fouet, & alia multa mala

conciat. Si ad intestina saliva salinis spiculis imbuta derivetur, & ibi humorum stagnantium saburram inveniet, & hos fundit, & intestinorum fibras lacerat, irritat, & vellicat, ac diarrhoea succedit.

Prognosis.

Dentitio infantibus morbus est congener, ac proinde per se minus periculosa est. Non tamen omni vacat periculo ob symptomata, quæ ingruunt, quapropter non pauci, febre, & convulsionibus superveniente, quia tenella invadunt corpora, hos calamitatum scopulos effugere non possunt, unde acerbo succumbunt fuveri: & eo major imminet perniciēs, si difficilius & longiori tempore dentes erumpunt, & præsertim si sint canini, pejus se habent, & gravius laborant, quia acutiores & magnum infantulis negotium faciunt, ac proinde parentes de vitâ longâ sperare non possunt, & præcipue si symptomata de die in diem augeantur, imò nova, prioribus ablatis, accedant, naturæ robur imminuitur, debilitatur, & sic tandem infantum tenella corpuscula huic oneri ferendo imparia redduntur, & morbus hic in mortem terminari solet. Qui crebro aluum habent laxam in dentium eruptione, minus convulsionibus capiuntur, quàm qui adstrictam ut aph. 25. sect. 3. testatur Hip. in progressu verò cum jam dentura incipiunt, gingivarum prurigines, febres, convulsionibus, alui profluvia: & maxime cum caninos edunt dentes: & ijs præsertim pueris, qui crassissimi sunt,

& alios duras habent. Qui in dentitione acutè corripuntur febre, raro convulsionibus tentantur, quia febris convulsionis materiam absorbit. Qui gravi premuntur somno, facili in convulsionem labuntur. Hyeme & vere infantuli faciliè dentes emittunt, minusque molestiam sentiunt ob nativi caloris robur, si tamen cætera consentiant, & ab externis aëris injurijs muniantur; ætate, etiam absque molestiâ dentunt ob gingivarum laxitudinem, si symptomata non urgeant.

Cursus.

Cum difficilis dentitio à gingivarum densitate, & crassitudine ortum habeat, sedulò danda est opera, ut rarefiant, & laxentur gingivæ, remotis obstaculis, & symptomatibus sedatis, quantocius & facilius dentes erumpere possint. In primis verò incumbendum est, ut alvus sit libera, quod si obstructa per mannam, vel syr. de Cichor: Nicolai cum rhabarb. relaxetur. Interim rarefiant, laxentur, & molliantur gingivæ pinguibus, oleosis, & mucilaginosi: obliantur ergò melle cum butyro recenti permixto, vel cerebro leporino, aut erudo, aut oleo cum rore corpore, eodem modo adhibentur avium, & pullorum cerebella. Vel gingivæ inungantur gallina, aut anatis pinguedine recenti.

Si dolor vehementior sit solani succus cum oleo ros. calefiat, & illinantur, aut foveantur gingivæ decocto malvarum, althææ, fennigraci, chamamelis, in quo dissolutum sit

butyrum recens vel gallina pinguedo. Vel imponatur *emplastrum ex tberiacâ recens.* Vel fiat emulsiô ex *semine lactuca, papaveris albi & lini cum aquâ violatam,* & illiniantur. Vel foveantur *mentilagine seminum cydoniorum,* albaa, *malnarum cum aquâ lactuea.* Si inflammatio adsit, addatur *aqua spermatis ranarum.* Hæc omnia suprà dicta calida applicentur, ne gingivas adstringant. Interim infantulo masticandâ præbeatur *candela ex cera virginea,* quia gingivas laxat, & pruritum de mulcet.

Ad hunc etiam finem nostræ mulierculæ varia appendent duriora, quorum agmen ducit *dens lupi, crystallus, jaspis carali argenteo inclisus chalybs sepius,* & *ultra candefactus,* & in lacte caprino, vel *muliebris extinctus,* aliæque ex ebore amuleta, sive ex aliâ materiâ lævitate simul conspicuâ parata, quæ de collo pendent, infantes arripiunt, in os intrudunt, gingivis interponunt & commandunt. Verùm his, & similibus magis duriotem reddunt gingivam, & dentium alveolos potius ocludunt, quàm apetiunt. Maximè pericpta, & amuleta improbamus ut sunt *dens hominis, dens equi primùm natus, pellis lupi, dens vipera mascula, lana agnina, jaspis viridis,* & tanquàm fabulosa rejicimus, non viribus, sed persuasionebus, & imaginatione hæc juvare credimus.

Nonnulli *axungiam* inungunt *leporinam* in gingivarum locis, ubi dentes erumpere debent, ita levius mollificatas jam gingivas, dentium cuspidés sub eis latentes petterebant, & erumpunt.

Si omnibus his modis nec prodire videantur, & necessitas urget.

Hi sanguinem è crista gallinacei re-

centem, & digito semel tantum, vel ad summum bis gingivas inunge & sine difficultate, alijsque accidentibus tandèm prodeunt.

Quid si non tantùm difficilis, verùm desperata sit dentitio, in hoc casu ad ferrum confugimus, & gingivæ, eâ parte, ubi protuberant, scalpello incidendæ, vel pollice sunt fortiter premendæ, ut feliciter dentes prorumpere possint.

Symptomata, quæ pertinacius difficultem dentitionem comitantur, ut febris, convulsiones, vigilæ, vomitus, diarrhoea, priapismus, tussis sicca faucium exulcerationes, aphthæ &c. curantur, ut in suis capitibus.

Dùm infantulo dentiunt, nutrix, vel mater bonam diætam observare debet, victusque sit temperatus, si febris adsit, vel imminet declinet ad frigidum & humidum, quia vel immittitur, vel præcavetur. Videntur interim acida, & falsa.

C A P. XLI.

De Tonsillarum, & Vulva Placibus.

INtra oris specum continentur tonsillæ, vulva; sunt tonsillæ duæ Glandulæ utrimque ad linguæ radicem paulò supra laryngem positæ, vulgò dicuntur amygdalæ (estd nullam cum amygdalis habeant similitudinem) communi oris tunica vestitæ & arterijs, venisque exilibus à carotidibus, & inguilibus donatæ. Laxam, & spongiosam habent substantiam, ac sinus continent varios, colligunt salivofum liquorem ad linguæ, & oris humectationem, quem in oris capacitatem eructant, cum

per minima lymphatica, seu salivalia vascula tùm per exilia crassioris membranae oris, foramina, præcipuè cum os, & lingua moveretur, quod quilibet in scripto experiri potest. Ac proindè quandò alimenta in ore masticantur, partim sponie, partim per masticata alimenta, ex hisce glandulis expressus liquor multò copiosior in os confluit, ut tùm ad fermentaceam præparationem admisceatur, ut aliquorum est sententia, tùm deglutionem faciliorem efficiat. In quiete verò, cum os non movetur, etiam hujus liquoris in os effusio plerùmque quiescit, ut notum est in dormientibus, quibus ob hujus liquoris defectum, os, & fauces exsiccantur, si paulo ore dormiant.

Vuula est caruncula rubicunda, fungosa, longiuscula, superius aliquantulum lata, inferius obtusè acuta à palati medio, juxta narium meatus in os inter tonsillos vuæ instar procedens.

Hæ tonsillæ & vuula, licet partes exiguæ in nostro corpore, non solum intumescunt, inflammantur, & in supurationem abeunt, ut *primo Tomo cap. 40. & 41.* fusius diximus, sed quandoque citra inflammationem exulcerantur, & exeduntur, quod familiarissimum est in lue venereâ,

Signa.

Tonsillarum ulcera visui patent, & eadem habent signa, ut in aliarum partium ulceribus. Si maligna sunt, partim alba, & maculis similia, partim colore cineritio, aut crustis similia, quæ ferro inurantur.

Vuulæ exulceratio ante oculos posita est, nam laxa, & flaccida apparet, albo mucore obducta, quandoque cine-

ritio cum ardore, & sorditie, graveòlentem spirante anhelitum. Si tandem atrophica corripitur, sic velut lorum, & penitus infans bilis est.

Causæ.

Tonsillarum, & vuulæ ulcera secundum vetères Galenicos sunt ab humoribus biliosis, pituitosis, feruidis, putridis & erodentibus à capite in tonsillas & vuulum depluentibus; vel à vaporibus isdera prædictis qualitatibus, & cum aëre per inspirationem absorptis tum cibis aut medicamentis erodentibus, exulcerantibus, aut vehementer exasperantibus, à quibus omnibus ejulmodi in partibus hisce continui solutiones contingere valeant. Verum vulgates in horum affectionum causam assignando fallaciam committunt non causæ ut causam.

Ulcera tonsillarum, & vuulæ oriuntur à particulis salinis in lymphâ, aut sanguine hospitantibus, & in tonsillas & vuulam irruentibus, ex obstructione diuturniore exaltatis, earumque fibras dissolventibus. Sive fiunt ex abscessu, & pure post inflammationem subsequente. Vel fiunt à fermento venereo, ut fusius de dictâ lue diximus. Hæ particulæ salinæ, & corrosivæ ad tantam sæpè exaltationis gradum deveniunt, ut non solum tonsillas, & vuulam, tanquam partes molles, in totum auferunt, sed etiam duras, & osses erodant, ut multoties in palati ulceribus observavimus.

Prognosis.

Tonsillarum ulcera securiora censentur, quæ sunt munda, exigua, quæ non

non profundantur, nec inflammantur, nec dolorem, & febrem habent adjectam, maligna verò, quæ lara, profunda, & quodam concreto humore albo, aut nigro sordida sunt. Exigua quandoque & rara oriuntur ulcuscula, quibus supervenientia alia in unum ulcus latum coalescunt. Si ulcera depascendo serpent, gurgulionem, linguam, palatum, & gingivas exedunt, ac dentium prætepiola occupant, dentes labefectantur, nigrescunt, vacillant, & tandem decidunt, unde ægri inedia, & fœtore consumpti moriuntur. Quod si ulcera in pulmonem per tracheam serpent, quia pulmo, & cor neque odoris fœditatem, neque ulcera, neque ichorem sustinent, obortâ tussi, spirandique difficultate, eodem die strangulantur.

Vuulæ ulcera aspernanda non sunt, facili enim negotio exeditur, & deficit, undè quibus tota vuula adesa est, potus ex ore in nates segurgitat; in superatò clarè & articulatè loquuntur, & quod pejus, periculum à phihisi imminet, cum particula jam deficiat, quæ aeris frigidioris inspirari imperum frangere solita est, ne in pulmones subito irruat, eosque lædat.

Curatio.

Tonsillatum ulcera curant vulgares, venam incidendo, corpus deplendo, & diversiones celebrando. Deindè medicamentis uruntur adstringentibus & exsiccantibus, quæ externis etiam applicant ulceribus, & eò magis exsiccantia in tonsillarum ulceribus esse debent, quia talia ulcera à salivâ perpetuò humidiora fiunt, undè medicamentorum vis infringitur. Ad hanc indicationem gargarismos adhibent triviales, ut.

D. Caroli Musciani Tom. II.

℞. Aqu. mulsæ lib. j.

diamori ℥. j. β. m.

Vel *℞. Aqu. plantag. lib. j. β.*

℥r. de moris ℥. ij

mell. ros. ℥. j.

alum. scissil. ℔. j

aceti ros. par. m.

Sed nescimus, an hæc magis exsiccare, quàm humectare valeant. Alij pro illinitione succum ex malo punice dulcem cum cortice confuso exprimunt, cuius partes sex cum unâ mellis parte miscens. Et ad mellis spissitudinem coquunt. Ulceribus malignis adhibent linimentum ex cineribus centaurij minoris, & pulvere stercoreis canini cum melle ad spissitudinem miscendo.

Columellæ ulcera hac collutione curant.

℞. flor. ros. rubr.

fol. quercus, &

olivær. ana p. j.

cortic. granator. ℥. liij.

alum. usti ℥. β.

erug. aris ℔. j.

coque in aqua plantag. lib. j. β.

Et in colat. diss. mell. ros. simpl. ℥. ij.

℥r. de moris ℥. j. m.

Si ulcera sint ex lue venetæ, & mitia hoc uruntur linimento, quo ulcera tant gunt, ut.

℞. Vng. Aegyptiaci ℥. β.

alum. usti ℥. β.

mell. ros. unc. j. β. m.

Sed parùm feliciter in hoc linimento utuntur unguento Aegyptiaco, prope vitidez, quod ejus compositionem ingreditur; potiùs enim corrodendo, quam separando suas absolvit operationes. In super Aegyptiacum partem affectam nigredine imbuat, quod omninò vitandum est. Si verò contumacia fuerint aquâ fortidilutâ, vel aquâ,

in qua mercurius sublimatus decoctus fuerit, utuntur. Verum aqua fortis, licet diluta, venenatam non respuit qualiter, ideòque si per se metalla exedit, diluta, & in gradu remissa carnes absumere, & corrodere valebit, & eò magis vuulam, quæ molli, & spongiosa dotata est substantiâ. Sablimatus verò in aquâ decoctus non desinit dilute continere vim corrosivam, venenatam & causticam, ideòque non tantum vuulam, & proximas partes eò magis venenatè exulcerabit, verum etiam si fortè in asperam arteriam, vel œsophagum gutta aliqua delaberetur, in magnâ noxâ, & vitæ discrimine versatur ægrotus. Insuper sanguinem inflamat, undè sputationes cruentæ, aliæque symptomata gravissima, & ipsa tandè patientis destructio.

Tonsillarum ulcera nos curamus medicamentis, quæ salia acuta in lymphâ stagnantia diluunt, eliminantque, humilmodi sunt sudorifica, vel diuretica pluries decantata, quæ obstructions in parte referant, & tandem topicis, quæ abstergunt, resolvunt, & consolidant, in quem finem sequentia gargarismata conducunt, ut.

℞. Malu. hortensis m. j.
flor. ros. rubr.
prunelle.
veronica,
salvia ana m. ss.
radic. polyp. querc. ʒ. ij.

Coque in aqua pura lib. iv. aceti vini ʒ. vj. usque ad transversum pollicis casum, postea colentur, & colatura leniter exprimatur. Mundificat, & consolidat ulcera interna, si præsertim cum reliquis plantaginibus folia adijciantur.

Si sordida sint ulcera, ea mundificat, & consolidat infusio lapidis medicamen-

tosæ, vel sequens gargarismus ex *bordal emulsione cum melle rosaceo*, & paucis *spiritus vitrioli*, ne acrimoniâ suâ partes hæscat, aliasque circumiacentes plus lædat, sed acrimoniam in ulceribus existentem mitiget, ulceraque emundet, delinet, & exsiccet. Verùm præ cæteris ad fortiores mundificationes maximè valet *Aqua viridis Hartmanni* calefacta qua penicillo bis in die tangantur, & hæc aqua in his ulceribus familiariter utimur.

Si hæc ulcera à loca venereâ ortum ducant, cognoscuntur venerea, si in longum protrahantur tempus, & vulgaribus adhibitis medicamentis, non cedant, tunc locum affectum *aqua viridis* tangat & postmodum gargarismo eluso, & cedunt, quod si non eveniat, ad partem *sissinæ* gummi ex *cinnabari*. & *sture* cum tabaci fistulâ, tanquam ad sacram anchoram confuge, nec ægrotum ulcerum sanatione defraudabis, ut experientia millies nos edocuit; imò tantum suffragio multos tanquam insanabiles, & deploratos Barbari post varios cruciatus deseruere, pristinæ restitimus sanitati.

Vulnè ulcera si sint simplicia, facile curantur gargarismare ex decocto peti, & persicaria, vel sequenti, ut

℞. Summis Veronica,
vinca peruvina, &
sture ana m. j.
f. decoct. in cuius colaturâ lib. j. ss.
mell. ros. simpl. ʒ. ij. &
diamori ʒ. j. m.

Si sint contumacia, utere *infusione lapidis salutaris*, tangendo cum penicillo: verùm maximopere prodest *unctura mellis confecta ex aqua plantaginis, mellis rosæ simplicis, & spiritus vitrioli ad*
græ

gratam aciditatem.

Si ulcera sunt tæta, & putrida, illis conveniunt ea, quæ contumacibus adhibentur medicamenta; quod si parum juverint *ad aquam viridem.* & *ad aquam nostram metallorum* confugimus quæ omnem putredinem, exulcerationemque tollit fætidam, & consolidationem inducit perfectam.

Ulcera tandem ex lue venerea tam columellæ, quam ejuscumque oris patris tollit universalis luis curatio, & tali ratione ulcera incipientia & antiquata in hisce locis unâ cum lue sponte curantur; quod si non evenit, primò ad mellis tincturam, deindè ad metallorum aquam, & postmodò ad aquam viridem vel suffumigiij topici usum deveniendum est, & sic faciliè eliminantur. Prædicta remedia hi, adhibita ulceribus, non præmissa universalis luis curatione, nunquam medicum, & ægrotum fallent: verùm aliquo temporis spatio vel recidivam patiuntur, vel graviora luis Venereæ symptomata excitantur. Undè post perfectam horum ulcerum sanationem præmissa leni cathartico, propinari potest aqua antivenerica n. d. quæ universum luis venereæ morbum, ejusque omnia symptomata à toto corpore radiciter eliminat.

C A P. XLII.

De Balbutie, & his, qui difficulter loquuntur.

Lingux motus tripliciter læditur, labilitè, diminutè, & depravatè. Avoletur, atque ita loquela simul aufertur, & dicitur aponia, sive confor-

mationis vitio à primo ortu contracta culpâ, aut post, quandò spiritus animalis denegatur influxus ad linguam, vel ob cerebri obstructionem, ut in apoplexiâ, caro, castroce; sive ob spirituum animalium consumptionem, aut ad interiora tractionem, ut sic morti proximis, in syncope, & veri suffocatione; sive ob nervorum angustiam, quæ vel est perfecta, & sequitur paralytis, vel est levior, & ex intervallo modò loquitur paralytici, vel est levior, & ex intervallo modò loquitur homo, modò obmutescit. Imminuitur linguæ motus, ut tarda & difficilis evadat loquela, vel citra linguæ vitium, dùm spiritus animalis, aliò avocantur, ut in ita, terrore, nimio gaudio. Vitium autem hoc vel est nativum, dùm tales homines non possunt initium capere, nisi prius multoties linguam moverint, & labia, aut postquam loqui inceperunt, non possunt in sermone progredi, sed sæpius eandem reperiunt syllabam. Vel adventitium à linguæ vulnere, aut apostemate, ulcere, paralyti &c. Hoc vitium dicitur hæsitantia, sive titubantia, & *Battarismus*. Depravatur linguæ motus & dicitur Balbuties, de qua hic nos agimus.

Est balbuties linguæ vitium, quo laborantes d'fficulter loquuntur, in sermone restitantes, loquelam præcipitant & literam R. maximâ cum difficultate pronunciant, ut etiam id ex *Ciceronis* verbis pateat dicentis: *Ita balbus erat, ut literam R. non posset pronunciare.* Et alio: *Cùm ita balbus esset, ut ejus ipsius artis, cui stunderet, primam literam non posset dicere.* Quæ verba contra illos faciunt qui literam S. effari non possunt, qui tamen balbi non sunt, sed *blebi*.

Hoc linguz vitium in singulis literis esse potest, nam si J. crasse quis pronuntiârit, dicitur *Yotacismus*, si L. *Landacismus*, si M. plus æquo *Metacismus* faciet. Quaderè cum dentes ad formandam vocem conferant, iufantes non loquuntur, antequàm os dentibus plenum habeant, & præcipuè incisori ad quasdam exprimendâs literas conferunt. Huic edentuli quasdam literas pronuntiare nequeunt reg. T. & R. ubi lingua prioribus ampliâs dentibus inniti debet. Hinc vitio facillè succussi potest, si arte instructi procurent dentes augeo filo vinciendos, ut expedire has literas pronuntiare valeant. Sed de vitiis oris, & linguz, quæ loquelam vitare possunt, fusius egimus in *nostrâ Grammaticâ speculativâ, capite de Barbarismo*.

Signa.

In hoc morbo cognoscendo non opus est signa recensere, sed sat est balbutie affectum loqui ut cognoscatur affectus.

Causa.

Balbutiem fieri credunt Galenistæ à linguâ breviori, vel ab ejus imbecillitate ob intemperiem humidam, aut etiam siccam, frigus, iram, aut calorem, vel à freno, aut membranulâ subiacente linguam nimis adstringente, & ejus liberum motum impediente.

Balbuties pender à nimâ spirituum agitatione, qui inordinatè musculorum tubulos ingrediuntur, vel ab eorundem paucâ quantitate, ut non sufficiant ad linguz motum perficiendum, vel ab inconcinâ musculorum, & linguz con-

formatione, vel ex horum musculorum obstructione, qui viscido infarciuntur humore, à quo diminutus fit motus, quia linguz muscoli ita gravantur & opprimuntur, ut distendi non facillè possint. Hinc spiritus motoris transitus ad linguz musculos impeditur, & linguz motus non expeditè fit, undè difficilis pronuntiatio, & non expedita oritur loquela. Vel à nimâ copiosâ humiditatis præsentia, à qua muscoli relaxantur & cuilibet vocis expressioni minus sufficiunt. Id clarè patet in aliquibus pueris, qui balbi sunt, literamque R. J. L. M. vel S. pronuntiare nequeunt, verùm temporis & ætatis progressu humorum illa excessiva visciditas, vel nimia humiditas absumitur, & nullum ampliùs impedimentum italium literarum pronuntiatione posterum sentiunt, in quibus verò non absumitur, per otum vitæ spacium balbi remanent. Oritur quandòque à freno sub lingua non dissecto, quod impedit, ne lingua liberè volui & moveri possit. Vel nimia in loquendo festinatio dentium defectus, labiorum mutilatio, palati exesio, lingua justo longior, aut brevior, crassior, indecenti formata & pluribus alijs modis depravatur loquela ut fusius *capite de Barbarismo* egimus.

Prognosis.

Balbuties nullum vitæ discrimen minatur, attamen ab apoplexiâ, vel caro relicta rarè & difficulter curatur, & ex confirmatâ paralyti omnes obmutescunt, dùm tota lingua resolvitur, gravi impender apoplexiæ merus. Balbi, & ceteri linguâ præditi melancholici sunt, item, morbis humidis obnoxii sunt.

sunt, ac præcipuè alui profluvio corti-
piuntur, ut innuit *Hip. aph. 32. sect. 6.*
Balbi ab alui profluvio diuturno maxi-
mè capiuntur. Nativa linguæ vitia ex
magnitudine, conformatione, vulnere,
nervorum rupturâ insanabilia existi-
mantur, verum à phlegmate, vel nimîa
humiditate, solet quandoque temporis
progressu in pueris, ablutum phlegma-
te, vel humiditate, auferri; si verò diu-
turnâ consuetudine inveterata fuerit
balbuties, prorsus curationem non re-
cipit. Si tandem à linguæ vinculo non
secto pendeat, faciliè chirurgiâ cura-
tur.

Hoc morbi genus sermonis puritati
multùm obstat, ac ne ingenia à bonis
retrahantur cœptis, admonitos & ex-
hortatos volumus adolescentes hoc vi-
tium oratoris splendori nunquàm, vel
quicquàm detraxisse, nec gloriæ impe-
dimentum fuisse. Hoc vitij genere *Ari-*
stotelem laborasse accepimus, nec quia
balbus fuit, sui nominis fama claudica-
vit, alioque relinquimus illustres scrip-
tores memoriz posterum traditos.
Equidèm nullum est vitium, quam hoc
magis excusabile, in quo nihil ipsi pec-
cavimus, sed potiùs naturam, uti nover-
cam, accusare debemus.

Curatio.

Ex malâ conformatione balbutiem,
aliaque loquendi difficultates insani-
biles esse diximus, attamen hoc unicum,
sed ideale exempli *Demosthenis*, indu-
stemque modelam proponemus, qui
ad vitia oratorem deturpantia præfe-
renda in se unum omnia natus videba-
tur, nîmque primam literam ejus artis,
cui totus obiturne animus addiderat,
cùm dicere non posset, ore insertis cal-

culus, expeditè proferte didicit: hume-
rum, quem sæpiùs inter dicendum at-
tollebat, gladio supernè appenso, ut
ejus metu injecto, ne pungeretur, demi-
sit. Actionem omnem ante speculum,
tanquàm magistrum, composuit, &
etiam hitionem. Pectoris, & luerum
angustias, sicut & vocis exilitatem, &
acerbitatem dilatavit, & ad sonoritatem
perduxit. Per aspera, & adversa loca
uno spiritu plures versus recitare as-
suescens, sic tonare, non otare, locum-
que proverbio fecit: *Latera Demosthe-
nis.* Patientia duravit aures prope fla-
mina obluctantium aquarum fragoti-
bus obstrepentia declamans, ut in ac-
tionibus turbarum fremitu non inter-
rumperetur. Hæc omnia, aliaque apud
Plutarchum, *Lucianum*, aliisque in ejus
vitâ multo temporis spatio peregit, &
ne aliqua occasio ad egrediendum im-
pelleret, capite semibraso, & barbâ se-
domi detinuit, eò tandem evectus est,
ut ipsemet *Cicero* fateatur majorem
partem *Demosthenis* abesse cùm legi-
mus, tantum ei dedit actio, ut illud *Aes-*
chyis apud Plutarchum in apophth. de-
monstrat, quem relinquimus. Ad sum-
mam industria naturam vicit *Demo-*
sthenes. *Prelatus* (ait *Val. Max. lib.*
8. cap. 7.) *omnem rem naturâ. Et quidèm*
victor abiit, malignitatem ejus perina-
cissimò animi robore superandi. Itaque
*alterû *Demosthenem* inater; alterû indu-*
stria enixa est. Nil tamen arduum, quod
sedula industria vincere nequeat.

Balbutiem difficultis esse curationis
vulgares Galenici faciunt; linguæ enim
brevitatem naturalem, arte prolongare,
longitudinem brevire, & crassitiem
subtiliare nesciunt, attamen imbecilli-
tatem ab intemperie humida ortam
corrigere conantur exsiccantibus, à fri-

giâ calefacientibus.

Nostra curatio est, quoddam sinitium à nativitate, & organi vitio fit, setè incurabilis est. Si pendeat à nimia spirituum agitatione, remedijs nimium motum sedantibus, & eundem æqualem ijs conciliantibus curatur, talia sunt *spiritus rosarum, aqua theriacalis cum spiritu vini, elixir vite, unctura juniperi, aqua lavendule, vel liliorum convallium* &c. quibus lingua sæpius fricetur. Si spiritu pauperie lingua moveti nequeat, cutatur, ut paralytis, & tùm interna, tùm externa conducunt, quæ in nostra *Trutinâ libr. 1. cap. 3. de Paralyti* descripsimus, ut robur fibræ carneis, musculis, & nervis concilietur. Specificè hic commendamus *oleum anisi* in linguæ apicem instillatum itèm *balsamum, vel oleum caryophyllorum*. Si à nimio phlegmate, vel humiditate spirituum transitum impediende oriatur, hujus phlegmatis educatione tollitur, undè os læpissimè *spiritum ardentem ex succo caryasorum nigrorum extracto* lavetur, hic enim spiritus ardens summopere linguæ musculos phlegma infarciens, ad eò resolvit, & linguam roborat, ut spiritibus pateat aditus.

Si substrata linguæ membrana, sive frenum impediat, præcipuè in recens natis, ut sugere non possint & in adultioribus, ut loquela impediatur, aut depravetur, vel diglutitio prohibeatur, quia lingua curta, & adstricta, undè non liberè volui, atque moveri potest, tunc affectus iste Chirurgiam expolit. Nostrates imperitæ obitetriculæ unguem pollicis dextri longum, & in cultri apicem conformatum gerunt, quo statim ac infantes orti sunt, indifferenter eis frenum præscindunt, quam operationem improbant vulgares chi-

rurgi putantes unguem veneno esse infectos, & venenatam inducere excisionem: ceterùm multum distat venenatum esse, & noxium, non equidem negamus unguem aliundè infici, & quibuldam sordibus coinquinari, & tunc per accidens & non per se noxios esse concedimus, sed innoxios, ut reliquas partes existimamus. Hæc operatio nullatenus unguibus fieri debet, hi namque facillè vicinas, & innocuas dilantant partes, ac planè disrumpunt, undè dolor inflammatio, aliaque gravissima oboriuntur mala, imò infantuli lactis suctione tam necessariâ, propter accidentia, quæ subsequuntur, & vitæ privantur, cum ex melle vix unus infans nascatur tali ligamento, & postmodum balburiat, ac tali indigeat chirurgiâ. Sulent quoque obitetriculæ hanc sectionem nummi acie instituere, quam profectò repudiamus, cum eadem imposter accidentia, & pestis sine necessitate agunt, & in operando errant. Quoddam si quandoque stenulom sit malè constitutum, sectionem, aut divulsionem instituimus (aliis nunquam) non unguibus, non nummi acie, non vulgari tonsoriū phlebotomo, forficis apice, elevata linguâ, ligamentum nervum tantum incidimus, vitando semper, ne catenam attingamus. Si primâ vice totaliter non abiciundatur eadem operatio reitetetur, in cisco ligamento, blandè incisionis pars sæpissimè madescat melle rosaceo vel simplici, & sic agglutinatio impeditur, & consolidatio succedit.

Advertendum tamen volumus, ut in operatione cautè procedatur, ac chirurgo in anatome petito committatur, ne per imprudentiam, venæ, aut arteriæ vicinæ, ductus salivales sub linguâ,

guâ, patresque adfuit, aut nervuli lædantur; sic enim sanguinis fluxus, vel ptyalismus assiduus succedit, & si vicini, linguæque substrati nervi incidantur, repentina linguæ convulsio supervenit, ut *Riolanus* observavit. Hinc fraternâ charitate obstetrices expertes, & chirurgos imperitos admonemus, ne temerè ad hanc operationem se accingant.

C A P. XLIII.

De Aspera arteria, & Oesophagi ulceribus.

TRutinatis ulceribus, quæ oris specum infestant, nunc reliqua asperam arteriam & oesophagum invadentia nostro ordine examinare studemus. Est asperæ arteriæ usus in inspiratione, ut per eam, tanquàm fistulam, aër à pulmonibus recipiatur; oesophagi verò est, ut per eam, tanquàm per infundibulum, cibus & potus in ventriculum deferatur, & quidem faciliùs liquida, quàm solida deglutiuntur, quæ actio peragitur oesophagi fibris, & præcipuè musculis. *Galenus* hanc naturalibus actionibus ineptè refundit, verùm cum deglutitio ex arbitrio pendeat, (deglutimus enim quando volumus & lubet) & peragitur instrumentis motui voluntario inservientibus, nempe musculis, meritiò actionibus animalibus refundenda videtur.

Harum partium tanti est actio, & præcipuè asperæ arteriæ, sine qua nec tantillùm vitam degere possumus, nec tamen suos non patitur manes: meritiò igitur nostro examini eam committimus, ut ab his vindicetur injurijs,

Signa.

Aperæ arteriæ ulcera, si oculorum aspectui non pateant, ex causis prægressis, vel præsentibus, catarchis scilicet salis, medicamentis acerbis, vel lue Venereâ, ut ex ijs, quæ ulcera consequuntur, dolore scilicet tussis, sanguinis sputo, & quidè in principio, puro, hinc putulento, aut materiæ putulentiæ, sordidæ, & fœtentis cum tussis refectione colligi possunt, & tandè ne aspera arteria pro pulmone accipiat, dolor locum ostendit affectum.

Oesophagi signa non difficulter ex sanie circa hunc locum emanâre, & simul ex læsâ deglutionis functione cognoscuntur, & præcipuè dùm acrida, austera, falsa, & acida deglutiuntur.

Causæ.

Pro asperæ arteriæ ulcere *Galenicis* solitas fluxionum nœnias, humores scilicet acres, erodentes; & potissimùm pituitam salis à cerebro in asperam arteriam depluentes assignant, vel materiam acrem, & purulentam ex inflammationibus, vel exulcerationibus partium thoracis in hanc partem transfusam; vel purulenta, aut medicamentata acrida, & exulcerantia in hanc cavitatem delata.

Fit secundum *Galen* procuratores oesophagi ulcus vel post vulnus, & res acutæ illapas eique infixas, vel post tumorem: vel ab humoribus acerbis vomitu, rejectis, vel è cerebro in oesophagum depluentibus, vel à vaporibus acerbis in febribus ardentibus; vel à rebus externis etodontibus assumptis, ut aqua forti, mercurio sublimato arsenico,

nico, & similibus, quæ œsophagum exulcerant.

Asperæ arteriæ ulcera à succis cortosis hanc partem tum foris, tum intus diuturnè stagnantibus, ejusdem fibrillas, aut tubulos exulcerantibus oriuntur, qui vel ex lymphâ in glandulis ab acido corruptâ, vel ex materiâ purulentâ corrosivâ ab exulceratis pulmonibus in hanc partem transectâ progrediuntur, ut in phthisi obvenire solet.

Oesophagi ulcera produciunt particulas salinæ, & acidæ fibras longitudinales, & circulares rumpeutes, Lacerantes, & corrodetes, & eadè labe succû nutritivum insipientes, ut non nutriat, sed magis exedat, & penitus exulceret. Quandoque à corrosivis intro assumptis, vel vomitu rejectis hæc ulcera originem habere possunt. Verùm à causis externis, ut aqua stygiâ, mercurio meteorizato, arsenico, realgare &c. Vel ex re exasperante assumptâ, & interdum à catarrhis, & humoribus acidis, & salinis particulis imbutis vomitu rejectis excoariatio fit attamen excoariatio, & ulcus non nihil inter se differunt, est enim excoariatio summæ solum partis erosio, ulcus verò ad interiora penetrat: utrumque sæpè eadem est causa, quæ nunc minus, nunc magis lædit, & inde nunc excoariatione, nunc etiam ulcus inducit.

Prognosis.

Ulceræ asperæ arteriæ periculo non vacant, præsertim. Si internam occupent membranam, ad quæ ob partium situm, & naturam, omnis generis medicamenta, satis aptè applicari nequeunt; quæ enim in formâ liquidâ intus assumuntur, vel ad pulmones transeunt, & molestissimam excitant tussim, undè

malum exasperatûr; vel in stomachum descendunt, & suo fruantur sine. insuper hæc pars irrequieta manet, cum ob aërem hauriendum, & emittendum continuè moveatur, non facilis succedit consolidatio. Sanabilia sunt, si ulcus in principio sit, & salsam externam asperæ arteriæ occupet superficiem; si verò ulcus penetraverit, & ipsas asperæ arteriæ eroderit cartilagineas, tunc tale ulcus, vel planè insanabile est, vel omnino difficulter curatur.

Ulceræ œsophagi periculosa sunt, constat namque ex fibris tenuissimis longitudinalibus, & circularibus, quibus laxis, necessariò depluratio cessat ob partis angustiam, & hæc cessante, homo alimentis destitutus moriatur oportet. In super œsophagi, ut partis membranose, ulcera difficulter coalescunt, & medicamenta convenientia non satis diù in ulcere morantur, sed in ventriculum descendunt.

Curatio.

Asperæ arteriæ ulcera curant vulgares, si ab humoribus salsis, & acris oriantur, detergentibus, & potissimum lac celebrant, cujus solius usu nutritur æger, humorum pravorum generatio inhibetur, genitorum acrimonia temperatur, sordes detergentur, & carnis amissæ generatio promovetur: Verùm lac debito modo præparari, & eas habere debet condiciones, quas Gal. 4. meth. med. cap. 12. recenset. Si verò sordida sint, & majori indigeant detersione, tunc fortibus utuntur detergentibus, postmodum siccantibus, & tandem sarcoticis. Detergunt *mulsâ cum decocto bordei, & melle rosato*, vel sequens usurpant decoctam compositum, ut,

*℞. Hord. m. ij.
liquiritia rase ℥. β.
fol. apij, &
hedera terrestr. ana m. j.
flor. ros. rubr. p. ij
junbar.
passular. ℥
caricar. ana ℥. β.*

*Bulliant in aqua comm. lib. iij ad ca-
sum tertia parte. Ia colatura dissol-
ue.*

*mell. ros. ℥. j. β.
elect. diapenid. ℥. β.*

Assumatur aliquoties in die quædam portio in ore detinenda, & sensim deglutitur, ut in asperam arteriam descendat, vel gargarizatio instituat, ut per epiglottidem in tracheam labatur. Verum probabile non est aliquid in asperam arteriam penetrare, quod tussis perpetuâ antequam penetret, non ejiciatur, ut præsertim observamus, dùm bibimus, si casualiquo quid humoris defluit: falsum est igitur quod asseruit Hip. totum id, quod bibitur, sive maximam illius partem in asperam arteriam, & deinde in pulmones penetrare. Neque exemplum in sectione vivâ observatum quicquam probat, nam dùm excarnificatum moritur animal, doloris vi multa aguntur præter omnem illius animalis naturam. Post hæc exsiccant, & glutinant *bolus armenus*, *myrrha*, *thus*, *radix aristolochia rotunda pulverisata*, & cum melle in formam eclegmatis redacta, quod sensim deglutendam præcipiunt, ut portio quædam ad partem exulceratam perveniat.

Ad ulceris œsophagi curationem purgationem præmittunt vulgares, ne pravi generentur humores, & genti ad partem affectam deferantur, & ul-

D. Caroli Augustani Tom. II.

cus inflamment, aut acrimoniâ suâ exedant, & lævum efficiant. Si inflammationis ulcers conjuncta sit, quæ curationi obstat, cum sanguinem mittunt, deinde *hordei cremorem* propinant, qui refrigerat, detergit, & dolorem lenit, vel *decolium sebesten*, aut *mucilaginem seminum cydoniorum*, aut *emulsionem papaveris albi* cum aquâ rosarum factam cum paucis sacchari ad dulcedinem, vel *syr. de papaveris*, vel *laccaprinum chalybeatum*. Si ulcus sit sordidum, illud detergunt aquâ mulsa, vel decocto hordei cum melle rosato, vel decocto herbarum *prassij*, *calamintha*, *thyini*, & *cauda equina* cum melle rosato permisto. Ulcere deterito, ad exsiccantiam, adstringentia & sarcotica accedunt, ut sunt collutiones ex *decocto prassij* & *cauda equina*, quibus addunt pulverem ex *trichifidis de carabe*, *terra sigillatâ*, & ut melius adhæreant, addunt *syr. de rosâ sicca*, vel *myrrinum*, *conservam ros. rubr.* vel *gummi Arabicum*, *tragacanth.* *bolus armenus* &c. Hæc medicamenta deglutienda exhibeantur.

Pro ulceris asperæ arteriæ curatione secundum nostram sententiam danda est opera, ut partem necessariam, quàm periculose laboranti, quantum possibile est, & nullâ interpositâ morula, succurratur; propinentur proinde interne varia diaphoretica, quæ particulas salinas, & acidas corrosivas absorbent, temperant, & per suam emunctoria eliminant, ut sunt *a. c. sine igne paratum*, *stibium diaphoreticum*, *oculi cancerorum*, *terra sigillata*, *bolus armenus*, quæ sumantur in aquâ *bardana*. Ad ulcus mundandum optimus erit *syr. de hedera terrestris* cum balsamo *sulphuris anisato*, vel balsamo propria

is cum syr. de prasso. Optimæ sunt *potiones vulneraria* ad partis consolidationem, & *alchimilla, scabiosa, stellaria, floribus hyperici, scordij cum syr. de symphyto, additis aliquot guttis balsami Peruviani.*

In ulceris œsophagicatione conveniens vivendi ratio adhibenda est, undè exulceratus gulam magnas fugiat offas, & à solidorum ciborum deglutione caveat, & cibi sint liquidi, subdulces, & deglutiti faciles, nocent acida, aliæque coagulantia, & humores magis inspissantia, ut & nimis salina & actia. Medicamenta sint diaphoretica, quibus particulæ acuræ, salinæ, & acidæ obtundantur, immutentur, & destruantur. Maximoperè conducunt balsamica, & vulneraria, ut in asperæ arteriæ ulceris curatione diximus. Præter hæc spirituosæ conveniunt, ut *spiritus vini cum paucis spiritibus cerebinthina. vel balsamus proprietas cum syr. de symphyto, vel syr. de scordio cum balsamo Peruviano, debite depurato, ad paucas guttulas.*

Si à luc Venereâ ortum ducat gulæ ulcus, mercurialia maximè conducunt, ut diximus, si ab arsenico, mercurio sublimato &c. ut de Venenis corrosivis alibi diximus, procedatur.

CAP. XLIV.

De Labiorum Rhegadibus, & Ulceribus.

DAra sunt homini labia ad claudendum os, ut per nares solummodò, nisi aliter necessitas exigat, fiat respiratio, ac ne si illud perpetuò, ubi semel propter cibum, vel potum assumendum, vel respirationem, aperte

neccesse est, hians, ac dilatatum maneret, omnis generis corpuscula, muscas, paleas, pulverem admittat, atque etiam dentes, gingivæ, partesque interiores frigore æternitque injurijs lædantur. Insuper ad vocem, & loquelam formandam sunt necessaria, præsertim ad efferendis literas labiales dictas, quia ad earum formationem labia maximè sunt necessaria. Præterea ad cendi, & bibendi commoditatem, & assumptionem inserviunt, neque sine his potus commodè assumi potest. Item utilia sunt ad cibum in ore continendum, ijs qui molaribus dentibus delituti, incisorijs tantum masticare coguntur. Conferunt etiam labia ad salivam ex ore eijciendam, ut & in ore retinendam, ne illa continuò ex ore proflueret, & insignem pateret turpitudinem. Utilia sunt quoque ad sonos variandos tibiciniibus, item infantibus ad sugendum. Tandem per se ad ornatum multum conferunt; monstrosus enim prius esset homo, si detruncatis labijs irati canis rictum ostenderet. Si verò labia lenia, rubicunda, magnitudine moderata, os debito modo claudentia obtineat homo, non tantum insignis inde gratia, sed ornamentum ipsi conciliatur. Præterea labia rubicunda præclarum ingenij acumen, motum candorem, & optimam vitæ constitutionem denotant; contra labiorum pallor, omnium virtutum defectum. Labia decentè exilia, hominem sapientem, sed iracundum augurantur. Labia nimis crassa, & extrà inversa animi simplicitatem, ad credendum facilitatem & crassam Minervam præfagiunt. Verum si labrum superius sit megnum, crassum & duplo sæpè majus, vel elevatum, ut gingivæ

gix appareant, invidum, blateronem, & garrulum designat, & præter hæc non tantum deformitas oritur, verum etiam vox & sermo aliquantulum vitatur, acisique efflatio quadantenus impeditur. Quidam hæreditario jure labium inferius habent nimis crassum, & quasi ad mentum usque pendulum, hi helviones, ganeones, & crasse Minervæ homines sunt. Cæterum hæc vana physionomorum auguria sæpius ad veritatis scopum minus collimant, unde fit, ut vitæ præditi existant, qui omnibus vitijis dediti creduntur ex aspectu, & vitiosi, qui omnibus virtutibus præditi censentur.

Varia sunt labiorum vitia, sed nos in præsentiarum non tractamus de labiorum auctâ magnitudine, cum sint vitia naturalia, de quibus naturam, tanquam novercam, accusare debemus, nec arte, vel vi naturæ corrigi possunt. Si præter naturam intumescant, ut sirabapum, vesparum, & muscarum venenatarum ictibus, tunc pars icta fovenda est *decollo malvarum, vel althææ, vel lactis, vel decollo hyoscyami, vel sonchi succo, vel etiam theviacâ* illinienda pro veneni conditione. Si post venena hausta intumescant, tunc curatio ad venenum dirigenda est. Si alia sint labiorum vitia, ex proprijs capitibus generalibus desumenda est curatio, nos tantum hic de duobus, nempe de Rhagadibus, & ulceribus tractare intendimus.

Labia non tantum musculis, nervis, venis, & arterijs constant, sed etiam ex carne indigestâ, & fungosâ, quorum cutis aded muscalis miscetur, ut cutis musculosa videatur, cæterum secundum nostram sententiam labia ex innumeris constant glandulis. Labiorum

cutis tantâ tenuitate, tantâ subtilitate, & teneritate prædita est, & aded musculis connexa est, ut non nisi laceratis labijs, cutem secernere possimus. Ac proinde cum labiorum cutis sit tam tenera, subtilis, & mollis, non ægrè à causis externis, ventis, frigore, & ab internis succis, ac vaporibus vitatur, finditur, & scinditur, ut quandoque etiam sanguinem fundat. Finditur labium tam inferius, quam superius in medio, ubi duz musculorum extremitates desinunt. Græci hoc vitium Rhagades, Latini labiorum scissuras, & fissuras appellant. Est malum commune, & non tantum labijs, sed etiam cuti, mammarum papillis, ano, utero, manuum volis, & plantis pedum competit.

Signa.

Labiorum rhagades sub oculos cadunt, & lippis, atque tonforibus nox sunt namque ulcuscula sicca, callosa, rimosa & oblonga, in labiorum medio, ac si homo rider, præter doloris sensum aliquid sanguinis ex eis prorumpit. Causæ externæ ægri relatione patescunt, quæ si absuerint, causarum internarum id in judicium est. Quandoque cum, & quandoque sine pruritu, ardore, & duritie sunt. Interdum superficiales, interdum profundæ videntur.

Ulcera labiorum oculis patent, tantum causæ signis vestigandæ sunt. Si per crisin contingunt, febris adest tertiana, acuta, vel maligna, & febris habetur solutio, si symptomatrica, febris intenditur, pejoratur, & lethalis evadit. Si à lue venerâ, suis cognoscitur signis, ut de lue diximus, Si febris & luis

venereæ signa adfunt, è latente in corpore cacoehymia provenire certum est, suntque crustosi, & sæpè manantia.

Causa.

Causam proximam prolabiorum rhagadibus existimant Galenici esse continuat solutionem in membranâ labia vestiente, remotiorem verò nimiam siccitatem membranâ illam debito fortius distendentem, & tandem rumpentem. Siccitatem inducentes causæ externæ sunt frigus, & calor, ut æris constitutio sicca, & frigida, qualis in Martio, & flante Boreâ contingit, itè diuturna in solis radijs commoratio, & vehementia æris algore. Internæ sunt vapores calidi, & sicci (hos vapores siccos nunquàm observare potuimus) per œsophagum, vel asperam arteriam, ex partibus infernis ascendentes, vel humores à capite ad labia destillantes. Vapores isti calidi, & sicci nunc ex stomacho, nunc intestinis, nunc pulmonibus, nunc hepate, & venis, nunc ex corde ascendunt, imò ex utero, undè vulgares feminis salacioribus rhagades esse familiares ob uteri siccitatem deducunt. Cœterùm hi vapores calidi & sicci à partibus hisce infernis ascendentes per nates & os distillantur, antequàm labiorum tunicis se insinuant.

Labiorum ulcera secundum vulgares orium habent ab humoribus acerbis, eisque vel piuriosis, vel biliosis, vel serosis, vel atrabilijs à partibus superis, vel inferis, & præsertim ab hepate, omnium ulcerum scaturigine, ad superficies hæc transmissis.

Rhagades labiorum oriuntur ab aci-

dis, falsisque particulis rigentibus, à sanguine, vel lymphâ, vel succo alimentitio secretis, & in labia transmissis, quæ eorum tunicam inà rigidam reddunt, ut non satis commodè flecti, & distendi possit, & ad levem quamvis tensionem fac è rigum rectitudinem dehiscat. Sic experimur, flante Boreâ, rigidiore, & terrestres particulas in aëre volitantes omne humidum consumi, & scissuras fieri, vel tempore hyberno ab æris acido easdem oboriri, uti tempore æstivo à calore, & siccitate hæc particulas commovente, vel à calore interno ustulante omne humidum consumi: ità in febribus à particulis acerbis per motum ad labia delatis, humidum absorbi, & tunicam humiditate destitutam, & ob siccitatem rigidam, ad leviolem omnem tensionem secundum rugarum rectitudinem distendi, & disrumpi.

Ulcera labiorum constituunt particulae salinæ, acres, acidæ, & aliæ heterogeneæ glandulis obstruentes, & cum hisce particulis nulla via parula derit, nisi subtilissimis, & violentissimis, quæ remotam contrahunt, in labiorum superficie sedem figunt stagnatione, exsiccantur, & cutem cum carne excedunt, & devastant.

Prognosis.

Labiorum rhagades non sunt parvipendendæ, non inopiandem inducunt, distensionem, dolorem, & sanguinem excitant; at si in longum tempus protrahantur, in ulcera crustosa, callosa, & ægiè sanabilia abeunt. Ab ortu contractæ difficulter curantur, res liquæ non inà ægiè sanantur, nisi ad

CAP. XLIV. De Labiorum Rhagadibus, & ulceribus. 197

cancerofam naturam accedant.

Ulcera, vel veficulæ labiorum, quæ febris accidunt, bonam ſpem prænunciant, naturæ enim coctionem prævalere oftendunt, & febris vel exfectam ſolutionem, vel imminutionem ſignificant, & per ſe facile ſanantur, ſi cum coctionis lignis appareant; ſi vero cum viribus debilibus, & alijs pravis ſignis os & labia exulcerentur, lethale. Quæ à Lue Venereâ proveniunt, difficillimè curantur, artem à quacumque dependeat cauſa, ſi negligantur, & diù durent, in ulcera excedunt, & cancerofa degenerant.

Curatio.

Vulgares Galenici nimiam ſuccitatem, quæ cutis nimis tenſa redditur humectantibus corrigunt, & ſolutam reſarciunt unitatem. Cauſas, à quibus rhagades dependent, ſiquæ ſunt, tollunt. Si vitioſi humores adſunt, illos evacuant. Si vapores in cauſa ſint, hos auferunt, & hepatis, uero, vel etiam toti corpori, unde illi proveniunt, ſuccurrunt. Si à frigore externo rhagades ortum ducant pinguibus, & humectantibus labia illiunt, ut oleo amygdalarum dulcium, nucum, oleæ, roſarum, vel ad pe capſi, gallinæ, ſeuo hircino, vel badino, mucilagine ſeminum cydoniorum, pſyllij, tragacanthæ, gummi ceraſorum &c. aquâ roſarum extractâ. Item Viſcigeno pomato vulgari, butyro recenti inſuſo. A cauſa calidâ & ſiccâ rhagadibus lintea tenera ſucco ſedimajoris, & ſolani madida imponunt. In profuſioribus unguentum de ceruſſa, vel lithargyrio adhibent.

In labiorum ulceribus vulgares corpus à praviſſa ſuccu libant, deinde hu-

morum acrimoniam corrigunt, & mitigant, tandem decocto ariſtolochia, agrimonia, & abſynthij cum quadam aluminis portione, in quo mel roſarum diſſolvunt, ulcera abluunt, hinc linimento ex lithargyrio inungunt, & ad plenariam conſolidationem unguento Apoſtolorum, vel emplaſtro griſeo perducunt.

Rhagadum curationem nos ita inſtituimus: Si à lue venereâ ortum ducant, ſequenti medicamento ſaneſcunt, ut.

Mucilag. ſem. cydonior. ʒ. ʒ. ſucib. Saurini gr. iij. camphoræ gr. iij. merc. dulcis ʒ. j. m. ſ. linimentum.

Veltangatur ſpiritu Mercurij dulcis. Si rebelles & obſtinatæ perſeuerent, tunc æger Aquam Anti-venereâ noſtræ deſcript. ſumat, & abſque topicis medicamentis ſponte ſanantur, ut fuſius De lue Venereâ lib. 3. cap. 16. diximus.

Ad labiorum rhagades à particulis acido ſaliſis, vel frigore calore, & ſiccitate contractas curandas conveniunt mucilaginofa, blanda, & demulcentia ramoſa, particulas acido ſaliſas inviſcantia, heberantia, & contingentia. Si malum fuerit diuturnum, corpus extracto jalappa cum mercurio dulci purgetur. Topici applicamus varia medicamenta, quæ puricillarum rigiditatem demulcent, & ſiccitatem leniunt hujusmodi ſunt mucilagines ſeminum cydoniorum, pſyllij vel ſeuum hircinum, axungia anſeris, taxi. Johannes Hærmannus in labiorum hiſſuris curandis commendat pinguedinem, quæ ex cochlearibus ligneis ad coquendum in culinâ uſitatis, ſi aliqua uſulum igni admoventur, & torrentur, exillat.

Multum conducti vini spiritus, in quo folia malvarum, & florum sambuci macerata fuerint, vel decoctum florum camomille in lacte. Optimum erit oleum cere, vel ex ovorum vitellis. Usitatissimum est unguentum Pomatum, quod sic paratur:

℞. *Syracis calamita*,
benzoi elect. ana ʒ. x.
cinnam. elect.
caryophyllor. ana ʒ. vj.
radic. iros florent. ʒ. j.
nuc. mosch. ʒ. iij.
macis ʒ. j.
flor. lavendula,
spica ana p. ij.
pomor. aurantior. recent.
citri recent. ana num. ij.
odoriferorum num. xxij.
aqua ros. opt. ʒ. xvi.
vini alb. opt. ʒ. iv.
ung. ros. alb. lib. iij.
sevi castrasi lib. j.
cera alb. ʒ. iv.
f. lege artis Unguentum.

Quod non solum utiliter ad labiorum rhagades, sed etiam ad cuti decorum conciliandum adhibetur. Si profundiores, & majores sunt rhagades, sequens unguentum probati existimatur usus.

℞. *Lithargyr.*
thuris,
Zinzib. alb. ana ʒ. j.
cera mollis ana q. s.
ut f. unguentum.

Labiorum ulcera, quæ in febribus accidunt, per se facile sanantur. Quæ à lue Venerea originem ducunt, luis sublatione sanescunt.

Si sine febre, & lue oriantur ulcera, æger salsa, acida, acris, atomatica, & sermonem multum vitet, & eorum

curatio ab aliorum partium ulcerum curatione nihil differt. Si malum est ex ipso ulcere, nihil purgantia prosunt. Dum à particulis salinis, acidis & acris stagnantibus, & glandulas obstruentibus genescim ducunt, corrigentia, & absorbentia conveniunt, quibus semper aliquid mercurij dulcis addatur, deinde, quæ tubulos obstrictos reserant, præcipue diaphoretica, liquorum decocta, & potiones vulnerarie pluries descripta præ alijs conducunt.

Fortasse ea adhibentur medicamina, quæ acidum absorbent, salsumque diluunt, ac proinde maximum meret emplastrum Saturni cum croco Martis impositum, item omnia medicamina Saturno maritata, aut etiam vini spiritus camphoratus, in quo sal Saturni dissolutum fuerit. In his ulceribus maxime conducit Mercurius dulcis unguentis optimæ notæ commistus. Quendam nos observavimus ulceribus in labijs diu laborantem, quem omnibus vulgaribus medicamentis incassum adhibitis, tandem vitrioli Cyprij infusio curavit. Optima erit lapidis medicamentosi infusio, ut & aqua viridis. Si sordida sint, plerique mel rosatum, vel aluminis infusum extollunt. Tandem consolidat emplastrum oppodeltoch, vel sodicationum, vel benedictum nostrum. Hæc medicamenta commodissime somni tempore applicantur, ita enim rectius retinentur.

CAP. XLV.

De Mammillarum, & Papillarum
Ulceribus.

AB ore recta descendimus ad mulierum mammas, dulcedinis, & deli-

deliciarum portum, sed iste portus binos continet scopulos, quibus humanæ mentis navis alliditur & naufragatur; conciliant quidē mammæ elegantes mulieribus decorem & venustatem, infantibus vivificum præbent nectar, sed earum venustus viros ad amorem invitat, & invictos vincit, sicut *Gal. lib. 4. de Hip. & Plat. decretis cap. 6. ex Euripide de Menelao* scribit, quod cum stricte ense Helenam quasi eam occisurus irruerit, ubi mammæ viderit, stupore aded ob ejus pulchritudinem, correptus sit, ut ne tenere ensē amplius poterit, sed abjecerit, imò eam osculatus sit.

*Vbi papillas ejus aspexit, statim
Tibi coruscus gladius, è manu excidit,
Et proditricis osentum excepisti canis.*

Sed per quæ delinquent mulieres, per hæc eadē plectuntur. Hæc quot funectis internis, & externis casibus, quot viarū desciminibus plectuntur, quæ tūm ipsi cælebi, tūm conjugato, & gravido, circa suæ gestationis incerta, dubiæ eventu, tempora præprimis partum ipsum obtingunt! In ma omis à tumore, inflammatione, abscessu, fistulâ, œdemate, scirrho, emphysemate, cancro, magnitudine indecorâ, foveâ, ulcere, rhagade, & morbo pilari torquentur mulieres, nec in his tantūm partibus, sed etiam in utero, qui cum mammis consensum habet.

Mammæ geminæ sunt, partim ut idonei alimenti proventus geminæ proli sufficeret, partim ut unâ morbo, aliove casu impediri succionis functionem sufficiens alia subministraret.

Sitæ sunt in mediâ pectoris arce supra masculum pectoralem humerum

adducentem, non in abdomine, ut bruxis, ad commodam lactationem: cū infans non statim brutorum more ambulare queat, sed in genitricis ulnis detentus, mammis admoveatur. Collocatæ sunt ad supremam pectoris regionem, ut puer cordatus, & prudens evadat, & intellectum è matris corde sugat, ut *Rabbi Abba Appelli* ineptè inquit: tūm ne puer matris, aut nutricis pudenda videre cogatur; tūm ne brutorum more in loco sordido sugeret.

Magnitudo variat, in viris exigua est, quia glandulis ferè carent, pinguedo tamen subiecta in obesis mammæ attollit. In nuper natis puellulis vestigium adest pectori impressum & apertum, deinde paulatim extuberat & in virginibus parvulis vix præter papillas aliquid apparet, donec sensum in malorum magnitudinem & figuram crescant: & quandò ad duos protuberant digitos, menstrua fluere incipiunt tunc fororiari puellarum mammæ dicuntur, quia primum intumescunt, quod non singulari, sed sicut geminæ sorores simul nascuntur. In vetulis flaccescunt, atque etiam præter papillas nihil ferè apparet pinguedine & glandulis absumentis. Intermediâ ætate alijs magis, alijs minùs tumentes sunt, prout mulieres non gravidæ, vel gravidæ, & lactantes; his n. tumentioribus opus est, quàm illis. In varijs Indiæ regionibus, ut in Regno Senegæ, & in insulâ Arnabonis mammæ ad imum usque ventrem protendantur, & elevatæ in terga reflectuntur. In Meroë, quæ Ægypti insula est, fœminæ mammæ infantibus paces habent, ut refert *Pomponius Mela*, undè *Juv. nalis satyra 13. canis.*

Quis cum idum guttur miratur in Alpibus? amicus

In Meroë crasso majorem infante mammellam?

Cœterum præstat mediocris, quia magnæ mammæ inflammationibus, cancro & alijs languoribus sunt obnoxie.

Figura subrotunda est, Semiglobum quasi referunt. In nonnullis propter nimiam molem pendet, & substantia mollis, maximèque albicans.

Componuntur mammæ ex multis glandulosis corporibus, magnitudine diversis, varijsque tubulis, ac ductibus inter se coëuntibus, multâque affusâ pinguedine junctis, & compactis, quæ simul membranâ carnosâ succinguntur, ac subjectis musculis annectuntur. Glandularum una magna in medio sita est, quam reliquæ minores circumstant: etiam vasorum lacteorum plexus infinitis glandulis interjiciuntur quibus mediantibus non solum lacteus succus ad omnes defertur, verum etiam minores suum lac in magnam glandulam effundunt. Præterea in ipsis glandulis pori sunt amplii, & copiosi, in quibus tanquàm in cellulis, lac usque ad suctionis tempus asservatur, nisi fortè ob nimiam copiam, aut tenuitatem ex ijs sponte citius effluat.

Magnæ glandulæ superstat Papilla, quæ corpusculum est teres, ac fungosum, tenui cute amictum, multisque foraminulis pervium. In hanc glandulam lactei ductus termigantur, per ejusque foraminul. lac, tanquàm per tubulum in os infantis suctione, vel pressione infunditur. Est exquisiti sensûs, atque in eâ ex levi, gratâ contractione voluptas percipitur. Insuper ex contactu, & suctione flaccesce-

re, erigique potest instar glandis penis, undè matres, nutricesque libentius cum voluptatis quodam sensu infantibus mammam præbent. Circulum habet circumjectum, quem Areolam nuncupant, in virginibus pallidam, in prægnantibus & lactantibus fuscâ, in vetulis nigram.

Venas duplices habent mammæ, unam axillarem per exteriora mammarum distributam, & ab axillari ramo derivatam, alteram mammatiam vocitatam à ramo subclavio venæ cavæ declinantem, ac per interiora dispersam. Has totidem comitantur arteriæ consimili ratione à ramo subclavio arteriæ magnæ, nec non axillari deductæ ad vehendum sanguinem virali calore turgidum. Nervos habeat à quarto ramo medullæ spinalis, qui ad papillam copiosiores delati, acutiorem et sensum tribuunt. Habent etiam ductus lymphaticos.

Agimus tantùm in hoc capite de mammarum ulceribus, & morbo pilari, ac papillarum fissuris, reliqui verò affectus, qui ipsis accidunt, ex proprijs capitibus sunt desumendi.

Signa.

Ulceramammatum, cum visui pateant, non opus est ea signis describere, ubi verò plures in mammis fissuræ unam foveam faciunt, tunc mammatum fovea dicitur, & est major, latior & profundior, cui dolor sæpe copulatur.

Causæ.

Mammarum foveam, disruptis pluribus fissuris à serosis acris humoribus

bus inductis, & in unam majorem unitis exoriri dicunt vulgares; ulcera verò ab humoribus acris, & erodentibus, ut in alijs partibus, fieri fatentur.

Eadem est mammarum foveæ, & ulceris causa, nempe particulæ acidofalinæ, vel in ipso lacte, vel in succo partis alimentitio, vel in sanguine, vel in lymphâ, rarâ, sensibilem, glandulosam, & spongiosam mammarum substantiam depalcentes, & corroden-tes, à quibus partium profundarum, & cutanearum textura, & continuïtas postmodum dissolvitur. Vel à tumoribus disruptis, à contusione, vel vulnere male curato.

Prognosis.

Foveæ & mammarum ulcera difficillimæ sunt curationis, substantiam namque habent flaccidam, & si irritantur, non ægrè in ulcera cancerosa degenerant.

Curatio.

In foveâ, & ulcere vulgares, ritè curandis universales instituunt evacuationes, undè viriosorum humorum evacuationem apprimè necessariam censent cum sanguinis detractione, & mensium provocatione præcipuè si mensui sanguinis suppressio hos affectus ab utero ad mammas per consensum foveat. His præmissis, càmethodo, quæ in aliarum partium ulceribus, procedunt; capropter humores leniunt acres, ulcus mundificant, abstergunt, & tandem consolidant medicamentis illis tonsoribus notis, quæ centies repu-

diavimus. His omnibus intentionibus emplastro triaphamaco satisfacere imaginantur.

In mammarum foveâ, & ulcere, si fœmina sit puerpera, vel lactans, antequàm lac absumatur, vel sanguinis motus ad mammas sistatur, non facile & satis feliciter curari possunt. Deindè si affectus sint pendulæ, ne humorum fiat affluxus, fasciâ apta de collo suspendendæ sunt, postmodum brachium ejus lateris, ne humorum concitetur affluxus, non movendum.

In horum affectuum curatione venæ sectiones & purgationes repetitas rejicimus, ejus namque cardo in eo cõsistit, ut particularû acidofalinarû fiat correctio, quæ nec purgantibus, nec venæ sectione obrineri potest: alia itaque vestiganda sunt remedia, hujusmodi erunt salia volatilia, quæ illas corrigunt, sudorifica diù in usum vocata, quæ vel insensibiliter, vel sensibiliter transportant, vel poriones vulnerariæ, nec non diuretica blandiora in usum vocitentur. Intereâ exulcerate partè maximopetè proderit, si sordida fuerint, *unguentum Egyptiacum inagistrale in spiritu vini solutum, vel unguentum nostrum magistrale, deinde unguentum album ex succis refrigerantibus, vel emplastrum Diasacurni cum croco Maris* pro ulceris exsiccatione, verùm vitentur emplastra solida, quia partem inflammant, & transpirationem impediunt. Pro pauperculâ unguenta communia, ut de *lucidâ, ly bar'yrio, plumbo ego.* in usum vocari possunt. Noltrates pauperculæ mulieres cum fructu solis *foijs suffraginis* utuntur. Si dolorificum sit ulcus, circumcirca oleo ex *ovorum vitellis, vel papaveris per*

expressionem illiniatur, vel ipsum lapidis medicamentosi infusione cum petrijs lineis curetur. De papillatum ulceribus fides sit iudicium, eademque curatio.

C A P. XLVI.

De Morbo Pilari.

Quidam medici inter mammarum affectus referunt malum pilare, quod greci *Trichiam* appellant, sic dictum a pilo, qui in mulierum mammis post partum invenitur, & cum lacte excernitur, neque veteres medici de hoc ambigunt, & sæpè hoc malum, sed non verum pilum in lactantibus observavimus, cuius quoque *Aristoteles lib. 7. de hist. animal. cap. 11* mentionem facit, statuit namque si pilus poculo haustus sit dolorem moveri in mammis, qui non sedatur, donec pilus vel expressus exeat sponte, vel cum lacte exsugatur.

Hanc ineptam Aristotelis sententiam *Hieronymus Cardanus, & Thomas à veiga* sequuntur, & ineptè credunt pilum lactationis tempore ad mammas pervenire posse vel epotum, vel cum cibo sumtum, quia attractrix virtus in mulieribus tunc valida urget, vel ob sanguinis ad mammas confluxum, & partis laxitatem, vel cum chylo celeriori fluxu agitatam ad mammarum tubulos, & ipsum tandem lactis receptaculum desatam, ex quo cum lacte per papillatum cuniculum quendam ejectum, qui ex eodem prominet aliquà parte, ut digitis, vel vossellâ se facile præbet extrahendum.

Nec nos majora, & devia movent exempla; refert enim *Langius lib. 2. epist. 40.* de juveniculâ quadam in Principis ejusdem Germani gynæceo, quæ cum sese ad speculum adornaret, de-
tentis ore aliquot acubus, quibus pelû affigetet, ab amasio à tergo clâculû accedente intra scapulas percussa, acus deglutivit, quas post biennium, illâlis uteribus, eminxit. Item *Alexander Benet. Hist.* narrat de puellâ venerâ, quæ acum deglutiverat, eamque post biennium eminxit, calculo incrassatam. *Antonius Benvenius* refert, quod mulier Hetrusca, acum cupream deglutiverat, quam triennio indè, juxta umbilicum sana excreverat. Narrat *Hellmonius de in æliis materialibus S. 7.* vilhordia anno 1636. *Rusticus* mihi notus volens saginare vaccam, illi quotidie poculum dedit, cui incoxerat olera cum fursuribus. Tandem emaciatur in dies magis, capitque dextero crure claudicare: Casâ vacuâ, invenitus est brevis culter uxoris suæ, in capulum buxentum resortus, inter costas, & homoplatam abditus: rustica enim concidendo rapa, cultrium inter olera reliquerat, eumque vacca bibendo deglutiverat. Hæc, & alia exempla an verâ sint, fides sit penes suos authores. Unum tantum scimus nos deglutitos nummos, lapides, metallorum fragmenta, clavos, & id genus alia per anum excreta fuisse.

Has aniles fabellas credat Judæus appella, quod nos non ita facile Aristoteli, ejusque procuratoribus per epistolam assentimur, sed cum corâatis viris, *Fajalo, Mercuriali, S. nerto*, & recentioribus aliter sentimus; non enim per tot angî potius temesque anfractus ab ore ad mammas pilum ducti posse

posse arbitramur, etiam si mamme illius forte, cum in ipsarum venis consisteret, amplexura essent, Certum est pilos in tot coctionibus immutatos permanere, cum compactioris sint substantiæ, verum hoc prius nos monet, ut pili facile ciborum reliquijs adhaereant, cur non cum fecibus per intestina, tanquam per liberius potius ostium, quam per tot exlissimos meatus, totque anfractus ad mammas usque deriventur; Dicimus itaque hos pilos in mammis generari. Quid autem sint, sub iudice lis est; *Mercurialis* namque sanguinis fibras esse putat, ceterum sanguinis fibræ à sanguine non separantur sed totus ad mammas affluit. Alij probabiliter statuunt in mammis hos pilos generari, ut in alijs corporis partibus pili generantur, & ex ijs excemuntur, quemadmodum in renibus, urinariisque meatibus, & per urinam excietos fuisse testatur fide dignæ observationes, & hos nos milioris autopsia demonstravit, sed nec horum genesim adducunt. Puente namque est cogitare pilum haultum ventriculum, meseraicas, jecur, secundum eorum se tentiam, per transire, & ad mammarum cauetas per mille anfractus pervenire.

Signa.

Pro morbo pilari in mamma adest rubedo, ingens dolor, rigor, febris capitis dolor, & totius corporis laxitudo, & alia symptomata, quæ pilus ibi generatus excieat, dum exitum querit.

Causa.

Pili causa in mammis est natura

lasciviens in succo alimentitio, quem assimilare deberet, & non solum non assimilatur, sed facultatis assimilatricis errore in hoc aliquid juxta exilium partium situm transmutatur, videtur pilus, sed revera non est talis, videtur pilus, sed revera quid pilo analogum. Hoc idem, & alia plura in abscessibus frigidis, athetomatibus, stentomate, & melliceride observantur, tunc cum solida continent corpora, ut ungues, pilos, lapides, spinas, varium insectorum figuras &c. Hæc etiam quæ adducuntur mammas accidunt, & interdum pili generantur pili. Lapidem scribit *Leonardus* in mammis genitos se observasse. Narrat *Basilius* de *Stentomate* epist. 10. se novisse mulierem, quæ cum gravissimis uberum doloribus exagitaretur, ei dolor non prius desierit, quam apertis uomicis utrinque vermes profluerint. Sunt mammarum exquisitissimi sensus, unde facile à rebus pili in ipsis genitis læduntur: hinc dolor, ex quo patris contractio oboritur, & in glandulis obstructio, ex hac, lactis stagnatio, demum aciditas, hinc sanguis in vasis capillaribus stagnat, & tot, quot in signis enumeravimus symptomata, emergunt. Unde evenit quandoque, ut inflammationi, & lactis coagulationi mammarum trachia succedat.

Prognosis.

In mammarum trachia libenter extracto, vel exucto pilo, evanescunt symptomata, quod si in longum protrahatur tempus, pili eliminatio, in abscessum degenerare solet.

Curatio.

Hujus morbi curatio in pili eliminatione consistit, undè si sponte non exeat, lac sugendum præbeat, infanti, vel leviter exprimat, vel si expapillâ prominear, digitis, vel forcipulâ extrahatur; quod si reluctetur, exterius mamma *cancrosum sive viscidum, vel marinorum succo* illiniatur. Inter cetera chirurgos admonitos esse volumus, ut à frigidis, & repellentibus, quæ ceu venena vitanda sunt, se abstineant, est enim humor affluxus, & suppurationem impediunt, succos tamen stagnantes magis incassant, & resolutioni reddunt inhabiles, ac glandulosum *mammæ* corpus corruptioni facile obnoxium reddunt. Eapropter interius, & exterius varia diaphoretica adhibeantur, quæ obstructions referent, & aciditatem emendent.

CAP. XLVII.

De Papillarum fissuris.

Mulierum gravidarum, aut puerperarum, præcipue lactantium papillæ, non secus ac oris labia, anus, uterus, volæ manuum, & plantæ pedum, interdum finduntur, rimulas, fissuras, seu scissuras, quas rhagades vocant græci, contrahunt, quia tenerimâ obducit sunt tunica: acerbos patiuntur dolores, maxime dum lac sugit infans, ubi aliàs eadem papillæ sanæ existentes potius ab infantis suctione titillationem, ac veneream sentiunt voluptatem, ob inter mammæ, & uterum consensum. Aliæ foveâ, hoc

est, rimâ maximâ in papillâ molestantur.

Signa.

Hi affectus nullo alio indigent indicio, præter inspectionem, sunt enim ulcuscula rimosa, & quandoque maxima veluti fovea in papillæ foraminulis, valde molesta, & dolorifica & maxime inter sugendum, & ob dolorem acerbissimum sustinere non possunt lactantes, ut mammæ sugantur; ex quibus quandoque sanguis, & quandoque ichor, seu corrupta Lympha stillat.

Causæ.

Oritur hic affectus à nimia cuticulæ teneritate papillas amiciente, quæ ob fortiores infantis suctionem dissilit, vel cum à gingivis, aut à dentibus papillæ mordentur. Sæpe excoriantur, ab infantum in ore aphthis, aliisque ulceribus male affecto; vel à lactis effusi particulis sponte, & continuo affluentibus, in papillis adhærentibus, non rectè absteris, & acescentibus; vel non minus à salsa lactis acrimoniâ, quam ipsas etiam mammæ, & partes vicinas, ad quas pertingit, excoctante; vel à particularum salinarum, vel acidarum in cutaneis papillarum poris existentium dominio, à quibus papillarum tunica in fissuras diffinditur, vel ex lymphæ benignioris, & oleosæ defectu, papillarum teneritatem, vel rigiditatem non inungentis, & emollientis. Huc referimus causas externas, ut sunt aer in calore excedens, aut nimis frigidus, & acris, qualis in Martio, & à constitutione Aquilonis dominatur, quia tum temporis aer multum acidi nitrosi

in se continet, undè in his, qui teniori cuticulâ præditi sunt, fissuras in labijs, & manibus excitare solet.

Producitur fovea à fibrarum disruptione inter fissuras existentium, à fortiori adhuc acrimoniâ acido-salini in fissuris collecti productâ, quæ sit à lymphæ benignioris, & oleosæ defectu, cum glandulas, cum fibras hinc tantis, & illinentis, ne tam facile à quadam externâ injuriâ dissumpantur.

Prognosis.

Papillarum fissuræ, & foveæ non solum molestæ sunt, & acerbissimo dolore conjunctæ, sed si diutius durant, difficulter sanantur, quia ob infantium suctionem, nulla, aut exigua papillis datur quies, & in prava transeunt ulcera, ob acre ibidem adhuc ins, undè sæpe tota corroditur, & absorbetur papilla, & mulieres ad lactationem plane redduntur ineptæ.

Curatio.

In minimis his affectibus ita dicta observanda est, ne saltim autem excedat mediocritatem, aliter medicus, & medicamenta iucassum laborabunt. Aërem frigidum, & aquilonium vitæ ægra, nec tali aëri papillas exponat.

Putant vulgares hos affectus ab humorum biliorum acrimoniâ, vel siccitate à quibus cutis dissumpitur, & eroditur, progigni, ideòque bilis acrimoniâ obtundentibus, eos curari credunt, ac proinde linimentis ex semine psyllij & cydoniorum utuntur, quibus tutiam, cerussam, oleum rosatum, aniliorum, vel butyrum recens, vel anatis

axungiam admiscunt. Lactantibus, antequam infantis ori papillas inserant, imponunt, ut aqua rosarum abluatur. Si dolorem in ipsâ suctione lactantes sentiant, papillis calicem stampeum, vel argenteum, superiori parte perforatum, mammae respondens, papillâ uberris vacce recens mastatæ rectum appointunt, & infanti papillam illam vacinam sugendam præbent; sic enim infans suget, & labijs papillam fissam, & dolentem non attinget, & lac suget. Ad præcautionem ultimis tribus gestationis mensibus, ne papillæ findantur, nonnulli capulas aut pileos e cerâ paratos, abjectis resinâ plenos, thotaci alligatos excogitant, quos papillis superimponunt, ne decidunt, ubi resina abiuncta est, novam infundunt.

Ad papillarum fissuras & foveas curandas necessaria sunt medicamenta, quæ particulas acido-salinas in papillis collectas, vel aliundè suppeditatas emendant, heberant, & diluunt, qualia sunt diaphoretica, ut animonium diaphoreticum, benzoardicum minerale, diaphoreticum in peracutis &c. vel remedia porosa, & volatilia sæpius exhibita. In parte conducunt terra exanimata vitrioli, spiritus vini camphoratus, cremor calcis vivæ, cremor lassis, mucilagines, quas in labiorum rhagadibus retulimus. Fibras siccas & rigidiores emolliunt, leniuntque mucilagines extracta cum aqua spermatis ranarum addito momento sacchari Saturni, & utia preparata. Excellens, & omni Laude dignum remedium est butyrum elictum ex cacao in coccolutis opificio. Optimum medicamentum est oleum ovorum, lumbricorum, vel unguentum aureum cum guttulis aliquot olei destillati ligni Rhodij. Vel sequens linimentum.

℞. ol. amygdal. dulc. q. s.
in quo frige radices cilij, in taleolas dis-
sectas, amoris radicibus, extra ignem
agita oleum candelæ ex cerâ albâ, donec
fiat linimentum. Vel conveniunt axun-
gia & pinguedines in labiorum fissuris
descriptæ.

Ad dolentes papillarum fissuras vel à fortiori infantium succtu, vel à lactis aciditate, vel à lactentium aphthis applicetur oleum hyperici vel rosatum, in quo radices pimpinellæ siccæ infuse.

In foveâ, vel papillarum exulceratione laudamus oleum cere, vel balsamum propretatis per infusionem, vel balsamum Peruvianum, vel oleum myrrha, cujus descriptio talio est.

℞. Ovum unum, vel plura
indurata mediâ elaxatione, quæ à corti-
cibus munda, ac in duas partes æquales
divide, aufer vitellum & vacuum imple
myrrhâ electâ in pollinem redactâ, filo
circumligatum ovum elando, pone in
loco humido inter duas patinas. Ovum
aperi, & liquorem ad hunc usum inve-
nies. Si papilla sanguinem stillet infu-
sione lapidis medicamenti, vel terrâ
exanimatâ vitrioli utere. Adverte ta-
men, quod in horum medicaminum
applicatione semper pilentus plumbeus
in apice, foraminibus pluribus per-
vius super papillam imponendus
est.

A mammis ad uterum descendimus ut amantium mos est, tanquam ad humanæ generationis officinam: Hæc tantilla pars præ omnibus alijs viros allicit, & dementat, ac mulieres in varios adigit cruciatus, verum in hoc naturam culpâre debemus, quæ invitât & trahit: cæterum per naturam, quæ peccavit mulier multis ærumnis ob-

noxia facta est, & præter cruentam deturpationem ob patratum scelus, & communes cum viris languores, sexcentarum ærumnarum, & innumabilium penè morborum propriorum jugum sufferre cogitur, quibus muliebrium tribuitur cognomen, ea propter uterus est omnium totius corporis pravorum humorum sentina, imò cloaca, unde jure merito miseræ abyssus, calamitatum chaos, morborum morbus, & lerna malorum dici potest. Ob commercium, quod cum nobilioribus, & principalioribus habet, cor, cerebrum, nervos, diaphragma, ventriculum, intestina, dorsi medullam, vesicam &c. in languores trahit hinc mulieres faciliè epilepsiâ, animi deliquio, cordis palpitatione, suffocatione, asthma, inappetentiâ, nausea, vomitu, colico, vel dorsi dolore affliguntur. Quantum Creatori debemus, qui nos non fecit feminas, & à tot carnificum cohorte eripuit, attamen nos ingrati nec etiam tantum munus acceptum animo volutamur! In præsentiarum non agimus de morbis mulierum, nam de his posthac ex professo tractabimus, nunc ulcera, quæ sinum respiciunt muliebrem, examinabimus.

CAPUT XLVIII.

De Cervicis Uteri Vlceribus & Rhagadibus.

Nonnulli hanc partem exulceratam, quam trutinandam agredimur, uteri cervicē impropiè appellât, rectè appellatur uteri ostiū, quia virile mēbrū per hoc ingreditur, & egreditur; ac rectius à quibusdam uteri va-

gina vocatur, quoniam virile membrum in se recondit, ut vagina gladium, aut cultum excipit. Est hæc vagina mollis, laxa, rugis orbicularibus inæqualis, (ut major titillationis ab attritu percipiat voluptas) substantiam habet nervosam, ut dilatari possit, sed aliquantulum spongiosam, & fungosam, (hæc in libidinis testu aliquantulum turgescit, ut virile membrum strictius comprehendat) longitudinis digiti longioris est, & latitudinis circiter intestini recti: quæ longitudo, & laxitas variant pro ætatis ratione, nec non prout fœmina magis, vel minus libidine fervet. Sic quoque variant rugæ in virginibus, nec non in mulieribus, quæ rariori utuntur venere, nec in eam feruidè proclives sunt, quàm in ijs quæ nunquam pepererunt, multo crebriores, ac densiores sunt, quàm in ijs quæ sæpius pepererunt, nec non in meretricibus frequenti utentibus coitu, ut potè in quibus sensum ferè obliterantur. Non tantum huc nos de uteri vaginæ ulceribus agimus, verum etiam de ejus partium ulceribus, quæ sub oculis cadunt, ut sunt labia, nymphæ, caruncule myrtiformes, & clitoris. Est clitoris glandiforme corpusculum illud in superiori pudoris muliebri sinu situm, & à Nymphis custoditum, sub qua foramen est pro emitendo lotio. Ab *Auscenna* virga mulieris appellatur, & quia est vulvæ non relaxatè inserta, ob hanc emulationem columella ab *Hip.* nuncupatur. A nonnullis membro virili correspondere perperam creditur, nam potius cum virilis virgæ glanda convenit, in qua tantummodo voluptatis sensus ex coitu percipitur, & non in reliqua parte oblongâ, sed longitudo tantum inter-

vit ad seminis in uterum porrectionem, ita quoque clitoris procul dubio glandis muliebris munere fungitur. Hæc pars exquisitissimum habet sensum, & in actu venereo iucundissimam præbet titillationem, undè in hac delectationis mulierum præcipua sedes est, dum coitu utuntur, atque hinc amoris dulcedo, Veneris æstrum, libidinis sedes, & irritamentum dicitur; capropter nulla pars in coitu majori delectationis sensu afficitur, ac mulieres fricatrices in Venerem magis quàm illa exagitar.

Clitoridis magnitudo communiter exigua est, sub nymphis, ferè latens, deinde leviter prominet, in aliquibus mulieribus præsertim libidinosæ, quæ Venerem voluptuosè exercuerunt, manifestè cernitur, in alijs in majorem longitudinem ad formam penis virilis excrevisse observatum est. *Platonus* clitoridem monstruosam in quadam muliere collum anserinum crassitie, & longitudine æqualle vidit. Excrevit in illis fœminis, quæ continuè & frequenter hanc partem contrahent, & fricant, quæ ratione penis muliebri nominatur, ita ut hujusmodi mulieres illâ parte nonnunquam abusus fuerint, & cum alijs sui sexus coeuint, sic *Platonus* scribit de quadam *Helena*, quæ hac parte multas exercebat fœminas, & virgines vitia bar, quia in coitu penis virilis instat turgere, & quando erigitur, ad libidinem stimulat, undè evenit, ut penis virilis loco clitoride aliquando abutantur mulieres nonnullæ, & mutuò coeant, quas conficatrices vocant, capropter hæc pars virorum contemptus dicitur. Hujus libidinis inventrix Scribitur *Helena* quædam, quæ usâ etiam sit *Suppho* poë.

poëtria, sed de his *P.ulum Apostolum ad Romanos* loqui censemus 1. 26. *Nam semine eorum immutaverunt naturalem usum, qui est contra naturam.*

Signa.

Cervicis uteri ulcera cognoscuntur ex dolore, & continuâ eo in loco mordicatione, quæ sensim augetur, & intenditur, ac præcipuè sitigantur, vel abstergentium aliquid immittatur, & præ omnibus concubitus horum ulcerum est index. Deindè visui etiam patent, adhibito, matricis speculo. Tandem cognoscuntur ex parvis affluxu, quod interdum odore caret, interdum flavum est, viride, fetidum, prout ulcus modò mite, modò sordidum est, cujus portio quandòque mensibus fluentibus, cum sanguine fluit, si ulcus magnum sit. Trahuntur etiam sæpè aliæ partes in consensum ut si ulcus vesicæ officium simul afficiat, urinæ ardor, & frequens supervenit mictio, caput, lumbi, aliæque partes in consensum trahuntur, undè vel dolent, vel malè afficiuntur, etiam febris accedit lenta crebris horribus.

Ex causis signa facillè innotescunt, quæ sunt vel externæ & evidentes, ut medicamentum erodens partus difficilis, concubitus violentus, vel impurus, quæ ex ægræ relatione percipiuntur. Si hæ causæ absint, ab internis malum natales suos habuisse necesse est. Si fuerit secundina corrupta, lochia retenta, fluor uterinus, gonorrhoea, vel alius humorum affluxus, facillè innotescunt.

Rhagades cervicis uteri non ægrè innotescunt, nam ulcuscula sunt rimo-

sa, & oblonga, ijs simillima, quæ interno tempore in labijs, manibus, & pedibus è frigore oriri solent. Recentes latent, temporis tamen cursu, vel in coitu sese produnt, quia tùm dolor proriginosus aliquis excitatur, & cruoris aliquid effunditur. Quodd si res ita se habeat, & de malo adhuc suspicio aliqua angar, citè cervicè reserata, & inspectâ, malum sub oculos cadit.

Causæ.

Ulcerà cervicis uteri, ut dicunt vulgares, sunt vel à causis internis, ut ex diuturno humorum biliosorum, aut fetosorum acrimonia affluxu, ut in fluore uterino diù perseverante, aut ex malignis humoribus cum sanguine menstruo in hanc partem, quasi corporis muliebri sententiâ confluentibus, qui per hunc locum evacuantur, præsertim in lue Venereâ, & malignâ gonorrhoeâ, aut ex semine corrupto, aut secundinis corruptis, lochijs itè diù post partum retentis & corruptis; ex inflammatione in abscessum versa, dum materia purulenta acrior reddita partem erodit atactam, sicque abscessus rum-pitur, & pus effunditur, ac in ulcus abit, vel ex excrementis in uteri plicis retentis, & ibi putrefactis. Vel à causis externis evidentibus, ut sunt medicamenta actia, & erodentia imprudentes applicata, partus difficilis, violentus coitus &c. Tandem sunt vulneratio causus, percussio, ut in alijs locis, quæ si non rectè tractentur, ulcera excitare possunt.

Secundum vulgare sententiâ cervicis uteri rhagades internè inducuntur ab humorum acrimonia, præsertim lentorum, & viscidorum affluxu, qui

hinc

hisce adherent partibus, ejusque rugas secundum rectitudinem exulcerant. Addunt etiam ingenem uteri siccitatem, qua rhagades ut plurimum sunt. Cæterum hæc pars nunquam sicca observatur, cum uterus sit universale & totius mulierum corporis emundatorium, & veluti colluviarium, quod perenniter profuit. Vel sunt à medicamentis acerbis, vel à coitu violento, vel à partu laborioso, ubi fœtus grandior fuerit, ut rugas aliquas, in uteri vaginâ distumpi necesse sit, quæ unitatis solutio ob continuum excrementorum affluxum sordida evadit, & hujusmodi ulcuscula exiunt.

Ulcera in uteri vaginâ à particulis acido salis membranarum fibras solventibus oriuntur, sive hæc in sanguine menstruo, in flore alio, aut lochia, sive cum semine virili à lue Venereâ conspurcato communicentur. Vel tunc sunt ulcera, cum vasa sanguifera erosa sanguinem fundunt, & per moram inter rugas putrescit, ac in pus commutatur. Vel producuntur cum sanguis, aliusve succus obstructione in suis conceprabilis retinetur, in quibus stagnatione acorem concipit, vasa erodit, & patefactâ viâ in suppositam defluit partem, ibi temporis tractu corrumpitur, in pus degenerat, & ulcus excitat. Vel inflammationes in abscessum degeneratæ tale ulcus excitare possunt. Externæ causæ sunt partus difficilis, orta violenta harum partium tubulorum, ac canalium exulceratio ab obstetrice imperita; ad hanc referimus violentum concubium, vel medicamenta erodentia imprudentiùs applicata.

Oriuntur rhagades internæ à particulis acido salinis in uteri vaginâ ex-

currentibus, & ulcuscula secundum plicas excitantibus. Externæ à coitu violento, penis grossitudine, vel à frictione periculanti, vel à sæu majori vi extracto, undè nimium distensæ non faciliè cedunt, sed impulsui resistunt, donec vehementiori & frequentius repetito dissingantur.

Prognosis.

Vaginæ uteri ulcera spernenda non sunt licet exigua, & quandoque curatu difficillima, cum in parte exquisito prædita sensu sint, ac varijs excrementis recipiendis idonea, undè fibrillæ omnes ab acerbis particulis ita discinduntur, ut quilibet levis excoctio magnam exagat Medici solertiam, & nisi rectè tractentur, in gravia degenerant ulcera. Hæc pars cum multis alijs contentum habet, undè varij morbi, & symptomata per contentum excitari possunt. Si hæc ulcera non fuerint magna, & fuerint recentia, faciliùs curantur, si nullam accidens conjunctionem habeant. Si verò fuerint magna, antiqua, & sordida, vel luem Veneream comitem habeant, difficulter curationem recipiunt. Si fuerint sinuosa, & depascentia insanabilia judicamus. Quæ sub oculos cadunt, faciliùs curationem admittunt, quàm quæ in profundo latent.

Rhagades maximè molestæ sunt, privant namque mulieres Veneris dulcedine ob dolorem, qui in coitu excitatur. Recentes faciliùs curantur, quæ callosa facta sunt ulcera, ut plurimum curato difficillima sunt, & præsertim ea, quæ luem sequuntur Veneream.

Curaio.

Cervicis uteri ulceta curate solent vulgares illis indicationibus, quibus aliarum partium ulcera. Primò itaque opportuno medicamento acres humores, undè uteri vaginæ ulceta ortum habent, purgant, & decentem vivendi rationem, ut alium humorum generis inhibeatur, instituunt. Si prædicti humores à toto dependant, universales, si à parte aliquâ, topicas celebrant evacuationes repetitas, nec sanguinis missiones omittunt, præcipuè si menstrua defecerunt. Si intemperies adfuit, juxta ejus conditionem eam corrigunt. Si à lue Venereâ contractum sit ulcus, malignitatem expugnant Veneream, deinde curationem; ut in alijs ulcerum generibus, communem instituunt.

Si dolor urgeat, illum sedant, ne molestiam ægræ inferat, ac ne ad partem affectam colluviem trahat. Dolor plerùmque à sordibus, & sanie ortum ducit, ac plerumque inflammationem habet comitem, tunc quæ sordes, & saniem abstergendi, inflammationem refrigerandi, & dolorem pacandi vim habeat, medicamenta applicant. In hunc ulum revocant *Lac infusum*, & præsertim *chalybeatum*, vel *ovorum albumina tria*, vel *quatuor, conquassata*, & cum *mucagine seminum psylli*, vel *emulsione seminum papaveris mista*. Vel *emulsiones seminum papaveris*. & *quatuor frigidosum majorem cum sero lactis caprino*. Si dolor urgeat, *aquam hordei cum succo hyoscyami* usurpant, vel ipsum quoque *opium alijs admisceant*.

Si ulcus fuerit sordidum, illud detegunt *sero lactis*, *aquâ hordei cum melle*.

Si v. leniora exposcat remedia, illud decollo *agrimonia*, *abj. thij*, *centaurea minoris*, *Gradicus aristolochia abitergunt*. Si valde sordidum fuerit, in hoc decocto, vel *uljs unguentum Apstolorum*, vel *Aegyptiacum* dissolvunt. Non desunt pessaria, injectiones, infestationes, clysteres uterini, irrigationes, fumigantia, unguenta, nec non convenientia emplastra epigastrio applicanda, ac effluaces dyjudicant thesmas exsiccantes. Non solum externa medicamenta, sed interna, ut *serenibinam cum saccharo* deglutiendam præbent, vel *pilulas de bdellio à ʒ. j. ad ʒ. j.* Non desunt decocta exsiccantia: nec potiones, ut

ʒ. fol. artemisia.

agrimonia,

pimpinella,

scutellaria ana m. j.

radic. rhabarbari ʒ. j.

sem. coriand. ʒ. ʒ.

visicis ʒ. j.

Coque in vini albi mensurâ, & dulcorentur saccharo. Bis singulis diebus ad ʒ. iv. exhibe, & ad longum tempus contrinuentur.

Ubi ulcus mundatum fuerit, illud carne implent, & tandem cicatrice medicamentis de communi ulcerum omnium claudunt.

Cervicis uteri rhagades vulgares Galenici cutant, si ab humoris actis fluxu originem ducant, universales totius corporis evacuationes præmittendo, & postea à topica deveniunt, quæ citra modicam humorum actionem leniant, undè commendant *oleum lini*, & *rosarum cum ovi viscelis*, item *succum plantaginis diu in mortario plumbeo cum pistilio agitantum*, donec spissescat: *Lac etiam cum saccharo*, *Unguentum quoque è muciagi-*

pidius

CAP. XLVIII. De Cervicis Vteri ulceribus, & Rhag. 211

nibus cum plumbo isto, & pompolige paratum vel artemisia succum cum cerussis in mortario plumbeo agitarum, donec unguentis consistentiam nanciscantur. Non desunt interea medulla, axungia &c. de quibus abundè diximus in laborum rhagadibus secundum Galenistarum curationem.

Si pruritum, vel dolorem comitem habeant unguentum ex mucilaginis seminum psyllij, cydoniorum, malvæ cum butyro infuso, & oleo rosaceo, vel unguentum pomatum, vel album camphoratum usurpât. Si callosæ fuerint unguentum ex oleo liliorum alborum, medulla cervinâ, terebinthinâ, & cerâ parant. Si à partu laborioso, vel coitu violento ortum cognoscant, clystere uterino è decocto rosarum, plantaginis, aristolochia, artemisia cum bolo armeno, sanguine draconis, & ibure utuntur, vel ex ijdem cum ovi albumine pessarium conficiunt, & induunt.

In uteri vaginæ ulceribus exactiorem vivenditationem ægræ prescribere necesse est, quia esed non sanat, multum tamen intemperantia nocere, & malum pejorare potest, eligantur itaque cibi euechymi, vitentur acida, nimium salita, & dulcia ob occultum acidum in se continentia interdican- tur, fructus boratij exulent, vinum eligatur oligosarum, & dulce, acidum angue pejus fugiatur, præ omnibus tandem sex rebus nonnaturalibus dictis, in primis Venus, tanquàm lethale venenum fugienda est.

Cervicis uteri ulcerum curationem aggredimur, tum interna, tum externa; interna ea sunt medicamenta, quæ particulas acidas, & salinas vel exturbant, vel diluunt, vel immutant, unde ad eorum exturbationem maximope-

re conducunt pilula de tribus, vel extractum catholicum cum mercurio dulci, vel marinâ mercurij. Item decocta ex lignis, potiones etiam vulvariae, ut quoque pilula ex terebinthinâ cum mercurio dulci. Externè verò ad ulceris mundificationem, si sordidum fuerit, convenit decoctum ex radice gentianæ, aristolochia rotunda, folijs abynthij summitatibus sabinae & hyperici. Vel fieri possunt injectiones per Syringam cum aquâ saphiræâ, vel Venetâ, vel ex infusione lapidis medicamentosi, quæ ad cicatricem usque valet. Si ulcus fuerit chronicum ad Thermas sulphureas, & aluminosas confugiendum est, ea sæpè ulcera, quæ alijs medicamentis sanari non potuerunt, sanant tum artificiales ex similibus paratæ mineralibus, optimæ sunt.

Si ex violento, & reiterato coitu, vel ab improvidæ obstericis in partu difficili dilaceratione contractum fuerit ulcus, multum valet decoctum radicis symphyti majoris, summitatum hyperici, scorodij, faniculae, stellaria, aristolochia cum myrrha paucâ quantitate pro uterinâ injectione. Vel si in conspectum veniat ulcus, præter hoc, quæ acutas absorbent particulas conveniunt, ut porosa ex lithargyrio, cerussâ, terrâ exanimatâ vitrioli, mercurio dulci, myrrâ &c. Nec non balsamus propretatus, vel infusio Lap. dis salutis, vel vini spiritus, vel oleum myrrhæ per deliquium multum valebunt.

Verumenimverò ulceris vaginæ uteri curatio à luis Venereæ curatione non dissidet, ut plurimum namque ipsius luis sunt symptomata, & tunc eodem modo, ut gonorrhoea vitiorum maligna curari debet, & purgantibus mercurialibus utimur sub diversis formis, ut.

℞. Rhabarb. pulverisati gr. xi.

Dd 2 1111

*terebinth. opt. ℥. ij.
mercurij dulcis gr. xiv.
m. f. pilule.*

Vel.

*℥. Pulp. cass. recens extract. ℥. ij
rhabarbari vigorat. ℥. j.
merc. dulcis ℥. j.
cum sacch. f. bolus.*

Vel sumantur pilule ex terebinthina, & mercurio dulci, ut de lue Venerea diximus lib. 3. cap. 2. de gonorrhœa. In uterum fieri possunt injectiones per syringam ex viurioli Cypri, vel lapidis salinis, vel draconis mitigati infusione, vel aquâ saphireâ.

Si chronica fuerint ulcera, non aliter ea curamus, quàm ut ipsam luem Veneream, tùm per purgantia mercurialia, tùm sudorifera, & alia de quibus opiparè de lue Venereâ diximus. Si sub oculos veniant in uteri vaginâ ulcera penicillo leviter tangantur aqua aluminosâ vel mercuriali, vel spiritu mercurij albo diluto, vel spiritu mercurij dulcis. Vel adhibere possumus suffumigium intra uteri vaginam per infundibulum admisso tantillo cinnabaris naturalis, vel ex antimonio, vel arsenicali.

Vaginæ uteri rhagades pro causæ diversitate diversa exposcunt remedia, eapropter si à coitu violento, penis grossitie, vel partu laborioso pronatae sint, clystere uterino utatur ægra ex decocto artemisia, malvarum, aristolochia, rosarum, plantaginis, radices juncis majoris cum bolo armeno. Si dolor & pruritus rhagades comitetur injectiones in uteri vaginam indantur ex decocto quatuor anodynorum in hydrolæ, in quo dissolvatur parum unguenti anodynini, vel olei papaveris per expressionem vel olei ex seminibus hyoscyami. Si à

particulis acidis, vel salinis stagnantibus, aliundè defluxis pronascentur rhagades, ea profunt medicamina per os, quæ porosa sūt, & diaphoretica; in uteri vaginam vero indantur pessarium ex semine hircino, mucilag. sem. Saccharo Saturni, in oleo sesamino, vel ex vitellis ovorum insitum. Pessarium hoc modo fit: Accipe pannum sericum ejusdem longitudinis cuius sunt rhagades, indantur pessarij ingredientia in crassioris digiti figuram efformata, filo alligetur, liquoris unguis, & per os in uteri cervicem immitte, in qua per tres horas maneat: his transactis, iterum intinge & immitte. Si lœm Veneream sociam habent, applicari potest unguentum pomatum a nobis descriptum, cum mercurio dulci; vel in ipso unguento, vel alio dissolvatur mercurius vivus tamdiu. donec nullum mercurij granulum appareat.

C A P. XLIX.

De Vteri Vlceribus.

AB uteri vaginâ rectâ ad uteri fundum penetramus, & ea describimus ulcera, quæ hanc partem quandoque corripere solent. Dicitur uterus quoddam in eo, tanquàm in utre quadam, fœtus continetur. Matrix, quoddam fœtui alendo se matrem præstat, æque etiam per imprægnationem mater efficit. Loci, & locelli, quoddam locus initialis sit hominis, ac præ omnibus alijs jucundis locis juvenibus placeat. Hic uterus, quem ad concipiendum, conservandumque fœtum in scæminis primus Protoplastes condidit, situs est in hypogastrio, seu infima imi ventris regione,

gione, in pelvis, quasi ossæ, quam ossis pubis, facti, illi, cœvencilque concursus efformant, cuius pelvis in fœminis major est amplitudo, quam maribus: undè etiam fœminis grandiores, & ampliores sunt nates. Talem obtinuit fœtus uterus, ut pro fœtus magnitudine infans distendi, & commodè eam excludi posset. In medio locatus est, ad nullum inclinans latus, nisi dùm utero gestat mulier masculam, vel fœmeliam: tùm enim dextrum, vel sinistrum magis occupare solet, estò hoc non perpetuò sit verum. Positus verò est inter intestinum rectum subjiciens & vesicam incumbentem, tanquàm inter duo pulvinaria, unum stercore, aliud urinâ repletum. *Quid ergò iuperbimus, quicquid sterens, & urinam nascimur?*

Uteri magnitudinem non tantùm variat ætas, corporis moles, sed & Veneris usus, & fœtura, consideraturque in longitudine, latitudine, & crassitie. Longitudo in ijs, quæ mediæ sunt statutz, & venere utuntur à pudendo usque ad fundi finem communiter est undecim digitorum, fundi verò trium. Fundi latitudo duorum, aut trium digitorum, quæ in non gravidis eadem est latitudo fundi, ac cervicis, atque hinc amplitudo facile conjici potest. In virginibus parvus est, vesi. à minor, perfectis major, quibus ramen Venere abstinentibus, ut & Vetulis satis parvus, sed crassus est: at major in illis quæ sæpè conceperunt, & utero gestarunt, tùm enim magis, magisque amplificatur, cùm ante ingravidationem sacri ossis initium non superavit, fundus postea ad umbilicum, & ultra etiam extenditur, ut tenuibus incumbat intestinis. Crassities uteri eodem fere modo

variat, nam in virginibus tenuis est substantia, in adultioribus crassior, & quò sæpius mulier uterum gerit, eò crassior est ejus substantia. Menstruis fluentibus, crasset uterum, & quando instat mensium excretio, humida, & crassa apparet uteri substantia. In gravidis putarunt *Galenus, Vesalius*, alijque anatomici uterum, quò magis extenditur, eò magis attenuari, & crassitudinem in longitudinem absumi. Sed hi decepti fuere, uterum namque prætere naturam renuiorem observarunt live ex humoris defectu, live nimia distensione, & tunc de facili rumpitur à fortioribus impellentibus, ut in puerperâ observavit *Salmon*. A primò conceptu uterus secundum omnes dimensiones paulatim ab augefcente fœtu dilatatur, & in dies crassior, carnosior, & robustior redditur, ac postremis mensibus duorum fere digitorum crassitiem equat, & tamen tanta uteri moles intra duas, vel tres à partu hebdomadas per celebrem lochiotum expurgationem ad pulchritudinem sedit magnitudinem. Uteri figura alijs rotunda, alijs pyriformis statuitur, sed licet ad rotundam accedat, quò capacior sit uterus, ramen cum *Sorano, & Fallopio* fundum cucurbitæ optimè assimilari posse sentimus, quia fundus rectè deorsum sensim angustiat; collum verò uteri canalem oblongum, & rotundum repræsentat. Cavitate obtinet exiguam, quæ in non gravidis, præcipuè virginibus, vix fabam majusculam capit, & factâ conceptione unâ cum fœtu, actoto utero incrementum. Hæc nullis cellulis est donata, uti falso septem cellulas ei aliqui tribuunt, sed solâ lineâ quadam per longitudinem exporrectâ, & in interiorē

cūtum parte carnosæ tunicæ designatâ in dextram, sinistramque partem, dirimitur, qualis linea etiam in viri scroto extrinsecus conspicitur.

Constat triplici membranâ distensibili, & ampliabili, ut totus cum incrementente fœtu ampliari uterus possit; extima hujus membranæ tunica à peritoneo protogatur, estque robusta satis, ut non facile crepet, intima nervosa est, fibrosa & porosa, media omnimodè carnosâ, extra prægnantiæ rationem densa, & admodum compacta est. Post autem fœtum conceptum humorem appositum in modum spongiæ tam largiter combibit, ut eò paulatim laxata stupendam gravidæ utero crassitiem adducat.

Uteri fundus suâ substantiâ superiùs nulli parti annectitur, ut liberior sit ejus extensio: à lateribus verò duobus ligamentorum paribus, quorum usus est uterum suspensum tenere. Unum par superius est latum & membranofum statuitur à musculis lumborum ortum; desinit verò in uteri fundum prope cornua, laxum, & molle est, ut extendi, & contrahi possit. Vocatur hoc aliofome, ob similitudinem alarum vespertilionum, quam refert. Atque hujus paris beneficio alligatur ossibus ilij. Hoc ipsum subinde quandoque laxatur, vel etiam violenter dirumpitur (ut per vim, partûs difficultatem, pondus fœtus &c.) ex quo mox uteri fundus suo fulcro destitutus, uterus in sinum descendit, & inversâ aliquando cervice; atque aliquando vel lateraliter ad inguina recidens peritoneo ansum ad herniam præbet, vel inverso modo foras ruit, ubi tamen accedat necesse est quoque

solutio connexionis colli. Alterum par inferius rotundum, instar lumbricorum, subrubrum instar musculorum ab utroque fundi latere profectum antroorsum pergit, peritonæumque ac musculorum: b. lominis permeans atque ad pubis ossa deveniens bipartitur, unaque medietate clitoridi jungitur, alterâ autem in membranam dilatatum, per femoris musculos spargitur.

Per uterum etiam varia vasorum genera discurrunt, arteriæ s. venæ, nervi, lymphæ ductus, & tubuli quidam utero peculiare; innumeræ ferè arteriolarum uteri tubulos ingredi, ibidemque terminari conspiciuntur, sed usque adeo exiles, ut sine microscopij ope, vel alio artificio instituto, vix discerni queant. Notatu etiam dignum est, quod duplo, vel triplo plures, & majores, magisque flexuosæ arteriæ per uterum ipsum, quàm per vaginam, serpant. Sed ad uteri ulcera noster redeat sermo.

Signa.

Uteri ulcerati signa sunt gravissimi pubis dolores insensenter, vel per intervalla puris fœtidi taburra fluere solet vel per se, vel unâ cum lorio, illudque mordicans reddit, syncipitur dolet, aliquando convulsiones accedunt, initio quidè ubi unâ inflammatio adest, febris associatur, paucior sanies dolorificè exit, ubi autem ulcus jam suscitans evasit, plus saniei cum mitiori dolore effundit. Sæpè Sphacelus inde oritur, qui nunquam ad pudenda usque se extendit.

Causa.

Ad ulcerum uteri causas referunt Galenici inflammationem suppurationem, & apostematum ruptionem suam ulcus efficiens, quod neglectum, vel pravâ vivendi ratione deterioratum ulterius exulcerat, item humores acres de fluxu suo, diuturnæ coryzæ instar, in uterum confluentes, exulcerantes, demumque profundius erodentes; parum difficilem læsionem utero inferentem, vel per laboriosum conarum, vel violentam fœtus, vel secundinæ ex utero evulsionem; Venerem immodicam, præsertim per improporionatum concubitus, vel luis Venereæ contagiosam uedinem; medicamenta in uterum immissa, vel alia quædam assumpta acia, & erodentia.

Uteri ulcus secundum nostram sententiam oritur ab inflammatione in abscessum transeunte; ex particulis n. acido-saliis exaltatis in materiam purulentam contentis uteri continuitas dissolvitur, & ulcus producit. Vel non prævia inflammatione, & tunc ex mentium, vel lochiorum suppressione oritur, vel sanguine lymphâ, aliisque succis nimis crassis, sive acris, qui rarij in utero circulant, vel remoram acquirentes, copiosius in solidis, & continentibus uteri partibus collecti acorem contrahunt, rubuli, & vasa dilacerantur, quibus dilaceratis, pus exsurgit, unâ ulcus, id sanguis, & succus alim. citius corrumpitur, & acrimoniâ nanciscitur & unâ cum pus emanat. Quandoque uterus à lue Venereâ conipurcatur, corrumpitur, eroditur. Vel lapsi, percussione, conisione uterus læditur, fibræ rum-

puntur, canaliculi destruntur, succi non circulant circa destructa conceptacula stagnant, & intestino motu fermentescunt, particule acutiores sulciuntur, & plures rumpunt fibras, ac nutrimentum fundunt, quod corrumpitur & corruptam materiam putulentam promovet.

Prognosis.

Ulcus uteri festinam exposcit opem, aliàs tunc in pejus; est namque uteris colluviatum proscripti sanguinis imputi, & menstrualis cadaverosi, ac proinde sponte ad gangrenam, & sphacelum proclivis, verum quoties pus ab eo album paucum, & minime fetidum effluit, minus periculi, & sanationis difficultatis habet; nigrum verò, & fetidum ulcus cacoëthicum, & corrosivum, ac medellæ inobediens designat.

Curatio.

Cutant Galenici uteri ulcus humorum acrium affluxum inhibendo per venæ sectionem in brachio institutam, si ægra sit plethorica, si cacochymica, per repetitum catharticum medicamentum à pravâ colluvie corpus repurgant, benignioribus tamen utuntur catharticis, ut folijs sennæ, rhubarbaro, myrobolanis, & electuario catholico, sed sedes non est uteri emunctorium. His præmissis, per totum sanationis tempus decocta vulneraria, & abstergentia propinant ex radice china, symphyti, aristolochia rosunda, folijs agrimonie, plantaginis, pimpinellæ, centinodia, millefolij, artemisæ &c. Vel sero-bisshi resinam cum saccharo rosaceo, & pro

pro majori ulceris exsiccatione *pilulas de bdellio*, aut *pulverem ex trochiscis alkekengi* exhibent. Interim utero exulcerato non desunt lotiones ex decocto siccantium, cum valdè phlegmatica pars sit, ut.

℞. *Herbar. pilosella*,
plantaginis,
persicar. maculat.
equiseti gna m. j.
flor. ros. rubr.
malv. arborea ana p. ij.
balanst. p. j.

f. decoctum in aqua suff. quantitate, & colatura tepidè injiciatur. Vel decoctum hordes, in quo mel rosatum sit dissolutum, additâ myrrhæ paucâ quantitate, injiciunt. Pessum quoque ex croco oleo rosaceo, adipe anserino, & medullâ cervinâ, paratum adhibent, Externè infusiones, cataplasmata, & suffumigationes adhibent, & pro suffumigio sequentibus utuntur trochiscis:

℞. *Thuris*,
styracis calamit.
myrrhæ,
mastiche,
gummi juniperæ,
ladani ana ℥. j.
cum s. q. terebinth.
f. s. a. trochisci.

Absterfo ulcere in decocto equiseti, millefolij, & ros. rubr. dissolvunt unguentum diapompholygos, & in uterum injiciunt.

Uteri ulcus curamus, prius corpus deplendo pilulis mercurialibus, hænanque sanguinem, lympham, aliosque succos à particulis acidis, & salinis repurgant, mundificant, & ulcerum sanationem promovent, post quas, ea propinamus medicamenta, quæ

particulas cortigunt, eliminantque, ad quem finem diaphoretica, & porosa sufficiunt; propinamus itaque decocta sudorifica, quæ non tantum sudores, verum etiam per utinas humores peccantes aciores eliminant, ac simul quoque acres, & acidos temperant. Commendamus *sula volatilia*, *oculos cancorum*, *stibium diaphoreticum*, *sulphur auratum diaphoreticum*, *cornu cervi*, *ebur philosophicè præp.* *salsuccini volatile*, &c. *viperarum*, *saccharum Saturni* &c. Item potiones mundificantes, & abstergentes ex decocto *radicis aristolochie*, *hystoria*, *herbarum melisse*, *artemisie*, *perforata*, *persicaria*, *millefolij* &c. in quo *corallorum*, & *margaritarum magisteria* exhibemus, quæ acida, & corioliva talia domant.

Pro potu ordinario sequentem commendamus, ut.

℞. *Dillani*,
melissa,
malvicaria,
artemisia,
agrimonia,
scordij,
vincetoxici,
pulegij,
summi. hyperic.
radic. symphyl.
tormentilla ana m. j.
sem. feniculi ℥. j.

Considantur omnia in particulas, & exactè miscantur, tum ℞. Hujus mixture largum manipulum, super fundo aquæ comm. lib. ij. vel iv. Coquantur in vase cooperulato ad transversum pollicis casum, colatura in cella probeobstruata servetur, admisce tertiam vel quartam vini partem, ut ægra pro potu ordinario bibere possit, quod copiosius, cò melius, quod minus etiam vini ad-

admisceat, eò ocyds sanat, sed ejusmodi potus per multos menses ad sanationem usque continuari debet.

Quò ad topica per syringam varios liquores, & misturas detergentes injicimus, ut lapidem calaminarem præparatum, vel lapidem salinis in aqua plantaginis solutum, vel aquam Venercam n. d. vel vinum aloeticum, vel myrrhatum.

Soler quandoque uteri ulcus corrosionem nancisci, & ipsum uterum, & quandoque intestinum rectum perforare: ita scortum observavimus, quod nunc fæces per uterum, nunc per intestinum excernebat, plura præbuimus medicamenta, & injectiones peregrinus, & nunc incolume, sed cum eadem excretionem inter amafios vitam ducit. Quandam honestam mulierem in uteri vaginâ ulcere laborantem per plures invisissimas vices cum quodam optimo empirico, & quia ulcus sordidum, & corrosivum erat, & ægra debilis, intestinum exedit rectum, undè quadam tenebrini specie correpta cum cadaverosa excretionem, intra tres dies, utero, & intestino sphacelato, non obiit, sed abiit.

Interdum uteri ulcus, ut gonorrhœa virulenta curari debet, quæ etiam sæpè huic ulceri conjuncta est, & ea conveniunt medicamenta, præter mercurium diaphoreticum, & nostrum arsenicum metallicum, quæ lib. 3. de Lue Venerea cap. 2. de gonorrhœa descripsi-
mus.

CAP. L.

*De Penis Vlceribus.

AB utero ad penem transitum facimus, nam inter has partes ma-
D. Caroli Musiani Tom. II.

gna familiaritas, & cognatio intercedit, imò Galenus anatomes ignarus lib. de usu partium, & anatom. administ. ineptè credidit mulierum genitalia non nisi solo situ à virorum genitalibus differre. Quod commentum ex ijs natum est, qui sæminam esse tantum virum imperfectum putarunt: (Sed sæmina non est homo) & ob frigiditatem temperiem, ac naturæ debilitatem membra generationis non potuiss. foras protrudi; quemadmodum in viro ob eximium calorem, & naturæ robur foras fuisse propulsa. Insuper nonnulli Galeni procuratores in hujus opinamenti confirmationem varias mulierum pestes in viros mutatarum historias adducunt, quas recenset, & eruditè repudiat Librandus de Diemerbroeck lib. 1. anatomes p. m. 154. Cœterum mulierum genitalia non tantum situ à virilibus differunt, sed universâ structurâ, quoad numerum, superficiem, magnitudinem, cavitatem, figuram, munus, & usum, ut satis manifestum est perito anatomico, & cuivis, qui muliebria cum virilibus confectæ velit.

Dicitur penis à pendendo, penis namque antiquis idem erat, quod cauda, quæ sicut à postetiori animalium parte, ita penis à parte hominis anteriori pender. Dicitur *virga*, quia hæc pars attracta visgam repræsentat. *Mensula*, quòd rigida hæc pars viro mentem quasi eripiat vel eam à serijs ad jocosâ, & Venerea avertat. *Coles*, *veretrum*, *priapus*, *membrum virile* per antonomasiam, *membrum genitale*, & omnium vivantium pater. Alia nomina imponi solent plurima, quæ scite e præstat, quàm recensere. *Plato* in *Timæo* penem animal quoddam esse cen-

E e suir,

fuit, quoniam ei infusa vis generandi est valde appetens. Verum cum vis illa appetens non huic, sed cerebro infusa sit, ex eoque in penem fundatur; cum etiam unum animal non possit esse alterius pars integrans; cum denique penis sit dumtaxat pars animalis totum cum alijs complens, non potest certe animal, sed tantum animalis pars & instrumentum dici. Membrum virile in magnâ æstimatione, ac dignitate apud Ægyptios, & alios habitum fuit, ut in *Riolano* videre est, at nunc in magnâ æstimatione est tantum apud mulieres. Est penis pars organica ad seminis in uterum injectionem primariâ, secundariâ ad urinæ excretionem comparata, ob quam non est formatus, cum sine eo fœminæ lotium excernant.

Situs est penis in imi ventris parte inferiori ad ossis pubis radices, estque in medio positus, ut commodius fieret congressus, & alijs partibus, impedimento non esset. Ortum suum ducit à validiori, & robustissimo fundamento c. pubis ossibus. Est numero unicus, at nos quendam Præcutinum Nicolaû nomine duplici pene à naturâ dotatum observavimus.

Figuram habet longam, & serè rotundam, sed non exactè, quia in superiori parte, quam penis dorsum vocant, est latior.

Magnitudo, quæ in crassitie, & longitudine consistit, variat; alijs namque major, & alijs minor est. Minor est primò brevioris staturæ viris. Secundò ijs, qui à Venere abstinēt, si *Galeno* credendum est. Major est primò, nascutis, seu magno naso præditis, nam penis magnitudo ad nasi proportionem correspondet, si Physiognomis

credimus. Secundò, stolidi, ac fati majori pene insigniuntur, & ex penis magnitudine de hominis ingenio nonnulli conjecturam faciunt, & magnum penem ingenium durum, ac stolidum asinino simile indicare dicunt: sed hæ regulæ perpetuè non sunt, sed plurimis exceptionibus patent. Ineptum est illud obstetricum dictum futurum penem majorem, vel minorem, si vasa umbilicalia non proximè, vel proximè ad umbilicum ligentur, abscindanturque in recens natis ob urachum; qui inter vasa umbilicalia continetur, & vesicæ fundo annectitur, unde existimant retrò membrum id cum vesicâ trahi vel laxari, quod tamen ob sua vasa, & musculos impossibile est.

Constat penis cuticulâ, cutē, & membrânâ carnosâ, quæ partes dicuntur externæ, seu continentes. Pinguedine destituitur etiam in hominibus obesissimis, quia hæc pondere & nimia mole huic parti impedimento esset, sensus obtunderetur, & voluptas minueretur. Constat etiam substantiâ, propriâ, & ei maximè conveniens est; non effea, ut in cane, lupo, & Vulpe, non etiam cartilaginea, neque carnea, sed talis, quæ laxari, & ad seminis ejaculationem extendi commodè potest, itaque peculiaris, & propria, qualis nulla est in aliâ corporis parte. Aliæ partes sunt internæ, seu contentæ, & hæc propriæ penis partes quatuor sunt, Urethra, duo corpora nervosa, & glans.

Urethra, seu fistula urinaria, inferior ejus pars est, quæ interiùs tenui, ac sensili, exteriùs verò carnosa, ac fibrosa membranâ vestitur, estque cervici vesicæ continua quidè, sed tamen non ejusdem cum illâ substantiæ,

nān nonnihil spongiosa, & obscurioris coloris existit, potestque intensione, seu penis erectione turgescere, ac distendi, & postea rursus flaccescere, qualia in velicę cervicę contingere nequeunt. Urethra toto ductu æqualem habet amplitudinem, exceptā parte anteriori, qua glans cum corporibus nervosis jungitur, ut potē in qua superficialem habet cavernulam: in hac nonnunquā acris liquor per gonorrhœam subsistens, exulceratione admodum dolorosam facit.

Urethrę superiore parte incumbunt duo corpora nervosa, quę maximam penis partem constituunt: quę substantia tota est quasi crassissima arteria, fungosa, carne infarta. Hęc substantia duplex est, prima exterior, quę densa, dura, & nervosa; altera interior fungosa, rata, & cavernosa, atque ex nigro subrubra, seu subatra materia, veluti nigricante sanguine oppleta, farciminis instat. Oriuntur hęc duo corpora ex inferioribus ossium coxendicis partibus, ipsque validis ligamentis adherent, & circa os pubis mediam, cui alligantur ligamento nerveo subiecto, coeunt; interventu tamen septi membranei, tenuissimi, pellucidi, ac fibrosi, à se invicem distinguuntur. Horum corporum nervosorum substantia interior spongiosa ex venulis, arteriis, & nervulis inter se ad teris modum intertextis conflata est, ut spiritu, & utroque sanguine impleri possit, hinc cum penis flaccidus, magnus, vel parvus existat, à majori, vel minori sanguinis, ac aliorum succorum copā in corporibus nervosis existente dependet: quod dum fir, nervosa substantia magis tenditur, & efficit, ne spiritus cito dissipetur, undē penis in-

duratio, adeoque erectio, & elongatio, non tam coitūs causa, quā ut recta, & longissimē semen vir ejaculari queat, ad uteri orificium pius factu virilis membri intra muliebrem sinum motu.

Penis fini imponitur glans, balanus græcē, seu penis caput, in quam prædicta duo corpora nervosa cum Urethrā terminantur. Hujus pars inferior, quę tria illa corpora nonnihil ambitu excedit, corona vocatur. Formam, seu figuram habet tutbinaram, vel subrotundam: colorem, dum flaccida est sublividum; dum tumer, rubicundum. Substantiam obtinet propriam, carnosam, mollem, spongiosam, exquisiti sensūs pruritūs ergō, magis quā nulla totius corporis pars, quia planē nervosa, tenuissimāque membrana tectam, anteriūs oblongo foramine perviam. Investiens aurem membrana ab urethrę internā produciunt, quę per foramen exiens testatur, ac circa totam glandem expanditur, eique acutissimum confert sensum, quem eum in finem in primis habere debuit, ut maxima in coitu excitaretur voluptas: illa enim nisi adesset, vix quisquam Venereos exerceret actus, & sic humanum genus brevi penitus interiret.

Glans extrinsecus involueto, seu tegmine, quod præputium dicitur, integitur, quod constat ex cuticulā, cute, accedente interiūs pelliculā nervosa, ac tenui, à panniculo carnosō. Hoc in inferiori sui parte infra foramen glandi alligatur per membranam, vel vinculum quoddam, frænum appellatū. Dicitur Præputiū, quia præ pudēdis existit. Hoc est illud præputiū quod in circumcissione à Judæis, & Mahometanis resecatur, undē à præputādo

do, ei nomen impositum esse voluit, & quibus illud Circumcisione ablatum est, illi Apellæ, & recutiti dicuntur. Exerescit ita hæc pars in Hebræorum, & Turcarum pueris major, quam in Christianorum filijs, ut in caudæ morem acuminetur, inò in nonnullis monstruosam nascitur longitudinem, & latitudinem, ut ob Periphimosis metum, ejus partem abscindere cogantur.

Mandavit Deus Hebræis præputium ad minuendam libidinem, quia extrema penis glandis pars tota carnosa, mollis, & spongiosa est tenuique, & tenerrimi sensûs membranulâ obvoluta; idèdque glans exquisito titillationis sensu prædita est, & magis quàm ulla totius corporis pars, quia planè ferè nervosa, eum in finem, ut coitus maximâ cum jucunditate, ac titillatione peragi possit. Hinc à naturâ glans præputio tegitur, ut mollis, & exquisiti sensûs, pruritus ergò, asserveatur, quòd si præputium, ut in Circumcisione, refeceretur, vel glandem non tegat, vel illud abbrevietur, ut ad glandis investituram non sufficiat, illa obdurescit, sensum acquirit obrutum, & magnam voluptatis partem impedit: præterquam quòd præputium in Veneris palæstra non recurrit, nec corpora nervosa, neque glans, in qua Veneris sedes sita est, à præputij recurso titillatur, unde Veneris sensus minuitur.

Omnis generis vasa penem ingrediuntur scilicet arteriæ, venæ, nervi, & muscoli. Arterias interiores duas insignes obtrinet ab hypogastricis per nervosa in primis corpora dispersas, ad quorum coalitûs initium ingrediuntur, & secundum penis longitudinem em-

excurrunt, exilibus ramulis ad lactea emissis: exteriores verò à pudendis recipit. Venæ externæ, & cutaneæ frequentes à pudendâ, internæ verò ab hypogastricis emittuntur, & per corpora nervosa excurrunt: malè ergò venis destitui penem quidam putarunt. Nervos habet exteriores, & interiores ab ossis sacri medullâ, quorum duo mediocri magnitudinis unâ cum arterijs, parte inferiori per longitudinem penis excurrunt. Quatuor musculos habet penis, horum duo breviores, & crassiores sunt, & penem erigunt, oriuntur nervosi sub penis principio ab appendice coxendicis, & nervosi feruntur ad penis corpora, in quæ non procul ab exortu inseruntur, quorum usus est penem erigere, & in congressu sustinere. Reliqui duo longiores, & graciliores sunt, & à recti intestini musculo sphinctere secundum penis longitudinem oriuntur, subtrâs deindè feruntur, & ad urethræ latera circa medium inseruntur. Horum usus est inferiorem urethræ partem dilatare, tum in mictione, tum præsertim in coitu, quandò corpora penis repleta sunt, ne seminis exitus cohibeatur, & acceleratores nominantur.

Signa.

Penis ulcera, si sint externa, visui patent, quandòque tamen sunt circa glandem, coronam, frænum, & præputium, & propter membri tumorem videri nequeunt. Interna interiores, occultæque obducunt partes, nempe urethram, & ex dolore à transeunte urinâ acri excitato, & pure ante urinam egrediente, pene tumido, & tenso cognoscuntur:

Causa.

Putant Galenici penis ulcerum causas esse diversas, in quibuldam enim est humorū impuritas, quæ isthuc à naturâ proscibitur, eoque procumbens in temperamentis fervidis febrem continuam, tumorem, ruborem, & ardorem suscitât, & demum supuratione factâ, ulcerationem. Frequentius ejusmodi ulcus oritur à concubitu cum fœminis Gallicanis saniosam virulentiam ex utero in virgam communicantibus. Tandem etiam casus, vel protusio versus penem in causâ esse possunt.

Penis ulceris causam eandem esse dicimus, ac florum ulcerum, ut pluries diximus. Causæ sunt succi, qui particulis salinis, acidis, & corrosivis imbuti, sive sint in sanguine, lymphâ, vel alimento, modò vitæidi, & non rectè circulantes, ac in vasculis stagnantes, effervescent illæ particule, fibrillas distendant, exedunt, & rumpunt, undè ulcera emergunt. Ortum ducit aliquandò ab abscessu inflammationem insequente, vel ab urinâ, vel seminali fluxu exedentibus particulis referto, vel à calculis asperis, & cuspidatis in transitu per urethram suis spiculis fibrillas, & canaliculos lædentibus, vel à medicamentis corrosivis in urethram immixtis. Sæpè tandè hoc ulceris genus suam trahit originem à fœminarum lue Venereâ conspurcatarum concubitu, in quibus uterus sordibus refertus, penem inficit, & exedit. Imò dùm uterus in coitu incalcescit, non tantùm miasmata exhalat Venerea, quæ in urethram se insinuant, eamque exedunt, sed quandòque in

prostatas glandulosas penetrant, & dictarum prostaticarum sanguinem, succum alimentitium, vel lympham inquinant, & virulentiam suâ corrodunt, undè pus per urethram affluens ipsam contaminat.

Prognosis.

Vlcera penis magis perniciofa sunt, quàm in alijs carnosis, utpotè partes calidæ, & humidæ ad necrosim proclives, succorum pravorum susceptivæ, maxime in loco decliviori positæ, exquisito prædicti sensû, & uirga per penis meatum curationem impedit; undè si peritè non tractentur, & brevi non consanescant, temporis circulo in ulcera depascentia, & cancerosa abeunt, quibus faciliè vel integer penis, vel ejus pars amittitur. Vlcera penis interna deteriora, cum sint in loco humidiori, ob frequentem irritationem ab urinâ fluentem, & tardæ, & difficilis curationis, quia perpetuò madent, & attractu manuali tractari nequeunt; si verò in inferiori penis parte, in virgæ radice sedem fixerint, urinæ incontinentiam faciunt, vel ad minimum laboriosam ejus redditionem, interdum etiam ani sphincter unâ per consensum dolet, & hæmorrhoides protuberant. Vlcera, quæ à lue Venereâ in pene excitantur, vel in excrescentias, verrucas, vel carunchiam in urethrà, si perperam tractentur, degenerant, vel totum suâ venenatâ energiam inficiunt.

Curatio.

Penis ulcera curant vulgares, præmissis primò purgantibus ex *casia re-*
E e 3 *cons.*

cons extracta, tamarindis, sebesten, electuario catholico cum syrupo rosarum soluto ad ℥. j. in formā boli. deinde venæ sectione; postmodum viſtūs rarionem cam inſtituunt, quæ humoris accimoniam obtundit, & decocta ad sudorem excitandum ſuadent, ut ulcera exſiccantur, additis trochiſcis *alkakengi*. Tandem ad topica conſugiunt.

Si ſit recens cum quadam calefactione, illud leviter detergunt, & refrigerant, eapropter *agnam plantaginis, ſolari, nympha, aut decoctum hordei cum syrupo de roſis laxativo, ſero Lactis* uſurpant, adduntq; trochiſcos *albos Rhafis, vel alkakengi, vel lithargyrii decoctum* inijciunt, vel *unguentum pompholygos cum ovi albumine, & aquâ hordei, vel ſero lactis*. Renibus refrigerantia imponunt, ut utinæ ardor minuarur, ut *unguentum album, Galeni, ſantalatum, album Rhafis, &* quæ ex oleis frigidis leviter aſtringentibus parantur: ſed perperam renibus refrigerantia applicant ad urinæ ardorem minuendum; urina enim extrinſeco imperanti non audit, ardorem excitat ejus ſal in tranſitu, quem per exulceratam urethram facit, & veſicam, & urethram ſanam non lædit, cum ſit naturale harum partium excrementum.

Si glans exulcerata fuerit, vitant emollientia, & exſiccantia adhibent. In principio itaque ulcus mundant *aquâ roſarum, & plantaginis, vel hydromelise, vel aquâ, in qua alumen diſſolutum ſit, deinde vino, in quo ſolia rubi, myrti, plantaginis, nuc. cupreſſ. balauſt. & alumen cocta ſint, in quo panni linei imbuti glandi imponantur, & præputium ſemper mundant.* Poſt-

modum uſurpant *unguentum album camphoratum, diapompholygos, de rutia, Lithargyrio, ceruſſa &c.*

Ulcera antiqua, ſordida, & putrida ablouunt *hydromelise cum alumine, vel unguento Egyptiaco, vel Apoſtolorum cum lixivio, vel auripigmento, in aquâ roſarum ſoluto, ne ampliùs ſerpant.*

In ulcere vitulento præcipitato cum unguento roſaceo miſto utuntur, & præcipue ſi à lue venerâ ortum ducat, & huic inſiſtunt, donec vitulentia ablata eſt. Si calloſum ſit, partem ſovent decocto *malvæ, alth. ſem. lini, vel medicamento digeſtivo, donec calloſitas ſeparetur.* Quid ſi præputium intumefcat, & ulcus ſub ipſo latens, medicamentis tractari nequeat, dolor perſeveret, & ulcus ſerpit, præputium ſecundum longitudinem incidunt, ut ulcus mundificari, & commodè curari poſſit.

Si ulcus in penis meatu deliteſcat, abſtergentia, & glutinantia per ſyringam inijciunt, nimirum *agnam plantaginis, aquifetis, myrtill. vel harum plantarum ſuccos, vel trochiſcos alkakengi cum aquâ roſarum, vel ſequenti utuntur.*

℥. Vini alb. lib. j.

aqua roſar. &

plantag. ana ℥. iiij.

alum. uſti ℥. ij. B.

viſid. eris ℥. j.

camph. ʒ. j. m.

Vel utuntur unguento à Petro Bayro deſcripto, ut

℥. Succ. extremis. rubi fruticis.

roſarum, .

acetis ana ℥. ij.

thuris,

maſticheſ ana ℥. iiij.

lithargyr. antri ℥. j.

vini maluatici ℥. vj.
succ. semperuiri ℥. iij.
aqua vita ℥. iv.
virid. aris ℥. ij. β.
virrioli,
alum. nstiana ℥. j. β.
camphora ℥. j.
ol. rosar. ℥. vj.

Pulverisati pulverisandis subtilissime, & vibratis coque omnia lento igne, ex-cepta camphora, qua in fine addatur, usque ad succorum consumptionem. Ad- datur cera & f. unguentum.

In ulcere penis curando præmittimus medicamentum purgans ex extracto sa: holo cum manna mercurij, vel pilu- lis de cerebinthina cum mercurio dulci, & postmodum decocta sudorifica, vel potiones vulnerarias ad aliquod tem- pus continuando. Interim si ulcus sit recens, conducit unguentum alium ex succis refrigerantibus, vel de tuta, pom- pholyge, lithargyrio, plumbo &c. Si fue- rit antiquum, vel lordidum unice pro- dest unguentum Magistrale n. d. Si aliqua luis veneræ suspicio adsit, con- venit mercurius dulcis pulvere tenuis, vel præcipitatus incarnatus, vel ma- gnum calcinatum Paracelsi unguento mistum, vel illud leviter aqua mercuri- ali tangatur. Si callum ob temporis diuturnitatem contraxerit, præter hæc utilis est aqua salis armoniaci, vel pul- vis ex sabina, sale armoniaco, virriolo, & alumine nsto. Si ulcus in glâde sit, vel sub præputio, quod ita in molem intum- escat, ut nullatenus præputium re- trocedere possit, & ulcus appropriatis remedijs tractari nequeat, tunc siphun- culo dextrè immittatur inter glandem, & præputium infuso lapidis calamina- ris, vel salinis & interim præputium foveatur spiritu vini, vel lacte, in quo

ebullierint folia hyoscyami, & aliquos papaveris capia, vel aqua spermatis sanarum. Vel secundum longitudi- nem præputium incidimus, & est via compendiatia. Si urethram excruciet ulcus ad unquam ardorem minuendum per os propinquamus syr. Dialth. Fernesij, & de mucilaginis cum oculis cancro- rum fluviatilis, in aqua mulvarum, negligantur fortia diuretica. Non des- sint interea injectiones ex lacte dulci, & recenti, addito sale Saturni. Sequens leniter detergit, & exsiccat ulcus ex mente Iohannis Dolai, ut.

℥. Aqua hord. ℥. ix.
plantag. ℥. j. β.
salis Saturni gr. xxv.
mell. ros. colat. ℥. j.
camphora gr. xii. m.

Fiat hujus misturæ bis in die injectio. Unice prodest spiritus mercurij dulcis in infusione lapidis calaminaris. Quan- tum in percipiendâ gonori hoc hæc in- jectiones valeant, experientia te doce- bit.

Egimus, de genitalium mulierum, ac virorum ulceribus, & eorum anatomen summis libavimus labijs; hinc non extra choræam erit aliquantulum circa horum organorum sensationem, quæ Veneris dicitur, digredi, nam omnes alias antecellit, huic omnes ancillantur, omnia obediunt membra, & cùm sensus iste suam exercet sensa- tionem, omnes alij seriantur, & post- victum omnia viventia pro hoc sensu- pugnant. Iupiter ipse Divum, ac homi- num pater, deposito majestatis deo- re, pro hujus sensus voluptate, non in- frequenter sub vatio animalium ami- culatuit. Quot viræ pericula subeunt homines pro hoc sensu, labores, & summas pauperiem, innumera mala, & ipsam

Ipſam cladem patiuntur; nec reſiſſunt, eſt reverà à Naturà illà ignorà Deà inditus appetitus. Ipſa bruta pro hoc dèmicant; aſinus, animal melancholicum hujus ſenſus percitus æſtuo, gratas modulatur melodias. Tandem muſca, dum nos veſcimur, noſtris in patinis hujus ætus exercent ſenſum.

C A P. L I.

De Veneris Senſu.

HUJUS rei occasione materiæ novam aggredimur rem pertractandam; cumque poſt cuiuſcumque organianatomem, ad aliqua ſenſationum quarumlibet de noſtro more digrediamur, operæ pretium exiſtimavimus nonnulla de hujus ſenſationis materiâ per digreſſionem delibare. Scimus rem, ſi penitus eruditorum auribus haud novam, vulgaribus tamen incognitam, aut huculque quod ſciverimus intractam; quapropter, ut ſcientiæ amatoribus viam ſternamus, atque physiologiſ, & magis philoſophandi, & quamplurima invenienti iter indigitemus, de Veneris Senſu hîc pertractabimus. De hac re quærimus: an inter alias ſenſationes ponenda ſit, & quare, ubi incidenter, quæ ejus naturam, & cognitionem ſapiunt phænomena exponemus.

Ut autem adverſariorum pravo per præventionem ſatiſfaciamus ingenio, noſtram mentem patefaciendam in cuiuſdam objectiõis ſolurione in hoc veſtibulo opportuno duximus.

Opponunt igitur veſanioreſ nonnulli: Hanc ſententiã ut potè Eccleſiæ Statutis obnoxiam, vel ut damnatam

eliminandam, vel ut morigeratiſ auri- bus diſſertim penitus obliterandam, eoque foras, Cadjiciunt alij) quia in puris naturalibus neque meremur, neque demeremur; cum itaque in ætibus ſenſationum merè naturalibus, præciſo omni voluptatiſ aſſenſu, nulum adſit aut meritum, aut demeritum, ut videre eſt in olfactu, guſtatu &c. ſit, ut aliquandò in huiuſmodi ſenſationis exercitio nulla habeatur malitia, quo circa tum Eccleſiæ ſtatuta, cum & Summorum Pontificum Maximorum damnationes tuerent in præcepta. Sed ut horum zelo faciamus ſatis.

Dicimus Eccleſiam Sanctam Catholicam, cujuſ filiationem proſitemur, nunquam aut per Decretum, aut per Concilia, Canones, Conſtitutiones, Bullas, Moruſ Pontific. Maximor. proprios, aliæque ejuſdem Acta Sanctiones &c. quæ nobis conſtiterint, declaraffe: Quinque tantum de fide tenendos eſſe corporis ſenſuſ, hiſque neque alioſ addendos, atque ab illis alioſ addendos non eſſe ſub aliquâ vel ex. omuni- cationis, vel interminationis divini judicii, & quacumque præ. à inſigi in hiſ caſibus ſolita; ſed tantummodo eadem Sancta Mater Eccleſia conformans ſe communiori populorum opinionioni, uſui, ac doctrinæ Peripateticorum, ac Stoicorum dogma amplexata eſt, in quo docent: Quinque eſſe corporis ſenſuſ, nempe: *Viſum, Audituſ, Guſtuſ, Oſſectuſ, & Taſtuſ*. Cum hoc tamen facultatem non b. tiliſ Physiologiſ, ut plures poſſint ſenſationes in humano corpore inveſtigare; Quod ſi fortè hoc etiam contra noſtram ſententiã aliquandò ſtabilierit, ejus deciſioni ex tunc pro tunc noſ ſub-

submittimus. Præterea eadem Sancta Mater Ecclesia extremæ unctionis Sacramentum pro infirmis ad remittenda peccata mortalia, quæ à sensibus originem ducunt, instituit, cum nihil sit in intellectu, quin prius fuerit sub sensibus; undè omnia quinque sensuum organa inungenda decrevit, & quia in lumbis, seu renibus vasa spermatica vicina irradiantur à sero acris, & salino, quod titillationem excitat ad Veneris stimulum, & desiderium proritandum. Hinc in extremæ unctionis administratione renes, seu lumbos (quæ inunctio in fœminis propter decentiam, & honestatem omittitur) tanquam Veneris sensum à quinque distinctum esse inungendos sub hac verborum formula instituit: *Per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quicquid per lumborum delectationem deliquisti. Amen.* Insuper quotidie precatur. *Vereigne sancti Spiritus renes nostros, & cor nostrum Domine: ut tibi casto corpore serviamus, & mundo corde placeamus.*

Circa ea, quæ opponunt, nempe hanc sententiam castis auribus obnoxiam, in sua genesis præfocandam.

Dicimus materiam de generatione animalium, anatomem uteri, naturæ mulierum, penis, geniturarum, ut dicunt, commissionem in generatione peragendam, seminis ejectionem in utero vel per suctionem, vel per jaculationem &c. magis, & quam maximè legentium, ac auditorum aures offendunt; neque ex hoc factum est, ut *Dottor Angelicus*, qui præ cæteris omnibus hanc de generatione materiam elucidiculus aut scripsit antea, aut docuit *Scotus*, torque alij Sanctissimi, atque

honestissimi Viri, Patresque aliquam commaculam, aut in aliquam irrepererint labem; satis enim longè distant theoreticè scribere, & in praxim cognita, ac philosophata deducere. Adhuc ad præsens innumerabiles medentes, atque Medicinæ studio addicti; sunt Indies ubique terrarum cadaverum dissectiones in publicis Academicis, nec non in privatorum ædibus Anatomiz, in quibus ea, quæ in scriptis, vel voce à præceptoribus didicerunt, re oculis, tactuque, ut ita dicamus, experiuntur, & ibi pudenda quælibet marium, fœmellarumque non quò ad extrinsecam tantum speciem, sed quò ad internas eorum partes, ac particulas offeruntur, non consideranda modò, verum etiam & videnda, & tangenda. Quid dicemus de honestissimo viro *P. Thomà Sanchez*? qui in suo aureo opere de Matrimonio, & præsertim ubi agit de usu Matrimonij, ita clarè de hac materiâ scribit, præcipuè cum modos exponit, remque ipsam matrimonij practici, ut in eo ad plura sæcula versatus videatur, licet in ore castissimus. Quid de Confessariis dicemus non solum in audiendis furtorum Veneris criminibus, verum etiam in eis interrogandis pro peccatorum circumstantiis sciendis, ut iustum de peccatis iudicium ferant, & sententiam dicant? Et tamen præter oppositores, nemo adhuc hæc omnia ut honestis auribus hominibusque obnoxia esse prædixit ex hoc capite.

Tādè quod attinet ad id, quod opponunt: nempe in puris naturalibus neque meremur, neque demeremur &c. fateamur optimè Sacri Theologi in hoc axiomate fuisse eloquutos; at in applicatione ejusdem sententiæ arguendos,

imo probris omnibus cumulandos esse advertarios sentimus; Quis enim in homine Venerea tanquam merè naturalia, & purè naturalia unquam somniiavit? Nonne inter omnes quum Theologos, tum etiam Doctores convenit in omnibus actibus meriti, & demeriti capacibus voluntatis electionem esse pernecessariam? Quis autem inficias ibit in omnibus Veneris suggestionem, delectationem, atque assensum intervenire ita à *Divo Gregorio Magno in lib. moral. requisita*, & in *Decret. Cap. pensandum est 6. dist. Tribus perficitur peccatum*? Cùm igitur nullus reperitur Veneris actus assensu voluntatis expertus, sit, ut merè naturalis non habeatur, quinimodò malitià sepe includatur, cùm à voluntate imperetur, præciso tantùm Sacramenti Matrimonij exercitio, quod à Christo Domino institutum, non solum malitiam excludit, labemque omnem eliminat, verum etiam ad gratiam conferendam elevatur.

His igitur præhabitis, rem nostram aggredimur. Si antiquorum consuliere volumus Philosophorum placita, uno excepto *Aristotele*, quem *Seneca* sequuti sunt cum vulgo Peripateticorum quinarium sensationum numerum definiētes, alij melioris notæ sapientiores multò plures sensus agnovēre, præsertim *Divinus ille Plato* qui in *Theæteto* præter vulgariū sensus: *Refrigerationes, calefactiones, voluptates, & dolores, cupiditates, & qui vocantur timores* pro sensibus agnovit, à *Dolissimo* forsan *Democrito* sententiam mutuatus, hic enim *Plutarcho teste in 4. de Placit. Philosophorum cap. 10. docuit Democritus plures esse sensus, brutorum, animalium, Deorum, sapientium*. Et sa-

nè, si horum maximorum Philosophorum opinionem in rutinam revocare velimus, a veritate non longè abesse comperiemus; & etenim calefactio, ac refrigeratio (sive quod harum altera in positione, altera in carentiā consistant, ut in nostrā Pyrotechniā lib. 2. cap. 1. & alibi tetigimus, sive quod ambæ politicæ sint) certum est per contactum, vel particulatum ab igne, vel alio corpore emanantium ad aliud corpus, vel per eatundem particulatum à corpore calefacto recessum, vel frigorificarum molecularum concussu in nobis inaptum, quibus per poros insinuat, vel motu induto, vel retardato, calidà, vel frigida sensatione afficiamur oportet. Hoc autem ad merum tactum redigere nimis insipidum foret, tum quia omnes alij sensus, licet per contactum perficiantur, ut in cujuslibet illorum tractatione explicemus, attamen ob aliam functionem à tactu prorsus diversam, quamvis à tactu originem capiens, diversam videmus constituisse sensationem, tum etiam quia tactus objectum, absolute loquendo, est corpus; hoc autem sub irradiati specie facit visionem, sub sapidi formā gustatum &c. Quapropter sub calidi, frigidi, lenis, asperi, molli, duri &c. alias etiam sensationes efficiant necesse erit. Ad hæc ab omni prorsus dubitatione alienum est, non sensus quoscumque tantum, verum etiam, & int. lectum nostrum, licet spiritualem, utpotè limitatum, non posse eodem temporis momento duā diversa penitus considerare, undè multò minus visum v. g. duō diversa contingere, ut album, & nigrum, & sic de cæteris: cùm igitur animadvertamus in eodem contactu non solum corpus

sentiri verum etiam calidum, aut frigidum, molle, vel durum, grave, aut, leve &c. illud sit, operæ pretium duximus asserendum quam maximè interesse inrer eam sensationem, qua corpus contingimus, & eas, quibus calidum, frigidum, leve, ponderosum, molle, durum &c. per sentimus. Præterimus famem, nauseamque stomachi, dolores, & in nonnullis corporum partibus titillationes, quæ omnia, præter alia sensus esse neminem sanæ mentis præterit.

Sed ut radicitus, ut dicunt, rem persequeremur, sensationum omnium naturam ex quatuor solent Physici, seu Animalistici investigare, nempe ex fine, ex organo, & objecto, & ex sensotij functione, quam propriè sensationem appellant; cum itaque hæc omnia in Veneris exercitio elucescant, jure merito inrer sensationes alias reducendum esse Veneris sensum existimamus; & ut à fine initium capiamus.

Apud omnes est in confesso D. O. M. totius Universi Archetypum, omniumque creaturatum Protoplastum, post omnium creationem ex nihilo, Adæ, ejusque successoribus assignato omnium rerum dominio, ut *Genes. cap. 1.* habetur: *Dominamini piscibus maris, & volatilibus cæli, & univrsis animalantibus, quæ moventur super terram.* Modum eis præbuit utilia eliciendi, ac noxia rejiciendi per sensationes; & quoniam ex ijs, quæ utilia humano generi sunt, nonnulla vitæ commoditatibus, quam plurima individuorum conservationi, ac etiam propagationi conducunt; ideo omnia prospiciens Creator omnium Deus, suæ Divinitatis Typo, hujusmodi sc. sensus externos, internosque contulit, quo-

rum illis mens nostra excitata, & meliora teligat ad corporis commoditatem, vitæque conservationem, blandumque sensuum huiusque oblectamentum, & nocua, ingrataque avertat; sic licet omnia comestibilia ad vitæ conservationem utilia expectantur, attamen prudentior animus ex eduliorum congerie ea sole eligeat, quæ non modo conservationem intendunt, & sensibus alijs gratiora prospiciuntur, & in unâ eadē nque operatione, & vitæ conservationi, & sensuum oblectamento faciunt salus.

Cum igitur per enarrata vitæ sustentationi subventum sit, placuit Altissimo ea etiam disponere, quæ ad generis propagationē facere animadvertimus, quapropter hominibus Veneris usum concessit, quo non solum allicerentur suimet ipsius perpetuati consulendo, sed ab hujus exercitij oblectamento absortus, & ne gravis si uxoris pondus videretur, blanditiam in coitu impertitus est tantam, ut aliquandò suimet, parentum, fratrum, sororum, amicorumque oblitus, ea solum intendat, quæ matrimonij usum comitantur, juxta illud *Genes. cap. 2. num. 24. Quamobrem relinquet homo patrem suum, & matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne unâ. Quia cum ea per copulam una caro fit. Quæ omnia ita cum veritate copulantur, ut ab ineffabili Ecclesia statutum sit: Matrimonij finem primarium esse filiorum procreationem intendere, secundarium vero concupiscentiæ solamen; quia verò ab aliarum sensuum exercitio hujusmodi filiorum generatio haberi non potest, nec aliud adest organum, modusque alius non apparet talia peragendi; ideo asse-*

rendū putamus ratione si nis, quem, alio ex capite obtinere minimè valemus, Veneris delectationem sensum esse ab omnibus omninò diversum constitutum.

Præterea apud omnes etiam vulgares convenit: In quolibet sensu duos fines dignoscendos esse, quorum alter sit primarius, pro quo est à Naturâ institutus, alter verò secundarius consistens in solatio illo, quod à sensû usu percipitur; sic in Gûstau v. g. primarius est finis ea libare, quæ ad vitæ conservationem conducunt; secundarius verò solamen persensiscere ex eduliorum blando sapore, Auditûs finis primarius est sonum advertere, secundarius à soni harmoniâ blandimentum recipere, ut in musicis melodijs observamus, & ità de alijs est sermoninandum. Cùm ergo in Veneris usu, & eum animadvertamus finem, pro quo primò à Naturâ intentus est, nempe filiorum procreatio, & illum, qui sensationem comitatur, nempe delectatio, sit, ut ex finium ratione, eorumque diversitate ab alijs sensationibus, Veneris Sensus diversus constitutur; Sed ex organi designatione hunc sensum designamus.

Constat apud omnes ex penis anasome hunc esse instrumentum, non modò ab alijs penitus diversum, sed à Naturâ propriè ad hanc sensationem principaliter perficiendam destinatum, secundariò ad urinam excernendam. Dicemus cùm de alijs organis, atque sensuum instrumentis mentionem faciemus, non solùm contactu, verùm etiam in pelliculâ quadam fibrosâ, inque papillis, nervorumque fibris omnes sensationes institui; Ecquis unquam inficiari ite poterit penis glan-

dem, urethram, ejusque connexionem cum vasu pampiniformibus, & spermaticis merè tantùm membranulâ constitutos esse? Cumque ad tactûs organum per totum corpus diffusum natura cutem destinaverit, ad gustatum verò, odoratum, auditumque aut cuticulam aut nervos, sicuti videmus in pene, cur itàque dicendum non erit hunc quoque pro instrumento, sensorioque ab alijs penitus diverso à naturâ fuisse institutum?

Præterea videmus omnes alios sensus externos non influere tantùm, verùm etiam & famulatum quandam huic Veneris sensationi exhibere, sicut etiam & quos dicunt internos; etenim si oculus v. g. alicujus objecti pulchrioris irradiatione percellitur, transmissio ad imaginativam, sensusque alios internos (si qui sunt) rei visû idolo, ad animum usque diffundit, qui conceptionem imaginem non intelligit solùm, appetitque; sed per quandam, ut ità dicamus, sympathiam spiritus coagitat, dirigitque ità, ut ad penem usque traducti pruritum, & vellicationem in eodem incutiant; Quapropter satis bellè Magister amorum, *Ovidius* cecinit.

Si nescis, oculi sunt in amore duces.

Eodem proportionaliter modo de alijs etiam sensationibus est discurrendum; Hæc autem veritatem involuunt tantam, ut eam prævidens, intelligensque provida Mater, atque sollicita nostræ salutis Ecclesia declaraverit: Omnes actus sive antecedant, sive comitentur, sive subsequantur copulam Veneream, omnimodâ remotâ materiæ paruitate, esse penitus lethalia.

His adde, quod tamen si insinuerimus molle, durum, calidum, frigidum,

dum, asperum &c. sensationes esse admittendas à simplici contactu omnino diversas, atamen in Veneris exercitio, (prout hæc sensatio alias omnes absorbet) hæc omnia ad copulæ perfectionem concurrere animadvertimus; Quis enim in hujusmodi actu ex duro, aut molli contactu pruriginem, seu excitationem, ex calido, aut frigido intensionem, seu remissionem, ex aspero, aut lævigato irritationem (uxoris consulis) non percipit?

Sed potissimam rationem in medium proferamus: Apud omnes etiam vulgares est in comperto tactus organum per totam cutem esse diffusum; cum enim per eam papillule ab illustrissimo *Malpighio* notatæ animadvertantur, in quibus tactus perficitur, licet exquisitius in manibus, sit, ut per totam corporis peripheriam tactus organum extendatur, id, quod, clariùs evincitur, si consideremus à frigido, aut calido, ab aspero, aut leni, à duro, aut molli, ab humido, aut sicco &c. quæ à vulgaribus simplici tactui tribuantur, quascumque corporis partes affici; si ergo Veneris sensatio ad merum tactum esset reducenda, fieret, ut per totam cutem, ac per quascumque partes peripheriæ corporis perentisceretur, quod repugnat autoplæ, experientiz, & rationi, cum contrà experiamur in solo pene, & in designatis ejus partibus inferiùs explicandis, hanc sensationem compleri, non alio prorsus modo, ac visio in oculo, olfactus in naribus gustus, in lingua, & palato, & auditus in auribus, tanquam in specificis organis à naturâ, ad illos actus peragendos, designatis. Præterquam quod nimis frigida hujusmodi esset sensatio, si in solo tactu consistere-

ret, cum etiam observemus contactum esse medium, quo ad Veneris copulam perveniunt, eandem copulam in praxim deducentes. Ex quibus clarè convincitur hujusmodi sensationem malè à vulgo, ad tactus sensum fuisse hucusque redactam.

U: autem de objecto aliqua loquamur; certum est apud omnes Pulchrum, aut reverea tale, aut apparens, objectum esse movens, seu excitans Venerem, quatenus rei visæ, auditæ, contactæ &c. imago ita imaginativam afficit, omnique alios, quos internos sensus appellant, ut ad anum usque percutiens illum de re visâ, auditâ, contactâ &c. admoneat, quâ cognitâ, præterquam desiderio quodam percellitur juxta impressionem à sensibus immisam aut maximo, aut minimo, aut mediocri objectu excipendi, quoniam media etiam elicit, disponitque ad finem obtinendum proportionata, sed insuper à frustionis illecebris agitatus spiritus immittit ad genitalia, qui musculos erectorios pruritando, vasque spermaticum inflando mediâ seminis, salisque in spermate contentâ excitatione, & penis erectionem, & seminis jaculationem moluntur; Unde fit, ut his affectibus exagitatum animal, & animi inquietudinem, & corporis inquietudinem patiatur, quatenus à rei apprehensæ, & amatæ desiderio continuò vexatur, ut in ejus aut continuâ contemplatione persistat; Unde *D. August.* stabilierit: *Amansio animam pluisse, ubi amat, quam ubi amat;* aut perpetuâ possessione læteretur, cum rei desideratæ perceptio maximum hilaritatis, gaudij, lætitiæque obtenti elargiatur, aut carentiâ vel minimâ cruciatur, cum rei amatæ privatio-

ita orbatum exquisitius exagitet, sicut ejusdem fructum naturalem beatitudinem imperitur, juxta illud *Petri C. Bembi.*

*Se più dyasse l'uomo in tale stato,
Perfettamento si d'ora beato.*

Corporis verò, quatenus à sensibus alijs, & maxime à Venere torqueatur, & ab animi affectibus angatur; vilis enim in rei delectatione tantum observatione immergi, tactus in ejusdem contractione absorberi, auditus in perfectionum objecti sermone detineri, gustatus in ejusdem suavi deosculatone præfigi non exoptant modò, verùm etiam omnibus viribus aveant, deliderentque.

His insuper addendum pro objecto, quod dicunt proximum hujus sensationis, fructum nempe scilicet, vel alià expertam, vel primò intentam, quam maxime in hunc affectum impellere; Imago enim præhabita, vel primò obtinendæ delectationis si à phantasiam afficit, aliosque, si qui sunt, sensus interios, ut ab eadem illecti animum regulariter perturbent, qui à concupiscentiâ (ut verbis *Apostoli Jacobi* utamur) abstractus, & illectus, rectæ rationis obliuiscitur, & in sensuum delectatione absorbitur fructum concipit, possessionem elicit rei, expetit, machinatur. Unde tot errores, tot mala, & quod pessimum, tot peccata proveniunt.

Sed ad sensorij functionem, quæ propriè sensorio dicitur, transitum faciamus. Uti superius insinuavimus, præsupponendum ducimus omnes alios sensus tum externos, tum internos in Venerem influxum facere, dum visus in objecti amati pulchritudine, gustus in ejusdem dulcedine, auditus

in illius harmoniz representatione, olfactus in ipsius putido odore, tactusque in contractione, ac interni sensus in rei idolo immergi fluunt, & stuantque; Ex quo fit, ut spiritus, quos nuncupant animales ab omnium facultatum discrasia perturbati, & cerebri quandoque exagitant, unde aliquandò Mania, phrenitis, aliæque mala proveniant, & cor aggrediantur, cujus regularem motum deordinando, aut palpitum, aut liporhymiam, aut alios producant morbos, & in sanguinem se immittendo, vel novam fermentationem promovendo, febres generantur, vel heterogeneas sanguinis particulas excitando, & spirituosas exaltando, quamplurimum affectuum malignorum illadem congerunt, coelevant, agglomerantque (Heu quanta malorum pessimorum congeries ab unâ concupiscentiâ scaturiginem sortitur!) Et genitalia pruritando, valaque seminalia irascendo, partem spermatis volatilem, salivamque ad sui extricationem irritant; quamobrem particulas quædam per eorum vasorum poros avolando, vel in musculos incurrunt electorios, & majorem illis erigendi egergiâ communicant, suâque gratâ, blandâque vellicatione delectationis Veneris radium quandam immittunt; aut ob earundem tenuitatem granum hori deaceum aliquantisper removendo, anam præbent fluidiori, minusque viscidæ spermatis particule in urethram decidendi, unde seminis guttula suo volatili sale scærens membranam urethre internam, glandemque quodammodò pruritans, minimulæ speciem delectationis in ejusdem papillulas insinuat, quæ papillæ nervorum

rum, filamenta, nervique ipsi effecti, & ad cerebrum illam transfundunt, & imaginativæ repræsentant, & mentem ejusdem rei advententem satius quàm pascit, non expergiscunt solum, verùm etiam stimulant, impellantque. Quapropter à delectationis complemento abortita, Veneremque tantummodo afficiens, ejusdem exercitium appetit, satagit, tandemque periclitatur. In hac autem operatione tantus, & adeò inordinatus est corporis æstus, totque observantur, non solum motuum varietates, sed convulsionum, motuumque convulsivorum in corpore affectus, ut non immeritò pronuntiaverit Hippocrates, Coitum brevem esse epilepsiam, prout refert Macrobius in lib. Saturnal. necnon Aul. Gell. noct. Atticarum lib. 19. cap. 2. quod etiam Fauselus hoc disticho perbelles canendo explicavit.

Turpis, & est morbi species horrenda Caducis,

Cum jacet exanimis post sua furta Venus.

Ut prætereamus Stobeum hanc sententiam Maximo Democrito tribuentem; neque ab hoc dissinit Gal. qui lib. 14. cap. 10. de usu partium: *Quantum enim ad ea, que in vasis continentur, excernenda, ipse partium velut Spasmodus, qui non coitu Venereo accidit, habeat momenti, ex magnis epilepsijs, & eo affectum, qui gonorrhœa, id est invia seminis effluxio, nuncupatur, differt. Siquidem in vehementibus epilepsijs, quod corpus totum vehementer convellatur, & cum eo partes genitales, semen indecidit excernitur. Quod etiam approbavit Carl. Aurelianus lib. 1. cap. 4. asserens: Coitus ab aliquibus parva epilepsia nuncupatur. Nec immeritò cum in eodem actu membrorum omnium mo-*

tus involuntarij observentur, nervorum contractio, artuum tremor, oculorum inversio, lumborum impulsus, percutem sudor, totiusque corporis laxitas haud immodica &c. quæ omnia symptomata sunt epilepsiam concomitantia.

Probatà igitur ex quolibet quatuor capitulò, nempe à fine, ab objecto, ab organo, & à sensorij functione Venereæ sensationis existentia, ac veritate, ad ea deveniendum existimamus, quæ hujus rei ratio, phænomena, secum affert; pro quibus,

Primò quærimus, in qua hujus organi parte sensatio hæc perficiatur.

Pro cuius quæstiti extricatione dicendum arbitramur totum hujus sensationis momentum à sale volatili in spermatis substantiâ stabulante, haberi: Hoc enim à spiritibus immixtis agitatam, à motu, in Veneris actu exaggerato, sollicitatum, atque è partium inter se confusione, necnon à spiritibus, aliisque particulis ad motum extricationis impulsu in tantam exaltatur energiam, ut loco stare nesciens, sua perniciousitate è vasorum spermathecorum, ac vesicularum seminalium officijs, totam secum spermatis substantiam trahendo, in urethram immittit sese, ibique aliquam à viscidâ seminis substantia extricationem nanciscens, membranulam urethræ internam pruritans post granum hordeaceum irâ blandissimè afficit, ut supra omnem delectationem maximam jucunditatem imperiatur, & quoniam per eandem urethram fluens, eandemque membranulam offendens usque ad glandis officium extremum & tangit, & vellicat, prurit atque idcirco fit, ut per totam urethram sensatio diffundatur; Quia

verò cum in uteræ radice, cum in glâ-
de, ibi ob primam seminis à seminali-
bus vesiculis jaculationem sal volatilis
in ejusdem porosos se insinuans sua-
vissimè prurit; hic ob eorundem po-
rorum laxitatem non solum à motu, &
à calido contactu, ac calorificis parti-
culis receptis quæsitur, sed à sui rem-
perie, ac constitutione veluti spongio-
sâ inductam, sal volatilis insinuat se se
in majorem porionem, ubi vel quia
magis se conformat glandis poris, vel
quia magis repleto saturat, majori
afficit pruriginis blanditiæ, idèd majus
fititur oblectamentum. Diximus ob
majorem laxitatem à motu, contactu
calido, ac particulis calorificis recep-
tis; etenim hæc omnia majorem in
glande, quàm in reliquâ penis parte
impressionem efficiunt, cum glans sim-
plici epidermide, penis verò & cute,
& cuticula convestiantur.

Et quoniam, ut explicuimus, cutis,
nervorumque papillæ, fibræque ure-
thram convestientes, penemque con-
stituantes cum nervis communicant,
fit, ut ad cerebrum usque suam, pruri-
ginem, blandumque contactum dis-
fundant, ex quibus animus, experge-
factus, omnia advertat, lætetur atque
eodem oblectamento satietur.

Quærimus secundo, in quam Vul-
væ parte Veneris sensatio in mulie-
ribus perficiatur?

In hac difficultate respondendum
putamus: Organum hujus sensationis
in seminis constitutum esse, & in ten-
tigne, mentulâ muliebri, seu Clitori-
de, & in cervice, seu colli uteri ad in-
ternum matricis orificium usque; ibi
enim à confricatione magna diffundit
mulieribus oblectatio; hîc ab vul-
gò dicti seminis, salisque in eodem vo-

latilis contenti emissionem; quatenus
eodem, ac in viris modo uteri mem-
branulam anteriorem prurit; &

Hinc fit, ut quæ strictiorem ha-
beat sænitæ naturam, collumque
uteri obductius majorem perferant
ex penis immisione, ac proportionem
juconditatem; Undè etiam oritur, ut
majori afficiantur blanditiæ utero ge-
rentes, quàm vacuæ mulieres; etenim
in illis quò magis uterus ob foris re-
ceptaculum dilatatur, eò magis matri-
cis collum restringitur, quare magis
cum pene aptatur, atque ab ejus con-
fricatione vellicatur. Undè etiam ac-
cidit, ut aliquando penis glandem ab
utero complexi, constringique in coë-
undo animadvertant viri; nam perve-
niens glans in internum uteri orifi-
cium, ita interdum cum eo apratur, ut
ferè constringi, ac complexi videatur;
&

Hinc ultimò fit, ut prope seminis ejaculationem, & magis dilatent crura
mulieres, majorique ac antea impetu,
contra virum impellant sese, virique
nares constriquantur biachijs, manibus-
que; in eo enim actu penis conta-
ctum prope internum uteri orificium
exoprant, ut eo irritatæ vesiculæ dictæ
seminales, promptiores ad materiam
illam, vulgò semen dictam, ejaculan-
dam evadant.

Cæterum hîc sextum sensum, quem
Veneris appellamus, illum monemus,
ac protestamur intelligere, qui modo
legitimo, & divinis legibus, mediante
matrimonij Sacramento, concessio
exercetur; & non aliter.

de vitis etiam observatur, ut quispiam in se sano vel aegroto experiri potest.

Huc Scrotum multis langoribus obnoxium est, sed nos hic tantum secundum nostrum institutum de ejus ex coriatione, & ulcere agimus.

CAP. LII.

De Excoriatione, & Ulcere Scroti.

Signa.

Scrotum est rugosus ille testiculo-
rum sacculus, quem nonnulli etiam
Scortum appellant, quod quandam
coreacei sacculi similitudinem refert;
Scortea enim veteres appellabant quæ-
cumque ex alutâ, aut pelle constab-
bant. Dicitur etiam vulgò bursa, seu
marsupium virile foris propendens, &
tactui obvium est. Molle, & rugo-
sum ad facilitatem extensionem, & cor-
rugationem, inter scroti tunicas nulla
interjicitur pinguedo, quia oneri, &
impedimento huic parti fuisset. In in-
fima parte lineam habet secundum lon-
gitudinem excurrentem, quæ in dex-
tram, & sinistram partem ab Anatomicis
dividitur, & futuram appellant. Constat
cuticulâ & cute tenuiore, quàm alibi,
huic interiori adhæret alia tunica tenuis
ex panniculo carnoso enata, venis, & arterijs referta. Con-
stat musculo corrugante tenuiori, Dar-
tos appellata. Hujus musculi ope ac-
cidit, ut quam promptissimè scrotum cor-
rugetur, vel relaxetur; undè facillè red-
ditur ratio, cur in ægrotantibus infan-
tibus relaxetur, & in sanis corrugetur:
mulierculæ enim cum Scrotum corruga-
tum conspiciunt, rectè valere, contra-
rè verò si relaxatum propendear, in-
fantem ægrotare judicant, quod, &

D. Caroli Menstrani Tom. II.

Scroti excoriatio deprehenditur ex
dolore urente, cuticulæ ablatione, vel
erosione, & aspectu patet. Ulcus
visui occurrit, adeo ut alijs non indi-
geat signis.

Causa.

Consent vulgares excoriationis scro-
ti causas esse humores acres urinam in
ipsis infantibus partem hanc diutius
inundantem, & cuticulam erodentem;
in adultis eandem causam, si urinam
in lecto emittant; in hydropicis serum,
vapores, & impuritates acres circa
scrotum collectos, vel scalptionem, à
quibus epidermis dilaceratur. Ejusdem
ulcus ab humorum acrimia affluxu, vel
post inflammationem suppuratam, &
quidè vel solam, vel cum testibus
excitari volunt.

Excoriatio, & ulcus scroti sunt à
particulis acidis, & salsis valde acutis,
& corrosivis in lymphâ, sanguine, vel
succo alimentitio circulantibus, vel sta-
gnantibus superficiem lacerantibus
vel profè hinc fibras erodentibus, fiunt
etiam à fortiori scalptione, frictione,

gens extracta, tamarindis, sebesten, electuario catholico cum syrupo rosarum solutivum ad ℥. j. in formā boli. deinde venæ sectione; postmodum victus rationem eam instituunt, quæ humoris acrimoniam obtundit, & decocta ad sudorem excitandum suadent, ut ulcera exsiccantur, additis trochiscis *alkakengi*. Tandem ad topica confugiunt.

Si sit recens cum quadam calefactione, illud leviter detergunt, & refrigerant, capropter *aquam plantaginis, solari, nymphae, aut decoctum hordei cum syrupo de rosis laxativo, sero Lactis* usurpant, adduntq; trochiscos *albos Rhasis, vel alkakengi, vel lithargyrii* decoctum iniiciunt, vel unguentum *porropholigos cum ovi albumine, & aquâ hordei, vel sero lactis.* Renibus refrigerantia imponunt, ut urinæ ardor minuatur, ut *unguentum album, Galeni, santalatum, album Rhasis,* & quæ ex oleis frigidis leviter adstringentibus parantur: sed perperam renibus refrigerantia applicant ad urinæ ardorem minuendum; urina enim extrinseco imperanti non audit, ardorem excitat ejus sal in transitu, quem per exulceratam urethram facit, & vesicam, & urethram sanam non lædit, cum sit naturale harum partium excrementum.

Si glans exulcerata fuerit, vitant emollientia, & exsiccantia adhibent. In principio itaque ulcus mundant *aquâ rosarum, & plantaginis, vel hydromelisse, vel aquâ, in qua alumen dissolutum sit,* deinde vino, in quo *folia rubi, myrti, plantaginis, nuc. cupress. balanif. & alumen colla sint,* in quo panni linei imbuti glandi imponantur, & præputium semper mundant. Post-

modum usurpant *unguentum album camphoratum, diapompholygos, de rutiâ, Lithargyrio, cerussa &c.*

Ulcera antiqua, fordida, & putrida ablunt *hydromelisse cum alumine, vel unguento Egyptiaco, vel Apostolorum cum lixivio, vel auripigmento, in aquâ rosarum soluto,* ne amplius serpent.

In ulcere vitulento præcipitato cum unguento rosaceo misceantur, & præcipue si à lue venerea ortum ducat, & huic insistant, donec vitulentia ablata est. Si callosum sit, partem foveat decocto *malva, alth. sem. lini, vel medicamento digestivo,* donec callositas separetur. Quid si præputium intumescat, & ulcus sub ipso latens, medicamentis tractari nequeat, dolor perseveret, & ulcus serpat, præputium secundum longitudinem incidunt, ut ulcus mundificari, & commodè curari possit.

Si ulcus in penis meatu delitescat, abstergentia, & glutinantia per sytynam injiciunt, nimirum *aquam plantag. equiseti, myrtill. vel harum plantarum succos, vel trochiscos alkakengi cum aquâ rosarum, vel sequenti utuntur.*

℥. Vini alb. lib. j.

aqua rosar. &

plantag. ana ℥. iij.

alum. nsti ℥. ij. B.

virid. eris ℥. j.

camph. ʒ. j. m.

Vel utuntur unguento à Petro Bayro descripto, ut

℥. Succ. extremis. rubi fruticis.

rosarum, .

aceti ana ℥. ij.

shuris,

massiches ana ℥. iij.

lithargyr. antri ℥. j.

vinī malvasici ʒ. vj.
succ. semperuvivi ʒ. iij.
aqua vita ʒ. iv.
virid. aris ʒ. ij. ʒ.
viriolū,
alum. ustri ana ʒ. j. ʒ.
camphora ʒ. j.
ol. rosar. ʒ. vj.

Pulverisati pulverisandis subtilissimè,
 & vibratis coque omnia lento igne, ex-
 cepta camphora, qua in fine addatur,
 usque ad succorum consumptionem. Ad-
 datur cera & f. unguentum.

In ulcere penis curando præmittimus
 medicamentum purgans ex extracto
 catholico cum manna mercurij, vel pilu-
 lis de terebinthinâ cum mercurio dulci,
 & postmodum decocta sudorifica, vel
 portiones vulnerarias ad aliquod tem-
 pus continuando. Interim si ulcus sit
 recens, conducit unguentum alium ex
 succis refrigerantibus, vel de tutiâ, pom-
 pholyge, lithargyrio, plumbo &c. Si fac-
 tur antiquum, vel sordidum unice pro-
 dest unguentum Magistrale n. d. Si
 aliqua luis venereæ suspicio adsit, con-
 venit mercurius dulcis pulvere tenui,
 vel precipitatus incarnatus, vel ma-
 gnum calcinatus Paracelsi in quanto
 mistum, vel illud leviter aqua mercuri-
 alit tangatur. Si callum ob temporis
 diuturnitatem contraxerit, præter hæc
 utilis est aqua salis armoniaci, vel pul-
 vis ex sabina, sale armoniaco, vitriolo,
 & alumine uso. Si ulcus in glâde sit, vel
 sub præputio, quod ita in molem intum-
 mescat, ut pullatenus præputium re-
 trocedere possit, & ulcus appropriatis
 remedijs tractari nequeat, tunc siphun-
 culo dextrè immittatur inter glandem,
 & præputium infuso lapidis calaminari-
 is, vel salinis & interim præputium
 foveatur spiritus vini, vel lacte, in quo

bullierint folia hyoscyami, & aliquos
 papaveris capita, vel aqua spermatis
 ranarum. Vel secundum longitudi-
 nem præputium incidimus, & est via
 compendiaria. Si urethram excruciet
 ulcus ad urinæ ardorem minuendum
 per os propinquamus hîr. Dialth. Fernelij,
 & de mucilaginis cum oculis cancro-
 rum fluviatilis, in aqua malvarum,
 negligantur fortia diuretica. Non des-
 sint intereâ iniectiones ex lacte dulci,
 & recenti, addito sale Saturni. Sequens
 leniter derergit, & exsiccat ulcus ex
 mente Johannis Dolai, ut.

℞. Aqua hord. ʒ. ix.
 plantag. ʒ. i. ʒ.
 salis Saturni gr. xxv.
 mell. ros. colat. ʒ. j.
 camphora gr. xii. m.

Fiat hujus misturæ bis in die iniectio.
 Unice prodest spiritus mercurij dulcis
 in infusione lapidis calaminariis. Quan-
 tum in pectendâ gonori hoc hæz in-
 jectiones valeant, experientia te doce-
 bit.

Egimus, de genitalium mulierum, ac
 visorum ulceribus, & eorum anatomo-
 men summis libavimus labijs; hinc
 non extra choræam erit aliquantulum
 circa horum organorum sensationem,
 quæ Veneris dicitur, digredi, nam
 omnes alias antecellit, huic omnes
 ancillantur, omnia obediunt membra,
 & cum sensus iste suam exercet sensa-
 tionem, omnes alij feriantur, & post
 victum omnia viventia pro hoc sensu
 pugnant. Iupiter ipse Divum, ac homi-
 num pater, deposito majestatis deo-
 re, pro hujus sensus voluptate, non in-
 frequenter sub vario animalium ami-
 cu latuit. Quot vitæ pericula subeunt
 homines pro hoc sensu, labores, &
 summas pauperiem, innumera mala, &
 ipsam.

ipsam cladem patiuntur, nec respiciunt, est reverà à Natura illà ignotà Deà inditus appetitus. Ipsa bruta pro hoc dimittunt; asinus, animal melancholicum hujus sensus percitus aestro, grãas modulatur melodiã. Tandem musca, dùm nos vespimur, nostris in patinã hujus actus exercent sensum.

CAP. LI.

De Veneris Sensu.

HUJUS rei occasione materiz novam aggredimur rem pertractandam; cumque post cujuscumque organianatomem, ad aliqua sensationum quarumlibet de nostro more digrediamur, operæ pretium existimavimus nonnulla de hujus sensationis materiã per digressionem delibare. Scimus rem, si penitus eruditorum auribus haud novam, vulgaribus tamen incognitam, aut hucusque quod sciverimus intactam; quapropter, ut scientiã amatoribus viam sternamus, atque physiologis, & magis philosophandi, & quamplurima inveniedi iter indigremus, de Veneris Sensu hãc pertractabimus. De hac re querimus: an inter alias sensationes ponenda sit, & quare, ubi incidenter, quæ ejus naturam, & cognitionem sapiunt phænomena exponemus.

Ut autem adversariorum pravo per preventionem satisciamus ingenio, nostram mentem parestaciendam in cujusdam objectionis solutione in hoc vestibulo opportunum duximus.

Opponunt igitur vesaniore nonnulli: Hanc sententiam ut potè Ecclesiæ Statutis obnoxiam, vel ut damnatam

eliminandam, vel ut mitigatis auribus differtem penitus obliterandam, eoque fortius, Cadjiciunt alij) quia in puris naturalibus neque meretur, neque demeretur; cùm itaque in actibus sensationum merè naturalibus, preciso omni voluptatis assensu, nullum adit aut meritum, aut demeritum, ut videre est in olfactu, gustatu &c. sit, ut aliquandò in hujusmodi sensationis exercitio nulla habeatur malitia, quo circa tum Ecclesiæ statuta, cùm & Summotum Pontificum Maximorum damnationes ruerent in præcepta. Sed ut horum zelo faciamus satis.

Dicimus Ecclesiã Sanctam Catholicam, cujus filiationem profitemur, nunquàm aut per Decretum, aut per Concilia, Canones, Constitutiones, Bullas, Morus Pontif. Maximor. proprios, aliæque ejusdem Acta Sanctiones &c. quæ nobis constiterint, declarasse: Quinque tantùm de fide tenendos esse corporis sensus, hisque neque alios addendos, atque ab illis alios demendos non esse sub aliquã vel ex omuni-cationis, vel interminationis divini judicij, & quacumque pœ. à infligi in his casibus solita; sed tantummodo eadem Sancta Mater Ecclesiã conformans se communiore populorum opinionioni, usui, ac doctrinæ Peripateticorum, ac Stoicorum dogma amplexata est, in quo docent: Quinque esse corporis sensus, nempe *Visum, Auditum, Gustum, Olfactum, & Tactum*. Cum hoc tamen facultatem non bulic Physiologis, ut plures possint sensationes in humano corpore investigare; Quodd si fortè hoc etiam contra nostram sententiam aliquandò stabilièrit, ejus decisione ex tunc pro tunc nos

sub.

submitimus. Præterea eadem Sancta Mater Ecclesia extremæ unctionis Sacramentum pro infirmis ad remittenda peccata mortalia, quæ à sensibus originem ducunt, instituit, cum nihil sit in intellectu, quin prius fuerit sub sensibus; undè omnia quinque sensuum organa inungenda decrevit, & quia in lumbis, seu renibus vasa spermatica vicina irradiantur à sero acri, & salino, quod stimulationem excitat ad Veneris stimulum, & desiderium proritandum. Hinc in extremæ unctionis administratione renes, seu lumbos (quæ unctio in feminis propter decentiam, & honestatem omittitur) tanquam Veneris sensum à quinque distinctum esse inungendos sub hac verborum formula instituit: *Per istam sanctam unctionem, & suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quicquid per lumborum delectationem deliquisti. Amen.* Insuper quotidie precatur. *Reigne sancti Spiritus renes nostros, & cor nostrum Domine: ut tibi casto corpore serviamus, & mundo corde placeamus.*

Circa ea, quæ opponunt, nempe hanc secentiam castis auribus obnoxiam, in sua genesis præfocandam.

Dicimus materiam de generatione animalium, anatomem uteri, naturæ mulierum, penis, geniturarum, ut dicunt, commissionem in generatione peragenda, seminis ejectionem in utero vel per suctionem, vel per jaculationem &c. magis, & quam maxime legentium, ac auditorum aures offendunt; neque ex hoc factum est, ut *Dollor Angelicus*, qui præ cæteris omnibus hanc de generatione materiam dilucidius aut scripsit antea, aut docuit *Securus*, totque alij Sanctissimi, atque

honestissimi Viri, Patresque aliquam commaculam, aut in aliquam irrepleverint labem; satis enim longè distant theoreticè scribere, & in praxim cognita, ac philosophata deducere. Adhuc ad præsens innumerabiles medentes, atque Medicinæ studio addicti; sunt Indies ubique terrarum cadaverum dissectiones in publicis Academijs, nec non in privatorum ædibus Anatomiz, in quibus, ea, quæ in scriptis, vel voce à præceptoribus didicerunt, re oculis, tactuque, ut ità dicamus, experiuntur, & ibi pudenda quælibet marium, scællarumque non quò ad extrinsecam tantum speciem, sed quò ad internas eorum partes, ac particulas offeruntur, non consideranda modò, verum etiam & videnda, & tangenda. Quid dicemus de honestissimo viro *P. Thomà Sanchez*? qui in suo aureo opere de Matrimonio, & præfertim ubi agit de usu Matrimonij, ità clarè de hac materiâ scribit, præcipuè cum modos exponit, remque ipsam matrimonij practici, ut in eo ad plura sæcula versatus videatur, licet in ore castissimus. Quid de Confessarijs dicemus non solum in audiendis furtorum Veneris criminibus, verum etiam in eis interrogandis pro peccatorum circumstantijs sciendis, ut iustum de peccatis iudicium fetant, & sententiam dicant? Et tamen præter oppositores, nemo adhuc hæc omnia ut honestis auribus hominibusque obnoxia esse prædixit ex hoc capite.

Tādè quod attinet ad id, quod opponunt: nempe in puris naturalibus neque meremur, neque demeremur &c. fateamur optimè Sac. Theolog. in hoc axioma fuisse eloquos; at in applicatione ejusdem sententiæ arguendos,

imo probis omnibus cumulandos esse advertatis sentimus; Quis enim in homine Venerea tanquam merè naturalia, & purè naturalia unquam somniavit? Nonnè inter omnes quum Theologos, tum etiam Doctores convenit in omnibus actibus meriti, & demeriti capacibus voluntatis electio- nem esse pernecessariam? Quis autem inficias ibit in omnibus Venereis suggestionem, delectationem, itque assensum intervenire tria à *Divo Gregorio Magno in lib. moral. requisita*, & in *De vet. Cap. pensandum est 6. dist. Tribus persequitur peccatum*? Cum igitur nullus sepiatur Venereis actus assensus voluntatis expers, fit, ut merè naturalis non habeatur, quinimò malitià sepe includat, cum à voluntate imperetur, præciso tantum Sacramenti Matrimonij exercitio, quod à Christo Domino institutum, non solum malitiam excludit, labemque omnem eliminat, verum etiam ad gratiam conferendam elevatur.

Hic igitur præhabitis, rem nostram aggredimur. Si antiquorum consulfere volumus Philosophorum placita, uno excepto *Aristotele*, quem *Stoici* sequuti sunt cum vulgo Peripateticorum quinquatum sensationum numerum defuientes, alij melioris notæ sapientiores multò plures sensus agnoscere, præsertim *Divinus ille Plato* qui in *Tibetate* præter vulgarium sensus: *Refrigerationes, calefactiones, voluptates, & dolores, cupiditates, & qui vocantur timores* pro sensibus agnovit, à *Doctissimo* forsan *Democrito* sententiam mutaturus, hic enim *Plutarcho teste in 4. de Placis. Philosophorum cap. 10. docuit Democritus plures esse sensus brutorum, animalium, Deorum, sapientium*. Et la-

nè, si horum maximorum Philosophorum opinionem in trutinam revocare velimus, à veritate non longè abesse comperiemus; & etenim calefactio, ac refrigeratio (sive quod harum altera in positione, altera in carentiâ consistant, ut in nostrâ Pyrotechniâ lib. 2. cap. 1. & alibi tetigimus, sive quod ambæ positivæ sint) certum est per contactum, vel particularum ab igne, vel alio corpore emanantium ad aliud corpus, vel per eandem particulatum à corpore calefacto recessum, vel frigorificatum molecularum concursu in nobis imprimi, quibus per potos insinuat, vel motu inducto, vel retardato, calidà, vel frigida sensatione afficiamur oportet. Hoc autem ad merum tactum redigere nimis insipidum foret, tum quia omnes alij sensus, licet per contactum perficiantur, ut in cujuslibet illorum tractatione explicemus, attamen ob aliam functionem à tactu proisus diversam, quamvis à tactu originem capiens, diversam vidimus constituisse sensationem; tum etiam quia tactus objectum, absolute loquendo, est corpus; hoc autem sub irradiati specie facit visionem, sub tacti formâ gustatum &c. Quapropter sub calidi, frigidi, lenis, asperi, molliis, duri &c. alias etiam sensationes efficiant necesse erit. Ad hæc ab omni protus dubitatione alienum est, non sensus quoscumque tantum, verum etiam, & inter alia nostrum, licet spirituale, utpotè limitatum, non posse eodem temporis momento duos diversa penitus considerare, undè multò minus visum v. g. duo diversa contingere, ut album, & nigrum, & sic de cæteris: cum igitur animadvertamus in eodem contactu non solum corpus

sentiri verùm etiam calidum, aut frigidum, molle, vel durum, grave, aut, leve &c. illud sit, operæ pretium duximus asserendum quam maximè interesse inter eam sensationem, qua corpus contingimus, & eas, quibus calidum, frigidum, leve, ponderosum, molle, durum &c. percipimus. Præterimus famem, nauseamque stomachi, dolores, & in nonnullis corporum partibus unctiones, quæ omnia, præter alia sensus esse neminem sanæ mentis præterit.

Sed ut radiciter, ut dicunt, rem perscuturemur, sensationum omnium naturam ex quatuor solent Physici, seu Animalistici investigare, nempe ex fine, ex organo, & objecto, & ex sensorij functione, quam propriè sensationem appellant; cum itaque hæc omnia in Veneris exercitio elucescant, jure merito inter sensationes alias reducendum esse Veneris sensum existimamus; & ut à fine initium capiamus.

Apud omnes est in confesso D. O. M. totius Universi Archetypum, omniumque creaturatum Protoplastum, post omnium creationem ex nihilo, Adæ, ejusque successoribus assignato omnium rerum dominio, ut *Genes. cap. 1.* habetur: *Dominamus piscibus maris, & volatilibus cæli, & universis animalibus, quæ moventur super terram.* Modum eis præbui utilia eliciendi, ac noxia rejiciendi per sensationes; & quoniam ex ijs, quæ utilia humano generi sunt, nonnulla vitæ commoditatibus, quam plurius individuum conservationi, ac etiam propagationi conducunt; ideo omnia prospiciens Creator omnium Deus, suæ Divinitatis Typo, hujusmodi sc. sensus externos, internosque contulit, quo-

rum illi mens nostra excitata, & meliora eligat ad corporis commoditatem, vitæque conservationem, blandumque sensum siveque oblectamentum, & nocua, ingrataque avertat; sic licet omnia comestibilia ad vitæ conservationem utilia expectantur, attamen prudentior animus ex eduliorum congerie ea sole eligere, quæ non modo conservationem intendunt, & sensibus alijs gratiora prospiciuntur, & in unâ eademque operatione, & vitæ conservationi, & sensuum oblectamento facilius par sit.

Cum igitur per enarrata vitæ sustentationi subventum sit, placuit Altissimo ea etiam disponere, quæ ad generis propagationem facere animadvertimus, quapropter hominibus Veneris usum concessit, quo non solum allicerentur suimet ipsius perpetuitati consulendo, sed ab hujus exercitij oblectamento absortus, & ne gravis ei uxoris pondus videretur, blanditiam in coitu impertitus est tantam, ut aliquandò suimet, parentum, fratrum, sororum, amicorumque oblitus, ea solum intendat, quæ matrimonij usum comitantur, juxta illud *Genes. cap. 2. num. 24. Quamobrem relinquet homo patrem suum, & matrem, & adheret uxori suæ, & erunt duo in carne una. Quia cum ea per copulam una caro sit. Quæ omnia ita cum veritate copulantur, ut ab ineffabili Ecclesia statutum sit: Matrimonij finem primum esse filiorum procreationem inveniendæ, secundarium verò concupiscentiæ solamen; quia verò ab aliarum sententiarum exercitio hujusmodi filiorum generatio haberi non potest, nec aliud adest organum, modusque alius non appareat talia peragendi; ideo asse-*

rendū putamus ratione finis, quem, alio ex capite obtinere minimè valemus, Veneris delectationem sensum esse ab omnibus omnino diversum constituentem.

Præterea apud omnes etiam vulgares convenit: In quolibet sensu duos fines dignoscendos esse, quorum alter sit primarius, pro quo est à Naturâ institutus, alter verò secundarius consistens in solatio illo, quod à sensus usu percipitur; sic in Gûstatu v. g. primarius est finis ea libatè, quæ ad vitæ conservationem conducunt; secundarius verò solamen persentiscere ex eduliorum blando sapore, Auditûs finis primarius est sonum advertere, secundarius à soni harmoniâ blandimentum recipere, ut in musicis melodijs observamus, & ità de alijs est sermoninandum. Cùm ergò in Veneris usu, & eum animadvertamus finem, pro quo primò à Naturâ intentus est, nempe filiorum procreatio, & illum, qui sensationem comitatur, nempe delectatio, sit, ut ex finium ratione, eorumque diversitate ab alijs sensationibus, Veneris Sensus diversus constituitur; Sed ex organi designatione hunc sensum designamus.

Constat apud omnes ex penis anatomie hunc esse instrumentum, non modò ab alijs penitus diversum, sed à Naturâ propriè ad hanc sensationem principaliter perficiendam destinatum, secundariò ad urinam excernendam. Dicemus cùm de alijs organis, atque sensuum instrumentis mentionem faciemus, non solum contactu, verùm etiam in pelliculâ quadam fibrosâ, inque papillis, nervorumque fibris omnes sensationes institui; Ecquis unquam inficias ire poterit penis glan-

dem, urethram, ejusque connexionem cum vasibus pampiniformibus, & spermaticis merâ tantùm membranulâ constitutos esse? Cumque ad tactûs organum per totum corpus diffusum natura cutem destinaverit, ad gustatum verò, odoratum, auditumque aut cuticulam aut nervos, sicuti videmus in pene, cur itàque dicendum non erit, hunc quoque pro instrumento, sensorioque ab alijs penitus diversò à naturâ fuisse institutum?

Præterea videmus omnes alios sensus externos non influere tantùm, verùm etiam & famularum quendam huic Veneris sensationi exhibere, sicut etiam & quos dicunt internos; etenim si oculus v. g. alicujus objecti pulchrioris irradiatione percellitur, transmissio ad imaginativam, sensusque alios internos (si qui sunt) rei vitæ idolo, ad animum usque diffundit, qui conceptam imaginem non intelligit solum, appetitque; sed per quandam, ut ità dicamus, sympathiam spiritus coagitat, dirigitque ità, ut ad penem usque traducti pruritum, & vellicationem in eodem incuriant; Quapropter satis bellè Magister amorum, *Ovidius* cecinit.

Si nescis, oculi sunt in amore duces.

Eodem proportionaliter modo de alijs etiam sensationibus est discurrendum; Hæc autem veritatem involunt tamen, ut eam prævidens, intelligensque provida Mater, atque sollicita nostræ salutis Ecclesia declaraverit: Omnes actus sive antecedant, sive comitentur, sive subsequantur copulam Venerem, omnimodâ remota matris parvitate, esse penitus lethalia.

His adde, quod tamen si insinuvemus molle, durum, calidum, frigidum,

dum, asperum &c. sensationes esse admittendas à simplici contactu omnino diversas, attamen in Veneris exercitio, (prout hæc sensatio, alias omnes absorbet) hæc omnia ad copulæ perfectionem concurrere animadvertimus ; Quis enim in hujusmodi actu ex duro, aut molli contactu pruriginem, seu excitationem, exalido, aut frigido intensionem, seu remissionem, ex aspero, aut lævigato irritationem (uxoris consiliis) non percipit ?

Sed potissimam rationem in medium proferamus : Apud omnes etiam vulgates est in comperto tactus organum per totam cutem esse diffusum ; cum enim per eam papillulæ ab Illustrissimo *Malpighio* notatæ animadvertantur, in quibus tactus perficitur, licet exquisitius in manibus, sit, ut per totam corporis peripheriam tactus organum extendarur, id, quod, clariùs evincitur, si consideremus à frigido, aut calido, ab aspero, aut leni, à duro, aut molli, ab humido, aut sicco &c. quæ à vulgatis simplici tactui tribuantur, quascumque corporis partes affici ; si ergo Veneris sensatio ad merum tactum esset reducenda, fieret, ut per totam cutem, ac per quascumque partes peripheriæ corporis per sentiretetur, quod repugnat autopsiæ, experientiæ, & rationi, cum contra expectamur in solo pene, & in designatis ejus partibus inferiùs explicandis, hanc sensationem compleri, non alio prorsus modo, ac visio in oculo, olfactio in naribus gustus, in linguâ, & palato, & audiens in auribus, tanquam in specificis organis à naturâ, ad illos actus peragendos, designatis. Præterquam quod nimis frigida hujusmodi esset sensatio, si in solo tactu consistere-

ret, cum etiam observemus contactum esse medium, quo ad Veneris copulam perveniunt, eandem copulam in praxim deducentes. Ex quibus clarè convincitur hujusmodi sensationem malè à vulgo, ad tactus sensum fuisse hucusque redactam.

Ut autem de objecto aliqua loquamur ; certum est apud omnes Pulchrum, aut reverea tale, aut apparens, objectum esse movens, seu excitans Venerem, quatenus rei visæ, auditæ, contactæ &c. imago ita imaginativam afficit, omnesque alios, quos internos sensus appellant, ut ad animum usque percurrens illum de re visâ, auditâ, contactâ &c. admoneat, quâ cognitâ, præterquam desiderio quodam percellitur juxta impressionem à sensibus immisissam aut maximo, aut minimo, aut mediocri objectum assequendi, quæ mobrem media etiam elicit, dispoſitæque ad finem obtinendum proportionata, sed insuper à fruitionis illecebria agitatus spiritus immittit ad genitalia, qui musculos erectorios pruritando, vasque spermaticum inflando mediâ seminis, salisque in spermate contenti excitatione, & penis erectionem, & seminis jaculationem moluntur ; Undè fit, ut his affectibus exagitatum animal, & animi inquietudinem, & corporis inquietudinem patiatur, quatenus à rei apprehensione, & amaræ desiderio continuò vexatur, ut in ejus aut continuâ contemplatione persistat ; Undè *D. August.* stabilietur : *Amantis animam pluisse, ubi amat, quàm ubi animat ;* aut perperuâ possessione lætetur, cum rei desideratæ perceptio maximum hilaritatis, gaudij, lætitiæque obtenti elargiatur, aut carentiâ vel minimâ cruciatur, cum rei amatæ privatio

ita orbatum exquisitijs exagiter, sicut ejusdem fruitionem naturalem beatitudinem impetratur, juxta illud *Petri C. Bembi.*

*Se più d'urasse l'uomo in tale stato,
Perfessamente si dursa beato.*

Corporis verò, quatenus à sensibus alijs, & maxime à Venere torqueatur, & ab animi affectibus angatur; vitus enim in rei delectationem observatione immergi, tactus in ejusdem confectione absorbere, auditus in perfectionum objecti sermone detineri, gustatus in ejusdem suavi deosculacione præfigi non exoptant modò, verùm etiam omnibus viribus aveant, desiderantque.

His insuper addendum pro objecto, quod dicunt proximum hujus sensationis, fruitionem scilicet, vel aliàs expectam, vel primò intentam, quam maxime in hunc affectum impellere; Imago enim præhabita, vel primò obtinenda delectationis sua phantasiam afficit, alijsque, siqui sunt, sensus internos, ut ab eadem illecti animum regulariter perturbent, qui à concupiscentiâ (ut verbis *Apostoli Jacobi* utamur) abstractus, & illectus, rectè rationis oblitus, & in sensuum delectatione absortus fruitionem concipit, possessionem elicit rei, expectat, machinatur. Undè tot errores, tot mala, & quod pessimum, tot peccata proveniunt.

Sed ad sensorij functionem, quæ propriè sensorio dicitur, transitum faciamus. Uti superius insinuavimus, præsupponendum ducimus omnes alios sensuum externos, tum internos in Venerem influxum facere, dum visus in objecti amati pulchritudine, gustus in ejusdem dulcedine, auditus

in illius harmoniz representatione, olfactus in ipsius purido odore, tactusque in concretatione, ac interni sensus in rei idolo immersi fluctuanti, æstuentque; Ex quo fit, ut spiritus, quos nuncupant animales ab omnium facultatum discrasia perturbati, & cerebrum quandoque exagitent, undè aliquandò Mania, phrenitis, aliæque mala proveniant, & cor aggrediantur, cujus regularem motum deordinando, aut palpitus, aut liporhynias, aut alios producant morbos, & in sanguinem se immittendo, vel novam fermentationem promovendo, febres generantur, vel heterogeneas sanguinis particulas excitando, & spirituosas exaltando, quamplurium affectuum malignorum illiadem congerunt, coæcervant, agglomerantque (Hæc quanta malorum pessimorum congeries ab unâ concupiscentiâ scaturiginem sortitur!) Et genitalia pruritendo, vasque seminalia inflando, partem spermatis volatilem, saluamque ad sui extricationem irritant; quamobrem particule quædam per eorundem vasorum poros avolando, vel in musculos incurrunt erectorios, & majorem illis erigendi egergiam communicant, suæque gratiâ, blandæque vellicatione delectationis Veneris radium quendam inmittunt; aut ob earundem tenuitatem granum hori deaceum aliquantisper removendo, ensam præbent fluidiori, minusque viscidæ spermatis particule in urethram decidendi, undè seminis guttula suo volanti sale scatens membranam urethræ internam, glandemque quodammodò pruitans, minimulæ speciem delectationis in ejusdem papillas insinuat, quæ papillæ nervorum

rum, filamenta, nervique ipsi effecti, & ad cerebrum illam transfundunt, & imaginativæ repræsentant, & mentem ejusdem rei advenientem satius quàm pa est, non expergiscunt solum, verum etiam stimulant, impelluntque. Quapropter à delectationis complemento abortita, Veneremque tantummodo affectans, ejusdem exercitium appetit, satagit, tandemque periclitatur. In hac autem operatione tantus, & adeo inordinatus est corporis ætus, torque observantur non solum motuum varietates, sed convulsionum, motuumque convulsivorum in corpore affectus, ut non immerito pronuntiaverit Hippocrates, Coitum brevem esse epilepsiam, prout refert Macrobius in lib. Saturnal. necnon Aul. Gell. noct. Atticarum lib. 19. cap. 2. quod etiam Fanstus hoc disticho peribellè canendo explicavit.

Turpis, Est morbi species horrenda Caducis,

Cum jacet exanimis post sua furta Venus.

Ut prætereamus Stobæum hanc sententiam Maximo Democrito tribuentem; neque ab hoc dissensit Gal. qui lib. 14. cap. 10. de usu partium: Quantum enim ad ea, quæ in vasis continentur, excernenda, ipse partium velut Spasmodus, qui in coitu Venereo accidit, habet momenti, ex magnis epilepsijs, & eo affellu, qui gonorrhæa, id est incoita seminis effluxio, nuncupatur, discas. Siquidem in vehementibus epilepsijs, quod corpus totum vehementer convellatur, & cum eo partes gentales, semen idcirco externitur. Quod etiam approbavit Aul. Aurelianus lib. 1. cap. 4. asserens: Coitus ab aliquibus parva epilepsia nuncupatur. Nec immerito cum in eodem actu membrorum omnium mo-

tus involuntarij obseventur, nervorum contractio, artuum tremor, oculorum inversio, lumborum impulsus, percutem sudor, totiusque corporis laxitas haud immodica &c. quæ omnia symptomata sunt epilepsiam concomitantia.

Probatâ igitur ex quolibet quatuor capitulâ, nempe à fine, ab objecto, ab organo, & à sensorij functione Venereæ sensationis existentia, ac veritate, ad ea deveniendum existimamus, quæ hujus rei ratio, phænomena, secum affert; pro quibus,

Primò quærimus, in qua hujus organi parte sensatio hæc perficiatur.

Pro cuius quæsitæ extricatione dicendum arbitramur totum hujus sensationis momentum à sale volatili in spermatis substantiâ stabulante, haberi: Hoc enim à spiritibus immixtis agitaturn, à motu, in Veneris actu exagitaturn, sollicitatur, atque è partium inter se confractione, necnon à spiritibus, alijsque particulis ad motum extricationis impulsû in tantam exaltatur energiam, ut loco stare nesciens, sua perniciousitate è vasorum spermatocorum, ac vesicularum seminalium officijs, totam secum spermatis substantiam trahendo, in urethram immittit se se, ibique aliquam à viscidâ seminis substantia extricationem nanciscens, membranulam urethræ internam pruritans post granum hordeaceum irâ bland sinu afficit, ut supra omnem delectationem maximam jucunditatem impertiaturn, & quoniam per eandem urethram fluens, eandemque membranulam offendens usque ad glandis officium extemum & tangit, & vellicat, pruritaturque idcirco fit, ut per totam urethram sensatio diffundatur. Quia

de vlrīs etiā observatur, ut quispiā in se sano vel aegrotō experiri potest.

Hoc Scrotum multis langoribus obnoxium est, sed nos hic tantum secundum nostrum institutum de ejus ex coriatione, & ulcere agimus.

CAP. LII.

De Excoriatione, & Ulcere Scroti.

Signa.

Scrotum est rugosus ille testiculorum sacculus, quem nonnulli etiam Scortum appellant, quod quandam coreacci sacculi similitudinem refert; Scortea enim veteres appellabant quæcumque ex alutā, aut pelle constabant. Dicitur etiam vulgō bursa, seu marsupium virile foris propendens, & tactui obviū est. Molle, & rugosum ad faciliorem extensionem, & corrugationem, inter scroti tunicas nulla interijcitur pinguedo, quia oneri, & impedimento huic parti fuisset. In infimā parte lineam habet secundum longitudinem excurrentem, quæ in dextram, & sinistram partem ab Anatomicis dividitur, & futuram appellant. Constat cuticulā & cute tenuiore, quā alibi, huic ineriori adhæret alia tunica tenuis ex panniculo carnosio enata, venis, & arterijs referta. Constat musculo corrugante tenuiori, Dartos appellata. Hujus musculi ope accidit, ut quam promptissimè scrotū corrugetur, vel relaxetur; undè faciliè redditur ratio, cur in aegrotantibus infantibus relaxetur, & in sanis corrugetur: mulierculæ enim cū Scrotum corrugarum conspiciunt, rectè valere, contrā verò si relaxatum propendat, infantem aegrotare judicant, quod, &

D. Caroli Musiani Tom. II.

Scroti excoriatio deprehenditur ex dolore urente, cuticulæ ablatione, vel erosionē, & aspectu patescit. Ulcus visui occurrit, adeo ut alijs non indigeat signis.

Causæ.

Consent vulgares excoriationis scroti causas esse humores acres utinam in ipsis infantibus partem hanc diutius inundantem, & cuticulam erodentem; in adultis eandem causam, si urinam in lecto emittant; in hydropicis serum, vapores, & impuritates acres circa scrotum collectas, vel scalpionem, à quibus epidermis dilaceratur. Eiusdem ulcus ab humorum acrim affluxu, vel post inflammationem suppuratam, & quidē vel solam, vel cum testibus excitari volunt.

Excoriatio, & ulcus scroti fiunt à particulis acidis, & salsis valde acutis, & corrosivis in lymphā, sanguine, vel succo alimentitio circulantibus, vel flagrantibus superficietenus lacerantibus vel profutius fibras erodentibus, fiunt etiam à fortiori scalpione, frictione,

aliarumvè rerum corrosivarum admotione, vel lue Venerea, ulcus quandoque à suppuratâ inflammatione: exco-
riationis itaque causa est minor, ulce-
ris major, hi enim affectus secundum
magis, & minus differunt.

Prognosis.

Scroti exco-riatio, & ulcus non sunt
contemnenda, nam exco-riatio in ulcus,
& hoc, cum sit in loco humido, facili
in gangrænam degenerat.

Curatio.

Scroti exco-riationem in infantibus
curant vulgares linteis mundis, & sic-
cis sæpe apposisis, vel asperso subtilis-
simo myrtillorum pulvere, vel sequenti
unguento, ut.

*R. Vng. de cerussa ʒ. B.
Lithargyrii ʒ. j.
ol. ros. parum,
f. Unguentum.*

In adultis verò humorum acrimo-
niam corrigunt, & nonnunquam eo-
rum colluviem evacuant, deindè ad to-
pica deveniunt, ut sunt decoctum plan-
tag. & ros. in lacte, unguentum rosatum,
de tutiâ, populeonis, vel empl. album co-
ctum, & impositum.

In scroti ulceribus humores præpa-
rant acres *ʒr. de cichor. lupul. fumar.*
simp. cum iisdem aquis, deindè præpa-

ratos evacuant *ʒr. de fumar. maj. &
confect. Flamech.* Postmodum ulcus
mundificant *unguento Apostolor. cum
Ægyptiaco misto*, mûdificato ulceri ap-
plicant *unguentum de plumbo, tutiâ,
Lithargyr. minio &c.* quosque cicatri-
cem inducant.

In scroti exco-riatione, & ulcete ea
conducunt medicamenta, quæ parti-
culas salinas, acidas, & corrosdentes
hebetant, temperant, & cicurant, abla-
tam restituant cuticulam, & carnis de-
fectum suppleant, ac si aliquandò pur-
gantibus opus est, conveniunt ea, quæ
superfluum absorbent serum, & elimi-
nant, omnibus palmam præcipit *Mer-
curius dulcis cum gummi jalap.* Non
spernenda sunt decocta ex ligno buxi,
falsa pavilla, radici chine, ac bardana,
cornu cervi, limatura eboris cum aquâ
cardus benedicti parata in duplici vase
vitreo, nec diaphoretica, & potiosa,
præcipuè si de lue Veneteâ ambigatur,
hæc namque particulas succorum acu-
tas corrosdentes superant, & per sudo-
rem, vel insensibilitatem transporant, vel
per urethram exturbant, ac exco-riatio-
ni epidermidem restituant, & ulcus
ab iisdem eripiunt, & mundificant.
Has particulas corrosivas in scroti in-
fantium, & adultorum exco-riatione
hebetant pulveres cornu cervi ussi, lapi-
dis calaminaris preparati, Lithargyrii,
creta, terra exanimata vitrioli, cerussa
Saturni, Cerussæ antimoni, præstant
flores cinci. Commendamus solum ex
herbis sale volatili gaudentibus, ut hy-
perico, betonicâ, menthâ, floribus sana-
buci, chamomilla, semine lini in lacte co-
ctis, & post hunc utilis est illitio ex oleo
ovorum, vel nucum. optimum erit se-
quens unguentum.

riam. Dosis ℥. vj. quibus adde.

℥. Ol. papaveris ℥. vj.

cera alba ℥. j. B.

cernisse antimonij ℥. xv. m.

aqua cinnam. ℥. j.

magist. ocul. cancer. flu. vel

coralliorum ℥. B.

Quo felici cum successu uti poteris etiam in rhagadibus. Quandòque cum excoriatione pruritus scrotum simul affligit, tunc apprimè convenit sequens unguentum, ut.

Vel fiat decoctum vulnerarium calidè applicandam cum plumaceolis; vel per siphunculum injiciendum, si ulcus profundum sit ad testium substantiam, ut,

℥. Ung. de minio camphorat. ℥. B.

ceraussa subtilissimè trita ℥. j.

ol. ros. q. s.

ut f. linimentum mediocre,

℥. Sabine,

ar. stoechia rotunda,

scordij,

eupatorij,

rad. hastulae Regie, &

symphyti maj. ana ℥. j.

Coque in aquâ comm. & in colat. lib. ij. adde

aqua Regine Hung. ℥. iij.

sacch. Saturni, &

myrrhe ana ℥. ij.

camphora, &

aloës ana ℥. j.

Quo imbutum linteolum frequenter loco prurienti, & excoriato superponere.

In ulceribus scroti præter jam supradicta interna, conveniunt etiam potiones vulnerariæ, ut.

℥. Diſſamni,

hedera terrestris,

vinca pervinea,

telephij,

alchimille,

stellaria,

scabiosa ana m. j.

Coque cum aquâ symphyti in duplici vase apprimè clauso ad lib. ij. remanen-

Plumaceola hoc decocto imbuta calidè quater in die ulceri imponantur cum suo subligaculo. Utile est empl. de lapide calaminari, vel fodicationum, vel stipticum, vel oppodeltoch. Tam in excoriatione, quàm ulceri scroti in cuiuscumque medicamenti applicatione maximopetè necessarium est subligaculum.

CAP. LIII.

De Perinai Vlcere.

Non solum humani corporis angulos ulceribus correptos perlustravimus, verum etiam inter remotissimas femorum latebras, in perinæum Chirurgum manu ducimus. Est iste locus, qui à scroti radice ad podicem usque porrigitur, Constat ex musculis, cute & cuticulâ obductis, nervis, & vasitum sanguiferis, tum lymphaticis compositus, in adultis pilis obrectus. Vocatur græcè interfeminiū, quod inter femora situm obrineat: Verum *Apul.* interfeminiū appellat genitalia muliebria, eo quod inter femina est, id inter femora, sint collocata.

Signa.

Cognoscitur Perinai ulcus tum ægri relatione, tum ex partis inspectione.

Causa.

Opinatur vulgares hoc ulcus producti à parte in abscessu aciori reddito, vel à succis quibusdam acribus ad hanc partem confluentibus, quibus cutis, & subjæctæ partes corroduntur,

quod etiam fieri posse arbitrantur à rebus acribus, & corrodentibus externis, ut sudore, urinâ, venenis, vel medicamentis.

Pro petinzi ulceris causâ inflammationem suppuratam assignamus; facile enim in ulcus transit abscessus, vel ex chirurgi ignaviâ excitatur, vel pus in ipso abscessu cutem, & carnem subjectam exedit, quibus adesis, viam sibi parat, id contingit, si pus in parte diutius stagner, vel relinquatur; salia siquidem puris huc illuc agitata ambientes partes suis spiculis immerunt, & earum fibrillas dissecant, ac comminunt: Si pus diutius quàm par est, in parte relinquatur, salium actione profundiore, & latiores excirat foveam, internas exedit partes, & ad cutem, cuticulamque tandem vergit, quæ cum densa, & duræ non sint, salium spiculis cedunt, & ab ijs tandem discinduntur, & liber puri conceditur exitus, Vel sit à succo multis particulis acutis, & erodentibus repleto per scilpionem, contusionem, lapsum, vel aliam ob causam è proprijs vasculis eliminato, ut & urinam saliores hanc partem humectantem, vel sperma à lue Venereâ conspurcatum sæpissimè eandem irritans, hujusmodi ulcus provenire posse ultro fateamur.

Prognosis.

Perinai ulcus timendum est, cum pus acius redditum circumstantes corrodat partes tam internas, quàm externas, quæ semel exulceratæ difficillimam, vel nullam admittunt cura-

tionem, imò ferè semper in fistulam perennem, & quandòque in gangrænam transit, cui nisi exemplò succurratur, vix æger eripitur à faucibus orci faciliùs, vel difficiliùs curatur pro minori, vel majori morâ, quam pus in abscessu contraxit.

Curatio.

In ulcere perinæ post ruptum abscessum, statim *digestivo ex ovis vitello, terebinthinâ, & oleo rosaceo* utuntur vulgares & tumidam partem oleo rosaceo inungunt, postmodum pro ulceris absterfione *hordei decoctum, in quo mel rosatum fuerit dissolutum*, adhibent. His nihil proficientibus, in ulcus *decoctum hordei, & senpinozina*, in quo unguentum *Aegyptiacum dissolutum* sit, per Syringam præcipuè si magna purulentæ materia copia adsit, vel in fistulam si inclinare videatur, injiciunt. Vel si profundius, aut fistulosum existat, simul cum *herdæ radices aristolochiæ, ireos florentes, herbas agrimonie, beconicæ, & aliquid thuris* concòquunt, & in hoc decocto aliquid de unguento *Aegyptiaco etiam dissolvunt*, & injiciunt. Absterfum ulcus *emplastro de Graiiâ Dei, vel Diapalma* ad perfectam sanationem ulque obtegent.

In perinæ ulceribus, præsertim à suppuratâ inflammatione genitis, ante omnia succos acutos, & erodentes attempetamus alkalicos, sive porosis, ac diaphoreticis, & porionibus vulnerarijs quibus intermiscemus *magisteria ex oculis cancrorum, & coralliorum*,

vel subium diaphoreticum, vel decoctis sudoriferis pluries antè descriptionis, quæ etiam viscidos stagnantes succos fluidiores, & spirituosiores reddunt. Inter topica, si ulcus sit sordidum, *unguentum Aegyptiacum magistrale in parvâ dosi dissolutum in decocto radicis gentianæ, & angelicæ, herbarum scordij, centaurij, & absinthij cum tantillo elixiris vita, vel balsami vita n. d. per siphunculum injectum*, si fodicatum sit ulcus, commendamus, aliàs *plumaceola* imbuta quater in die calida applicentur, vel sunt injectiones *ex aquâ reginæ*, qua absterfa, optimum remedium erit balsamus propteracis, imò hæc duo ad perfectam curationem ulcus conducunt. Vel præstans erit medicamentum *infusio myrrhæ, & aloës in aqua Reginæ*.

Si ab extetna causâ corroden- te suam genesim cognoscat ulcus, ut ab urinâ saliori, vel succo spermaticò Venereo, ulceris conditio inspicienda, & juxta hanc exigentiam, & statum tractari debet; Si tamen in cutis superficie spatietur, tunc inspergatur *pulvere cornu cervi Philosophicò pp. Lapidis calaminaris, cerussâ, vel flore cinis, vel abluitur spiritu vini camphorato, vel theriacali, vel infusione Lapidis salinis*. Tandem si quid cicatrizandum superest, *emplastri fodicationum, vel stipici, vel oppoteldoch* applicatione opus com- plebis.

imo probris omnibus cumulandos esse adversarios sentimus; Quis enim in homine Venerea tanquam merè naturalis, & purè naturalia unquam somnivit? Nonne iuretur omnes quum Theologos, tùm etiam Doctores convenit in omnibus actibus meriti, & demeriti capacibus voluntatis electio- nem esse pernecessariam? Quis autem inficias ibit in omnibus Venereis suggestionem, delectationem, atque assensum intervenire etia à *Drvo Gregorio Magno in lib. moral. requisita*, & in *Decret. Cap. pensandum est 6. dist. Tribus perficitur peccatum*? Cùm igitur nullus reperjatur Venereis actus assensu voluntatis expers, fit, ut merè naturalis non habeatur; quinimò malitià sepe includat, cùm à voluntate imperetur, præciso tantùm Sacramenti Matrimonij exercitio, quod à Christo Domino institutum; non solùm malitiam excludit, labemque omnem eliminat, verùm etiam ad gratiam conferendam elevatur.

His igitur præhabitis, rem nostram aggredimur. Si antiquorum consuliere volumus Philolophorum placita, uno excepto *Aristotele*, quem *Stoici* sequuti sunt cum vulgo Peripateticorum quinarium sensationum numerum definiētes, alij melioris notæ sapientiores multò plures sensus agnovēte, præsertim *Divinus ille Plato* qui in *Theateto* præter vulgarē sensus: *Refrigerationes, calefactiones, voluptates, & dolores, cupiditates, & qui vocantur timores* pro sensibus agnovit, à *Doctissimo* forsan *Democritio* sententiam mutuatus, hic enim *Plutarcho teste in 4. de Placit. Philosophorum cap. 10. docuit Democritus plures esse sensus humorum, animalium, Deorum, sapientium*. Et (a-

nè, si horum maximorum Philosophorum opinionem in trutinam revocare velimus, à veritate non longè abesse comperiemus; & etenim calefactio, ac refrigeratio (sive quod harum altera in positione, altera in carentiâ consistant, ut in nostrâ Pyrotechniâ lib. 2. cap. 1. & alibi tetigimus, sive quod ambæ positivæ sint) certum est per contactum, vel particularum ab igne, vel alio corpore emanantium ad aliud corpus, vel per eandem particularem à corpore calefacto recessum, vel frigorificatum molecularum concursu in nobis imprimi, quibus per potos insinuat, vel motu inducō, vel retardato, calidà, vel frigidà sensatione afficiamur oportet. Hoc autem ad merum tactum redigere nimis insipidum foret, tùm quia omnes alij sensus, licet per contactum perficiantur, ut in cujlibet illorum tractatione explicemus, attamen ob aliam functionem à tactu proisus diversam, quamvis à tactu originem capiens, diversam vidimus constituisse sensationem; tùm etiam quia tactus objectum, absolute loquendo, est corpus; hoc autem sub irradiati specie facit visionem, sub tacti formâ gustatum &c. Quapropter sub calidi, frigidi, lenis, asperi, molli, duri &c. alias etiam sensationes efficiant necesse erit. Ad hæc ab omni proisus dubitatio alienum est, non sensus quoscumque tantùm, verùm etiam, & int. lectum nostrum, licet ipiritualem, ut potè limitatum, non posse eodem temporis momento duos diversa penitus considerare, undè multò minùs visum v. g. duos diversa contingere, ut album, & nigrum, & sic de cæteris: cùm igitur animadvertamus in eodem contactu non solùm corpus sen-

sentiri verum etiam calidum, aut frigidum, molle, vel durum, grave, aut, leve &c. illud sit, operæ pretium duximus asserendum quam maxime interesse inter eam sensationem, qua corpus contingimus, & eas, quibus calidum, frigidum, leve, ponderosum, molle, durum &c. percipimus. Præterimus famem, nauseamque stomachi, dolores, & in nonnullis corporum partibus titillationes, quæ omnia, præter alia sensus esse neminem sanæ mentis præterit.

Sed ut radicitus, ut dicunt, rem perscrutemur, sensationum omnium naturam ex quatuor solemus Physici, seu Animalici investigare, nempe ex fine, ex organo, & objecto, & ex sensorij functione, quam propriè sensationem appellant; cum itaque hæc omnia in Veneris exercitio elucidant, jure merito inter sensationes alias reducendum esse Veneris sensum existimamus; & ut à fine initium capiamus.

Apud omnes est in confesso D. O. M. totius Universi Archetypum, omniumque creaturarum Protoplastum, post omnium creationem ex nihilo, Adæ, ejusque successoribus assignato omnium rerum dominio, ut *Genes. cap. 1.* habetur: *Dominamus piscibus maris, & volatilibus cæli, & universis animantibus, quæ moventur super terram.* Modum eis præbuit utilia eliciendi, ac noxia rejiciendi per sensationes; & quoniam ex ijs, quæ utilia humano generi sunt, nonnulla vitæ commoditatibus, quam plurima individuorum conservationi, ac etiam propagationi conducunt; ideo cò omnia prospiciens Creator omnium Deus, suæ Divinitatis Typo, hujusmodi sc. sensus externos, internosque constituit, quo-

rum Idem mens nostra excitata, & meliora teligat ad corporis commoditatem, vitæque conservationem, blandumque sensuum suique oblectamentum, & nocua, ingrataque avertat; sic licet omnia comestibilia ad vitæ conservationem utilia expectamus, attamen prudenter animus ex eduliorum congerie ea sole eligeat, quæ non modo conservationem intendunt, & sensibus alijs gratiora prospiciuntur, & in unâ eademque operatione, & vitæ conservationi, & sensuum oblectamento faciamus satis.

Cùm igitur per enarrata vitæ sustentationi subventum sit, placuit Altissimo ea etiam disponere, quæ ad generis propagationem facere animadvertimus, quapropter hominibus Veneris usum concessit, quo non solum allicerentur suimet ipsius perpetuari consulendo, sed ab hujus exercitij oblectamento abscortus, & ne gravis ei uxoris pondus videretur, blanditiam in coitu impertitus est tantam, ut aliquando suimet, parentum, fratrum, sororum, amicorumque oblitus, ea solum intendat, quæ matrimonij usum comitantur, juxta illud *Genes. cap. 2. num. 24. Quamobrem relinquet homo patrem suum, & matrem, & adheret uxori suæ, & erunt duo in carne una. Quia cum ea per copulam una caro fit. Quæ omnia ita cum veritate copulantur, ut ab ineffabili Ecclesia statutum sit: Matrimonij finem primum esse filiorum procreationem intendere, secundarium verò concupiscentiæ solatium; quia verò ab aliarum sensationum exercitio hujusmodi filiorum generatio haberi non potest, nec aliud adest organum, modusque alius non apparet talia peragendi; ideo cò asse-*

rendū putamus ratione finis, quem, alio ex capite obtinere minimè valemus, Veneris delectationem sensum esse ab omnibus omnino diversum constituentium.

Præterea apud omnes etiam vulgares convenit: In quolibet sensu duos fines dignoscendos esse, quorum alter sit primarius, pro quo est à Naturâ institutus, alter verò secundarius consistens in solatio illo, quod à sensus usu percipitur; sic in Gustatu v. g. primarius est finis ea libare, quæ ad vitæ conservationem conducunt; secundarius verò solamen perfructu ex eduliorum blando sapore, Auditûs finis primarius est sonum advertere, secundarius à soni harmoniâ blandimentum recipere, ut in musicis melodijs observamus, & ità de alijs est sermocinandum. Cùm ergo in Veneris usu, & eum animadvertamus finem, pro quo prius à Naturâ intentus est, nempe filiorum procreatio, & illum, qui sensationem comitatur, nempe delectatio, sit, ut ex finium ratione, eorumque diversitate ab alijs sensationibus, Veneris Sensus diversus constituitur; Sed ex organi designatione hunc sensum designamus.

Constat apud omnes ex penis anatomie hunc esse instrumentum, non modò ab alijs penis diversum, sed à Naturâ propriè ad hanc sensationem principaliter perficiendam destinatum, secundariò ad urinam excernendam. Dicemus cùm de alijs organis, atque sensuum instrumentis mentionem faciemus, non solum contactu, verum etiam in pelliculâ quadam fibrosâ, inque papillis, nervorumque fibris omnes sensationes institui; Equis unquam inficias ire poterit penis glan-

dem, urethram, ejusque connexionem cum vasis pampiniformibus, & spermaticis merâ tantum membranulâ constitutos esse? Cumque ad tactûs organum per totum corpus diffusum natura cotem destinaverit, ad gustatum verò, odotatum, auditumque aut cuticulam aut nervos, sicuti videmus, in pene, cur itaque dicendum non erit hunc quoque pro instrumento, sensorioque ab alijs penis diversum à naturâ fuisse institutum?

Præterea videmus omnes alios sensus externos non influere tantum, verum etiam & famularum quendam huic Veneris sensationi exhibere, sicut etiam & quos dicunt internos; etenim si oculus v. g. alicujus objecti pulchritudinis irradiatione percellitur, transmissio ad imaginativam, sensusque alios internos (si qui sunt) rei viz idolo, ad animum usque diffundit, qui conceptam imaginem non intelligit solum, appetitque; sed per quamdam, ut ità dicamus, sympathiam spiritus coagitat, dirigitque ità, ut ad penem usque traducti pruritus, & vellicationem in eodem incuriant; Quapropter satis bellè Magister amorum, *Ovidius* cecinit.

Si nescis, oculi sunt in amore duces.

Eodem proportionaliter modo de alijs etiam sensationibus est discurrendum; Hæc autem veritatem involunt tantam, ut eam prævidens, intelligensque provida Mater, atque sollicita nostræ salutis Ecclesia declaraverit: Omnes actus sive antecedant, sive comitentur, sive subsequantur copulam Veneream, omnimodâ remotâ matris partu, esse penitus lethalia.

His adde, quod tamen infinuaverimus molle, durum, calidum, frigidum,

dum, asperum &c. sensationes esse admittendas à simplici contactu omnino diversas, atamen in Veneris exercitio, (prout hæc sensatio alias omnes absorbet) hæc omnia ad copulæ perfectionem concurrere animadvertimus ; Quis enim in hujusmodi actu ex duro, aut molli contactu pruriginem, seu excitationem, ex calido, aut frigido intensionem, seu remissionem, ex aspero, aut lævigato irritationem (uxoris consulis) non percipit ?

Sed potissimam rationem in medium proferamus : Apud omnes etiam vulgares est in comperto tactus organum per totam cutem esse diffusum ; cum enim per eam papillule ab Illustrissimo *Malpighio* notatæ animadvertantur, in quibus tactus perficitur, licet exquisitius in manibus, sit, ut per totam corporis peripheriam tactus organum extendatur, id, quod, clarius evincitur, si consideremus à frigido, aut calido, ab aspero, aut leni, à duro, aut molli, ab humido, aut sicco &c. quæ à vulgaribus simplici tactui tribuantur, quascumque corporis partes affici ; si ergo Veneris sematio ad merum tactum esset reducenda, fieret, ut per totam cutem, ac per quascumque partes peripheriæ corporis persentisceretur, quod repugnat autopsiæ, experientiæ, & rationi, cum contrà experiamur in solo pene, & in designatis ejus partibus inferius explicandis, hanc sensationem compleri, non alio prorsus modo, ac visio in oculo, olfactio in natibus gustus, in linguâ, & palato, & auditus in auribus, tanquam in specificis organis à naturâ, ad illos actus peragendos, designatis. Præterquam quod nimia frigida hujusmodi esset sensatio, si in solo tactu consisteret,

cum etiam observemus contactum esse medium, quo ad Veneris copulam perveniunt, eandem copulam in praxim deducentes. Ex quibus clarè convincitur hujusmodi sensationem malè à vulgo, ad tactus sensum fuisse hucusque redactam.

U: autem de objecto aliqua loquamur ; certum est apud omnes Pulchrum, aut reverea tale, aut apparens, objectum esse movens, seu excitans Venerem, quatenus rei visæ, auditæ, contactæ &c. imago ita imaginativam afficit, omnesque alios, quos internos sensus appellant, ut ad animum usque percurrens illum de re visâ, auditâ, contactâ &c. admonet, quâ cognitâ, præterquam desiderio quodam percellitur juxta impressionem à sensibus immisissam aut maximo, aut minimo, aut mediocri objectum assequendi, quæmobrem media etiam elicit, disponitque ad finem obtinendum proportionata, sed insuper à frustrationis illecebria agitatus spiritus immittit ad genitalia, qui musculos erectorios pruritando, vasæque spermatica inflando mediâ seminis, salisque in spermate contenti excitatione, & penis erectionem, & seminis jaculationem molliuntur ; Undè fit, ut his affectibus exagitatum animal, & animi inquietudinem, & corporis inquietantiam patiatur, quatenus à rei apprehensæ, & amatæ desiderio continuo vexatur, ut in ejus aut continuâ contemplatione persistat ; Undè *D. August.* scribitur : *Amaris animam pluisse, ubi amat, quam ubi animat ;* aut perpetuâ possessione lætetur, cum rei desideratæ perceptio maximum hilaritatis, gaudij, lætitiæque obreni elargiatur, aut carentiâ vel minimâ cruciatur, cum rei amatæ privatio

irâ orbatum exquisitiùs exagitet, sicut ejusdem fruitionis naturalem beatitudinem impettitur, juxta illud *Petri C. Bemb.*

*Se più durasse l'uomo in tale stato,
Perfettamente si darsa beato.*

Corporis vidè, quatenus à sensibus alijs, & maxime à Venere torqueatur, & ab animi affectibus angatur; vilus enim in rei delectæ tantum observatione immetgi, tactus in ejusdem conrectatione absorberi, auditus in perfectionum objecti sermone detineri, gustatus in ejusdem suavi deosculatione præfigi non exoptant modò, verùm etiam omnibus viribus aveant, desiderantque.

His insuper addendum pro objecto, quod dicant proximum hujus sensationis, fruitionem scilicet, vel aliâ expectam, vel primò intentam, quam maxime in hunc affectum impellere; Imago enim præhabita, vel primò obtinentæ delectationis iâ phantasiam afficit, aliosque, siqui sunt, sensus internos, ut ab eadem illecti animum regulariter perturbent, qui à concupiscentiâ (ut verbis *Apostoli Iacobi* utamur) abstractus, & illectus, rectæ rationis obliuiscitur, & in sensuum delectatione absorbitur, fruitionem concipit, possessionem elicit rei, experit, machinatur. Undè tot errores, tot mala, & quod pessimum, tot peccata proveniunt.

Sed ad sensorij functionem, quæ propriè sensorio dicitur, transitum faciamus. Uii superius insinuavimus, præsupponendum ducimus omnes alios sensuum externos, tum internos in Venerem influxum facere, dum visus in objecti amari pulchritudine, gustus in ejusdem dulcedine, auditus

in illius harmoniz representatione, olfactus in ipsius putido odore, tactusque in conrectatione, ac interni sensus in rei idolo immergi fluctuant, æstuantque; Ex quo fit, ut spiritus, quos nuncupant animales ab omnium facultatum diversità perturbant, & cerebrum quandoque exagitent, unde aliquandò Mania, phrenitis, aliæque mala proveniant, & cor aggrediantur, cujus regularem motum deordinando, aut palpitus, aut liporhymias, aut alios producant morbos, & in sanguinem se immittendo, vel novam fermentationem promovendo, febres generantur, vel heterogeneas sanguinis particulas excitando, & spirituosas exalando, quamplurium affectuum malignorum Iliadem congerunt, coaccervant, agglomerantque (Heu quanta malorum pessimorum congeries ab unâ concupiscentiâ scaturiginem sortitur!) Et genitalia pruritando, vascula seminalia iritando, partem spermatis volatilem, salivamque ad sui extricationem iterant; quamobrem particule quædam per eorundem vasorum poros avolando, vel in musculos incurrunt erectorios, & majorem illis erigendi epergiâ communicant, suâque gratiâ, blandâque vellicatione delectationis Veneris radium quendam immittunt; aut ob earundem tenuitatem granum horæ deaceum aliquantisper removendo, ansem præbent fluidiori, minusque viscidæ spermatis particule in urethram decidendi, unde seminis guttula suo volatili sale scærens membranam urethæ internam, glandemque quodammodò pruritans, minimulæ speciem delectationis in ejusdem papillulas insinuat, quæ papillæ nervum

rum, filamenta, nervique ipsi effecti, & ad cerebrum illam transfundunt, & imaginativæ repræsentant, & mentem ejusdem rei advertentem satius quàm pa est, non expergiscunt solum, verùm etiam stimulant, impellantque. Quapropter à delectationis complemento abortita, Veneremque tantummodo affectans, ejusdem exercitum appetit, satagit, tandemque periclitatur. In hac autem operatione tantus, & adeò inordinatus est corporis æstus, torque observantur non solum motuum varietates, sed convulsivum, motuumque convulsivorum in corpore affectus, ut non immeritò pronuntiavetis Hippocrates, *Coitum brevem esse epilepsiam*, prout refert Macrobius in lib. Saturnal. necnon Aul. Gell. noct. Atticarum lib. 19. cap. 2. quod etiam Fanstus hoc disticho perbellè canendo explicavit.

Turpis, Et est morbi species horrida Caducis,

Cùm jacet exanimis post sua furta Venus.

Ut prætereamus Stobeum hanc sententiam Maximo Democrito tribuentem; neque ab hoc dissensit Gal. qui lib. 14. cap. 10. de usu pariturum. *Quantum enim ad ea, quæ in vasibus continentur, excernenda, ipse partium velut Spasmus, qui in coitu Veneris accidit, habeat momenti, ex magnis epilepsijs, Et eo affectu, qui gonorrhæa, idest invicta feminis effluxio, nuncupatur, discas. Siquidem in vehementibus epilepsijs, quod corpus totum vehementer convellatur, & cum eo partes gentales, semen idcirco excernitur. Quod etiam approbavit Cael. Aurelianus lib. 1. cap. 4. asserens: Coitus ab aliquibus parva epilepsia nuncupatur. Nec immeritò cùm in eodem actu membrorum omnium mo-*

tus involuntarij observentur, nervorum contractio, artuum tremor, oculorum inversio, lumborum impulsus, per cutem sudor, totiusque corporis laxitas haud immodica &c. quæ omnia symptomata sunt epilepsiam concomitantia.

Probatà igitur ex quolibet quatuor capitulâ, nempe à fine, ab objecto, ab organo, & à sensorij functione Venereæ sensationis existentia, ac veritate, ad ea deveniendum existimamus, quæ hujus rei ratio, phænomena, secum affert; pro quibus,

Primò quærimus, in qua hujus organi parte sensatio hæc perficiatur.

Pro cuius quæstioni extricatione dicendum arbitramur totum hujus sensationis momentum à sale volatili in spermatis substantiâ stabulante, haberi: Hoc enim à spiritibus immissis agitarum, à motu, in Veneris actu exagitaro, sollicitatum, atque è partium inter se confusatione, necnon à spiritibus, alijsque particulis ad motum extricationis impulsu in tantam exaltatur energiam, ut loco stare nesciens, sua pernecitate è vasorum spermaticorum, ac vesicularum seminalium orificijs, totam secum spermatis substantiam trahendo, in urethram immittit sese, ibique aliquam à viscidâ seminis substantia extricationem nanciscens, membranulam urethæ internam pruritans post granum hordeaceum ita blandissimè attingit, ut supra omnem delectationem maximam jucunditatem imperiatur, & quoniam per eandem urethram fluens, eandemque membranulam offendens usque ad glandis orificium extensum & tangit, & vellicat, pruritque idcirco fit, ut per totam urethram sensatio diffundatur. Quia

de vitis etiam observatur, ut quispiam in se sano vel ægroto experiri potest.

Hoc Scrotum multis langoribus obnoxium est, sed nos hic tantum secundum nostrum institutum de ejus ex coriatione, & ulcere agimus.

CAP. LII.

*De Excoriatione, & Ulcere Scroti.**Signa.*

Scrotum est rugosus ille testiculorum saccus, quem nonnulli etiam Scortum appellant, quod quandam coracei sacculi similitudinem refert; Scortea enim veteres appellabant quæcumque ex alutâ, aut pelle constabant. Dicitur etiam vulgò bursa, seu marsupium virile foris propendens, & tactui obvium est. Molle, & rugosum ad facilitatem extensionem, & corrugationem, inter scroti tunicas nulla interijctur pinguedo, quia oneri, & impedimento huic parti fuisset. In infimâ parte lineam habet secundum longitudinem excurrentem, quæ in dextram, & sinistram partem ab Anatomicis dividitur, & suturam appellant. Constat cuticulâ & cute tenuiore, quam alibi, huic interius adhæret alia tunica tenuis ex panniculo carnosio enata, venis, & arterijs referta. Constat musculo corrugante tenuiori, Dartos appellati. Hujus musculi ope accidit, ut quam promptissimè scrotum corrugetur, vel relaxetur; unde facile redditur ratio, cur in ægrotantibus infantibus relaxetur, & in sanis corrugetur: mulierculæ enim cum Scrotum corrugatum conspiciunt, rectè valere, contra verò si relaxatum propendat, infantem ægrotare judicant, quod, &

Scroti excoriatio deprehenditur ex dolore urente, cuticulæ ablatione, vel erosionem, & aspectu patescit. Ulcus visui occurrit, adeo ut alijs non indigeat signis.

Causæ.

Consent vulgares excoriationis scroti causas esse humores acres urinam in ipsis infantibus partem hanc diutius inundantem, & cuticulam erodentem; in adultis eandem causam, si urinam in lecto emittant; in hydropicis serum, vapores, & impuritates acres circa scrotum collectos, vel scalpionem, à quibus epidermis dilaceratur. Ejusdem ulcus ab humorum acrimie affluxu, vel post inflammationem suppuratam, & quidem vel solam, vel cum testibus excitari volunt.

Excoriatio, & ulcus scroti fiunt à particulis acidis, & salis valde acutis, & corrosivis in lymphâ, sanguine, vel succo alimentitio circulantibus, vel stagnantibus superficierentus lacerantibus vel profusius fibras erodentibus, fiunt etiam à fortiori scalpione, frictione,

aliarumvè rerum corrosivarum admotione, vel lue Venerea, ulcus quandòque à suppuratà inflammatione: exco-riationis itaque causa est minor, ulceris major, hi enim affectus secundum magis, & minus differunt.

Prognosis

Scroti exco-riatio, & ulcus non sunt contemnenda, nam exco-riatio in ulcus, & hoc, cum sit in loco humido, faciliè in gangrænam degenerat.

Curatio.

Scroti exco-riationem in infantibus curant vulgares linteis mundis, & sic- cis sæpè apposisis, vel asperso subtilis- simo myrtillorum pulvere, vel sequenti unguento, ut.

*℞. Ung. de cerussa ℥. ʒ. B.
Lithargyrij ℥. j.
ol. ros. parum,
f. Unguentum.*

In adultis verò humorum acrimo- niam corrigunt, & nonnunquàm eor- um colluviem evacuant, deindè ad to- pica deveniunt, ut sunt decoctum plan- tag. & ros. in lacte, unguentum rosatum, de tutià, populeonis, vel empl. album co- ctum, & impositum.

In scroti ulceribus humores præpa- rant acres *℞. de cichor. lupul. fumar. simpl. cum iisdem aquis*, deindè præpa-

ratos evacuant *℞. de fumar. maj. & confect. Flamech.* Postmodum ulcus mundificant *unguento Apostolor. cum Egyptiaco misto*, mūdificato ulceri ap- plicant *unguentum de plumbo, tutià, lithargyr. minio &c.* quousque cicatri- cem inducant.

In scroti exco-riatione, & ulcere ea conducunt medicamenta, quæ parti- culas salinas, acidas, & corrodescentes hebetant, temperant, & cicurant, abla- tam restituunt cuticulam, & carnis de- fectum suppleunt, ac si aliquandò pur- gantibus opus est, conveniunt ea, quæ superfluum absorbent serum, & elimi- nant, omnibus palmam præcipit Mer- curius dulcis cum gummi jalap. Non spernenda sunt decocta ex ligno buxi, falseparilla radice china, ac bardana, cornu cervi, limatura eboreis cum aqua cardui benedicti parata in duplici vase vitreo, nec diaphoretica, & potiosa, præcipuè si de lue Venereâ ambigatur, hæc namque particulas succorum acu- tas corrodescentes superant, & per sudo- rem, vel insensilitatem transporant, vel per urethram exturbant, ac exco-riatio- ni epidermidem restituunt, & ulcus ab iisdem eripiunt, & mundificant. Has particulas corrosivas in scroti in- fantium, & adultorum exco-riatione hebetant pulveres cornu cervi usti, lapi- dis calaminaris preparati, Lithargyrij, creta, terra exanimata vitrioli, cerussa Saturni, Cerussa antimonij, præstant flores cinci. Commendamus forum ex herbis sale volatili gaudentibus, ut hy- perico, botanica, mentha, floribus sambuci, chamomilla. semine lini in lacte co- ctis, & post hunc utilis est illitio ex oleo ovorum, vel nucum. optimum erit se- quens unguentum.

riam. Dosis ℥. vj. quibus adde.

℥. Ol. papaveris ℥. vj.

cera alba ℥. j. B.

cetrussa antimonij ℥. xv. m.

agua cinnam. ℥. j.

magist. ocul. cancer. flu. vel

coralliorum ℥. B.

Quo felici cum successu uti poteris etiam in rhagadibus. Quandòque cum excoriatione pruritus scrotum simul affligit, tunc apprimè convenit sequens unguentum, ut.

℥. Ung. de minio camphorat. ℥. B.

cetrussa subtilissimè erisa ℥. j.

ol. ros. q. s.

us f. linimentum mediocre,

Quo imbutum linteolum frequenter loco prurienti, & excoriato superpone.

In ulceribus scroti præter jam supradicta interna, conveniunt etiam potiones vulnerariz, ut.

℥. Diellamni,

hedera terrestris,

vinca pervinea,

telephij,

alchimilla,

stellaria,

scabiosa ana m. j.

Coque cum aquâ symphyti in duplici vase apprimè clauso ad lib. ij. remanen-

Vel fiat decoctum vulnerarium calidè applicandum cum plumaceolis; vel per siphunculum injiciendum, si ulcus profundum sit ad testium substantiam, ut,

℥. Sabine,

aristolochia rotunda,

scordij,

eupatorij,

rad. hastula Regia, &

symphyti maj. ana ℥. j.

Coque in aquâ comm. & in colat. lib. ij.

adde

agua Regina Hung. ℥. iij.

sacch. Saturni, &

myrrhe ana ℥. ij.

camphora, &

aloes ana ℥. j.

Plumaceola hoc decocto imbuta calidè quater in die ulceri imponantur cum suo subligaculo. Utile est empl. de lapide calaminari, vel sodicationum, vel stipticum, vel oppodeltoch. Tam in excoriatione, quàm ulceri scroti in cuiuscumque medicamenti applicatione maximopere necessarium est subligaculum.

tionem, imò ferè semper in fistulam perennem, & quandòque in gangrænam transit, cui niti ex templo succuratur, vix æget eripitur à faucibus orci faciliùs, vel difficiùs curatur pro minori, vel majori morâ, quam pus in abscellu contraxit.

Curatio.

In ulcere perinæ post ruptum abscellum, statim *digestivo ex ovi vitello, terabinthinâ, & oleo rosaceo* ununtur vulgares & tumida pars *oleo rosaceo* inungunt, postmodum pro ulceris absterisione *bordei decoctum*, in quo *mel rosatum fuerit dissolutum*, adhibent. His nihil proficientibus, in *ulcus decoctum bordei, & seupinorum*, in quo unguentum *Aegyptiacum* dissolutum sit, per Syringam præcipuè si magna purulentæ materiæ copia adsit, vel in fistulam si inclinate videatur, injiciunt. Vel si profundius, aut fistulosum existat, simul cum *hordeæ radices aristolochiæ, ireos florentes, herbas agrimonie, betonice, & aliquid thuris* concòquunt, & in hoc decocto aliquid de unguento *Aegyptiaco* etiam dissolvunt, & injiciunt. Abstersum *ulcus emplastro de Gratia Dei, vel Diapalma* ad perfectam sanationem usque obtineunt.

In perinæ ulceribus, præsertim à suppuratâ inflammatione genitis, ante omnia succos acutos, & erodentes attemperamus *alkalicis, sive porosis, ac diaphoreticis, & porionibus vulnerarijs* quibus intermiscemus *magisteria ex oculis sanctorum, & coralliorum*,

vel sibiim diaphoreticum, vel decoctis sudoriferis pluries antè descriptionis, quæ etiam viscosos stagnantes succos fluidiores, & spirituosiores reddunt. Inter topica, si *ulcus sit sordidum, unguentum Aegyptiacum magistrale in parvâ dosi dissolutum in decocto radicis gentiane, & angelicæ, herbarum scordij, centaurej, & absterbium tantillo elixiris vite, vel balsami vite n. d.* per siphunculum injectum, si *fodicatorum sit ulcus*, commendamus, aliàs *plumaceola* imbuta quater in die calida applicentur, vel fiant injectiones *ex aquâ reginæ*, qua absterfa, optimum remedium erit balsamus proprietatis, imò hæc duo ad perfectam curationem *ulcus* conducunt. Vel præstans erit medicamentum *infusio myrrhæ, & aloës in aquâ Regina*.

Si ab externa causâ corrodente suam genesim cognoscat *ulcus*, ut ab urina saliori, vel succo spermatico Venereo, ulceris conditio inspicienda, & juxta hanc exigentiam, & statum tractari debet; Si tamen in cuius superficie spatietur, tunc inspergatur *pulvere cornu cervi Philosophicè pp. Lapidis salaminaris, cerussâ, vel flore cimi, vel abluitur spiritu vini camphorato, vel theriacali, vel infusione Lapidis salusis*. Tandem si quid cicatrizandum superest, *emplastri fodicationum, vel stiptici, vel oppoteldoch* applicatione opus compiebis.

CAP. LIV.

De Ulcere Tibiarum, & Pedum.

DE tibiis, & pedum Ulceribus non pertractare proposueramus, verum quia frequenter accidere solent, breviter dicimus harum partium ulcera operose sanationis esse, & multum laboris, ac molestie tam chirurgo, tum ægroto creare; etenim saliva acida, & corrosiva una cum latice, sanguine, vel alio succo per unguem corpus circulantia ad has partes decumbunt, & tanquam ad extremas, & proclives protrusa, obstructionis, vel visciditatis ope stagnant, fermentescunt, & exulcerant. Ob assiduum ad has partes decubitus, seu defluxum, optima quæque remedia respuunt, & irritam omnino reddunt curationem, & nisi statim sanentur, negliganturque incrementum sumere, partes vicinas excedere, diuturna, & callosa fieri solent, ac proinde incurabilia evadere.

Vulgares pro his curandis ulceribus, corpus, à vitiosis humoribus purgant, repurgantque, attamen purgantia ad hepar dirigunt, hæc namque ulcera ab hepate provenire ineptè credunt. Postmodum ulceri *unguentum diapompholygos* imponunt, quod in hoc ulcerum

genere efficacissimum prædicant. Vel applicant *unguentum de plumbo, lithargyrio, aureum &c.* & pedem ab inferiori parte ad genu ascendendo arctius constringunt: Verum hæc, & omnia ulcera nunquam unguenta, & pingua admittunt, hæc enim poros obstruunt, & inde saliva acida, & corrosiva impediuntur quominus eliminari possint. His unguentis parum, vel nihil proficientibus, utuntur *emplastro de Gratia Dei, Diapalme, vel Gryseo*, & tandem *plumbi laminam* applicare suadent, vel *Sparadrapum*, ut

*℞. Ol. ros. lib. j.
cerussa ℥. iij.
Lithargyrii ℥. iv.
thuris,
massicb. ana ℥. ℔.
sang. dracon. ℥. ℔.
myrrba,
sarcocolle ana ℥. ij.*

Coque parum ad rubedinem usque, postea, ab igne amoveantur, & immergatur linteam antiquum, quod materia emplastri eximatur, & extendatur, fiat Sparadrapum.

Tibiarum, pedumve ulcerum recentium, & inveteratorum præsertim curationem acceleramus, exhibentes his, vel ter pillulas mercuriales, has tamen in scorbuticis vitamus. Postmodum decocta sudorifica, vel potiones vulnerarias propinamus, quibus alkalia admiscemus, tandem quoad topica ulcus abluimus beca-